

Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b28781867>

TRAITÉ

D E S

HERNIES.

TRAITÉ DES HERNIES,

D E S

DIFFÉRENS BANDAGES

PROPRES A LES CONTENIR,

*ET des autres Machines du ressort du
Chirurgien herniaire.*

P. A R M. S E L L É E,

*Expert du Collège Royal de Chirurgie de Paris,
pour la guérison des Descentes.*




A P A R I S,

CHEZ { L'AUTEUR, rue Saint-Nicaise, près
celle Saint-Honoré, N°. 39.
MÉQUIGNON l'aîné, Libraire, rue
des Cordeliers, près les Ecoles de
Chirurgie.

M. D C C. L X X X I X.

Avec Approbation, & Privilège du Roi.





AVERTISSEMENT.

LIVRÉ par goût, comme par état, au traitement des hernies, j'ai fait tous mes efforts pour mériter la confiance des personnes affligées de cette infirmité. L'un des principaux devoirs de l'homme qui pratique l'art de guérir en général ou quelque'une de ses branches en particulier, est sans doute, lorsqu'il ne peut guérir une maladie, de la rendre supportable, d'en écarter les accidens & d'en arrêter les progrès. C'est dans la vue de remplir cet important devoir que j'ai composé ce *Précis* des connoissances les plus nécessaires aux personnes qui traitent les hernies, ainsi qu'à celles qui les portent.

L'expérience m'a montré nombre de fois combien il importe à ces dernières de connoître leur état , les précautions qu'il exige , la nature & les causes des accidens qui peuvent les assaillir , à la campagne , en voyage , enfin dans les lieux éloignés des secours sages & méthodiques , les seuls qui puissent , en cette occasion , profiter au malade ou du moins ne lui pas nuire. Dans mille circonstances , la conduite inactive , mais éclairée , de la personne qui souffre , est préférable aux tentatives hardies , imprudentes , dangereuses , qu'un faux savoir suggère à des praticiens peu familiarisés avec la matière que nous traitons.

C'est principalement aux malades eux-mêmes que je destine ce *Précis*.

On les voit souvent demander aux Chirurgiens herniaires des principes de conduite , des avis dont ils puissent faire usage , dans les différentes modifications , complications ou accidens de leurs maladies. Pour leur donner les conseils qu'ils demandent & les mettre à portée d'en faire un usage utile , il faut en quelque sorte les initier dans l'art du Chirurgien herniaire ; & c'est ce que j'ai tâché de faire dans cet écrit. Puissé son utilité répondre à l'intérêt que m'inspire leur affligeante situation ! L'homme atteint d'une hernie , sans souffrir , est véritablement à plaindre ; il inspire la plus vive commisération. En apparence , il peut jouir de tous les plaisirs de la vie , & craint de s'y livrer ; il se sent propre à tous

les exercices , & n'ose s'en permettre aucun ; tous les alimens sains excitent son appétit , & l'expérience le force de se priver de tous ceux qui troubleroient le calme de ses entrailles ; il adore une tendre épouse , il peut la rendre heureuse par ses embrassemens , & il se voit forcé de mettre dans ses transports une prudence , une circonspection & , si j'ose le dire , des procédés méthodiques qui les glacent : mesurés par la froide raison , ils en deviennent plus propres mille fois à exciter la pitié , qu'à développer ce sentiment impétueux , ce délire tendre , cet abandon délicieux qui font les plus doux charmes du lien conjugal.

Mais ce n'est là qu'une partie des chagrins que l'*Herniste* éprouve.

On se rappelle ce convive infortuné, qui voyant un glaive suspendu sur sa tête, sent l'appétit disparoître, n'ose approcher la main du mets qui le tente; la crainte glace ses esprits, il craint que le glaive menaçant ne se détache & n'arrose de son sang, des mets qu'il dédaigne. Tel le malheureux *Herniste*, sans cesse occupé des accidens qui le menacent, ne voit qu'eux. La crainte de mourir l'empêche de vivre; sous l'apparence d'un homme, il n'est qu'une ombre dans la société.

Pour comble de maux, forcé de se refuser à mille plaisirs qu'on le croit en état de partager, il éprouve des instances importunes qui le tuent, & qu'il ne peut faire cesser,

parce qu'il n'ose divulguer la raison trop légitime de ses refus. Une fausse honte le retient. Son infirmité n'est pas du nombre de celles qu'on avoue ; le préjugé s'y oppose & fait expirer sur les lèvres l'aveu prêt à s'échapper.

D'où peut venir ce préjugé qui fait une sorte de flétrissure d'une infirmité qui n'a pour l'ordinaire rien de difforme , & dont la cause est si naturelle ? ce feroit remonter bien haut que d'en chercher la source chez les Hébreux. On fait que parmi ce peuple les descentes excluient du Sacerdoce. Dans le Chapitre XXI du Lévitique , le Seigneur dit à Moyse : parlez aux Prêtres, Enfans d'Aaron , & dites-leur : » Si un homme d'entre les » familles de votre race , a une her-

» nie (*ſi hernioſus*), il n'offrira
 » pas les pains à ſon Dieu, il n'ap-
 » prochera pas du miniſtère de ſon
 » Autel ». Ce préjugé défavorable
 auroit-il ſa ſource dans l'opinion
 où l'on pouvoit être autrefois, que
 la hernie appelloit néceſſairement
 la mutilation ? mais la mutilation,
 comme moyen curatif, eſt égale-
 ment proſcrite par les dogmes de
 l'Art, par la voix de la conſcience,
 & par les Loix de l'Etat. Me ſera-
 t-il permis de le dire, l'utile proſ-
 cription de cette opération barbare
 doit être miſe au nombre des cauſes
 qui font qu'on voit aujourd'hui
 plus de perſonnes atteintes de her-
 nie qu'on n'en voyoit autrefois.

L'Art de guérir chez nos Peres, vi-
 goureux & ferme comme leurs carac-
 tères, n'admettoit point les ména-

gemens , il ne favoit pas *termoyer*.
Toute hernie opérable , sur-tout la
bubonocèle , de toutes la plus fré-
quente , étoit opérée. Quelques
malades guérissoient ; plusieurs mour-
roient ; un petit nombre *rechûtoit* ,
& ceux-ci restoient seuls pour for-
mer la classe des *Hernistes*.

L'Art devenu plus doux , plus
humain , en se perfectionnant , a
cru que c'étoit travailler utilement
pour la société que de conserver
un homme , quoiqu'il ne fût plus
propre à rompre des lances dans les
batailles ou dans les tournois ; il
n'a plus donné la mort en cherchant à
délivrer d'une infirmité supportable
& rarement funeste. L'*Herniste* docile
à ses conseils , a parcouru sans acci-
dent & presque sans danger , la car-

rière paisible de l'état qu'il avoit embrassé.

Le nombre des personnes attaquées de hernie doit donc être aujourd'hui moins nombreux qu'autrefois , de tous les individus qui trouvoient la mort dans l'opération hardie & dangereuse dont ils attendoient la guérison de leur infirmité.

C'est à l'art des bandages perfectionnés , qu'on doit la proscription de la cure incertaine & dangereuse , qui pour conserver la vie aux malades , les privoit d'une partie des organes destinés à la transmettre. Car , on n'en sauroit douter , si nos Peres eussent connu l'art de contenir la bubonocèle d'une manière invariable , sûre , & peu gênante , ils se feroient abstenus d'une opération , dont ils ne pouvoient se dissimuler

l'incertitude & les dangers. C'est en France & principalement dans la Capitale, que l'art de bien construire un brayer ou bandage, a pris naissance & reçu ses perfections. C'est dans la Capitale que le concours des lumières & le choc des opinions ajoutent sans cesse des perfections nouvelles aux qualités qui rendoient déjà si recommandables & si précieux les bandages qu'on y construit. Envain des modèles de toutes les formes se répandent-ils dans les provinces ; les Artistes qui les habitent ne parviennent que difficilement à les imiter, je ne dis pas dans l'élégance, la légèreté jointe à la solidité, mais dans la qualité seule essentielle, la *sûreté*. La plupart des Royaumes étrangers sont à cet égard bien au-dessous de nos Provinces :

j'ai vu des bandages construits dans le Nord & dans le Midi, même dans les villes célèbres par la culture des Arts, & ils ne m'ont offert pour la plupart, que des masses lourdes & grossières, telles à-peu-près qu'on les construisoit en France, dans le siècle des Paré, des Pigray, des Franco, & telles à-peu-près qu'on les trouve encore au sein même de la Capitale, dans les boutiques des boursiers & autres artisans. Il est bien étonnant que parmi les jeunes Elèves envoyés à Paris par différens Souverains, pour se perfectionner dans la Chirurgie, on n'en destine pas quelqu'un d'une manière spéciale, à l'art du Bandagiste ! Dans une armée un soldat avec une hernie mal contenue, est bien peu de chose ;

affermi par un bon bandage , il est tout ce qu'il peut être.

Mais je m'écarte de mon principal objet ; c'est pour les *Hernistes* eux-mêmes que j'écris. Si j'ai sçu réunir dans ce petit Ouvrage , les connoissances dont ils ont besoin pour connoître leur état & saisir l'esprit des maximes de conduite qui leur sont nécessaires pour se garantir des accidens dont ils sont menacés , j'aurai rencontré le but que je cherchois & reçu toute la récompense que j'en attendois.

N. B. J'ai cru qu'il seroit utile de joindre à cet Ouvrage deux Figures. La première indique les régions & les ouvertures naturelles du bas-ventre ; La deuxième donne une idée de la formation d'une hernie , &c.



T R A I T É

D E S

H E R N I E S.

LA hernie, ou descente, est une tumeur formée par le déplacement de quelqu'une des parties contenues dans la cavité du bas-ventre.

Avant d'exposer les causes, les signes, la cure, &c. de cette maladie; nous croyons qu'il est utile de donner une description abrégée des parties renfermées dans la cavité, & de celles qui en forment les parois; afin de

A

mettre nos lecteurs à portée de reconnoître cette maladie, & d'y porter les secours qu'elle exige.

Du bas-ventre.

Le bas-ventre, ou l'abdomen, est la plus grande des cavités du corps. Elle occupe l'espace compris entre la poitrine & les extrémités inférieures ; s'étend depuis la partie antérieure du tronc, jusqu'à la postérieure, & depuis un côté jusqu'à l'autre. Elle est bornée en haut par le diaphragme, muscle très-mince & en grande partie aponévrotique ; il forme la cloison qui sépare le bas-ventre d'avec la poitrine. Il s'attache par sa circonférence à la face interne des dernières côtes, & en arrière à la colonne vertébrale. Sa face inférieure concave, forme la voûte du bas-ventre & recouvre le foie, l'estomac, &c. La face supé-

rière convexe, forme le plancher de la poitrine, & répond au cœur & aux poumons. Il est percé de deux grandes ouvertures, dont l'une, dans le centre tendineux ou nerveux, laisse passer la veine cave inférieure; & l'autre, dans la portion charnue, est occupée par l'œsophage. Ce muscle est un des principaux organes de la respiration. Il sert aussi beaucoup aux fonctions des viscères abdominaux en contrebalançant l'action des muscles du bas-ventre.

Le bas-ventre est borné en bas par des parties qu'il seroit trop long d'énumérer; mais la plus remarquable de toutes est une espèce de cloison formée par le releveur de l'anus. La plus épaisse des parois du bas-ventre est celle qui occupe la partie postérieure; car outre plusieurs muscles fort épais, il y a encore les vertèbres des lombes & l'os sacrum.

La paroi antérieure, celle qui nous importe le plus de connoître, est formée par plusieurs plans charnus, appelés en général, muscles du bas-ventre. Les parois latérales sont formées en haut par les dernières fausses côtes, & par des portions des muscles du bas-ventre ; dans le milieu, par ces muscles seulement ; & en bas, par les os des iles ou des hanches.

Pour assigner avec plus de précision les différents points du bas-ventre, on l'a divisé en trois régions principales. La plus élevée se nomme région épigastrique ; la région moyenne se nomme ombilicale ; enfin l'inférieure s'appelle région hypogastrique.

La première occupe toute l'étendue qui se trouve au-dessus de trois travers de doigt de l'ombilic, & sa partie moyenne conserve le nom d'épigastre. Ses parties latérales se nomment hypochondres. La région om-

bilicale conserve dans son milieu le nom d'ombilic; ses côtés se nomment les flancs.

La dernière région se nomme hypogastrique. Elle commence au-dessous de trois travers de doigt de l'ombilic, & se trouve terminée en bas par les parties génitales, le periné, &c.

On a divisé cette région en deux autres, dont l'une est supérieure, & l'autre, inférieure. La supérieure se nomme proprement région hypogastrique; elle s'étend depuis la région ombilicale, jusqu'au pubis ou à l'éminence recouverte de poils, dans l'âge adulte. Le milieu de cette région conserve le nom d'hypogastre; les côtés se nomment les régions iliaques. La région inférieure se nomme région du pubis, le milieu en conserve le nom, & les côtés se nomment les aînes.

On a encore divisé le bas-ventre en parties contenant, & en parties

contenues. Les premières forment les enveloppes de la cavité, & les dernières sont celles, qui par leur déplacement constituent les hernies.

Des parties contenant.

Les parties contenant du bas-ventre sont la peau ou tégumens communs, le tissu cellulaire, la graisse, les muscles, beaucoup de vaisseaux & de nerfs, enfin le péritoine.

La peau est une membrane épaisse, d'un tissu fort ferré, composée de plusieurs sortes de fibres, dont l'entrelacement est très-difficile à développer, étant fait en tout sens, à-peu-près comme l'étoffe d'un chapeau. Son épaisseur & sa consistance varient dans les différents points du bas-ventre. Ce tissu résiste au déchirement, il prête en tout sens, & reprend ensuite son étendue ordinaire, comme on le voit

par l'embonpoint, la grosseffe, l'hydropisie & les très-grandes hernies. Son usage principal est de défendre les parties, qui en font recouvertes, des injures des corps extérieurs.

Le tissu cellulaire est la trame de toutes nos parties. Il est formé de fibres & de lanières entrelacées en tout sens, laissant entr'elles des espaces occupés en général par la graisse. Ce tissu sert de lien à toutes nos parties, & il entre dans leur formation.

La graisse est un suc huileux, jaunâtre, plus ou moins consistant chez les différents individus. Il sert à lubrifier, par sa transsudation, la surface de nos parties, & à faciliter le mouvement de celles qui l'avoisinent.

Les vaisseaux & les nerfs, qui se distribuent dans l'épaisseur des parois du bas-ventre, n'ont rien de particulier qui doive nous occuper.

Les muscles du bas-ventre sont les

parties les plus essentielles à connoître, relativement aux hernies ; car outre que leur action est la cause la plus ordinaire de cette maladie, ils présentent d'ailleurs des ouvertures par lesquelles passent ordinairement les parties qui sont contenues dans la cavité, & forment les hernies

Ces muscles sont au nombre de dix, cinq de chaque côté, savoir : deux grands obliques, deux petits obliques, deux transverses, deux droits & deux pyramidaux.

Les muscles grands obliques, ou obliques descendants, sont immédiatement au-dessous de la peau. Ils recouvrent les petits obliques ; ils s'attachent, en haut, à l'extérieur des dernières côtes, & en bas par une large aponévrose à la crête des os des hanches & au pubis.

Les petits obliques, ou obliques ascendants, sont placés au-dessous de

ceux-ci & sur les muscles transverses. Ils s'attachent, en haut, au bord inférieur des dernières fausses côtes, & en bas à la crête de l'os des hanches.

Les transverses sont placés encore plus profondément au-dessous des petits obliques, & immédiatement sur le péritoine. Ils s'attachent en haut à la face interne des côtes, & en bas à la crête des os des iles.

Ces trois paires de muscles se confondent en devant par leurs aponévroses, & forment une double gaine pour les muscles droits.

Les deux muscles droits sont placés à la partie antérieure de l'abdomen enveloppés des lames aponévrotiques des six muscles, dont nous venons de parler. Ils s'attachent en haut à la face antérieure du cartilage xiphoïde, & aux cartilages des dernières vraies côtes & en bas au pubis.

Les muscles pyramidaux n'existent

pas dans tous les sujets , & ils varient souvent en nombre. Ils s'attachent en bas au pubis , devant les attaches des muscles droits , & vont de-là s'attacher à trois ou quatre travers de doigt , au-dessus sur les côtés de l'entrelacement commun des aponévroses des muscles obliques & transverses ; endroit que les Anatomistes ont nommé la ligne blanche. Cette ligne règne exactement dans le milieu de la partie antérieure de l'abdomen , & s'étend depuis la partie inférieure du sternum jusqu'au pubis. Elle est interrompue dans son milieu par l'ombilic. La portion de cette ligne , qui est au-dessus de l'ombilic , est plus large que celle qui est au-dessous. On y remarque quelquefois des écartemens entre les mailles aponévrotiques , & cette disposition peut donner lieu à des hernies.

Les ouvertures naturelles , & les plus

connues des muscles du bas-ventre ; sont au nombre de cinq : l'une à la partie antérieure & moyenne, connue sous le nom d'anneau ombilical ou nombril ; cette ouverture existe seulement dans les sujets très-jeunes : deux autres nommées les anneaux : enfin les deux arcades crurales ; mais on peut ajouter à ces ouvertures les échancrures sacrosciatiques , & les trous obturateurs.

L'anneau ombilical est situé à la partie moyenne de la ligne blanche dans l'écartement des fibres aponévrotiques , dans laquelle il se trouve. Il est large dans le fœtus où il laisse passer le cordon des vaisseaux ombilicaux , par le moyen duquel il tire sa nourriture : mais après la naissance ce cordon s'oblitérant, l'ouverture qui lui donnoit passage s'efface entièrement.

L'anneau inguinal est cette ouverture ovulaire que l'on trouve de cha-

que côté à la partie inférieure du bas-ventre, dans la région de l'aîne. Cette double ouverture existe dans l'un & l'autre sexe : mais elle est plus grande dans l'homme que dans la femme. Sa forme est ovalaire, obliquement de haut en bas, & de dehors en dedans. Elle est formée par l'écartement de deux bandelettes aponévrotiques du muscle grand oblique, qui, parvenu à l'épine antérieure & supérieure de l'os des iles, descend par une large aponévrose en devant & en dedans, vers le pubis. Avant d'y arriver, elle se divise en deux prolongemens qui laissent entr'eux l'ouverture ovale dont nous parlons. L'aponévrose a reçu le nom de ligament de Fallope ou de Poupart, & les prolongemens se nomment piliers. La partie supérieure du ligament de Fallope se continue avec le reste de l'aponévrose du grand oblique.

Le bord inférieur laisse, entre lui & la grande échancrure antérieure du bassin, un espace considérable nommé arcade crurale. Les fibres de ce bord sont d'ailleurs entrelacées avec les aponeuroses de l'enveloppe de la cuisse.

L'extrémité externe & supérieure du ligament s'implante à l'épine antérieure & supérieure de l'os des iles.

L'extrémité inférieure & interne se termine par les deux piliers. L'un d'eux est nommé supérieur antérieur ou interne; l'autre, inférieur postérieur ou externe. Le supérieur passe devant la symphyse du pubis où il s'entrecroise en X avec son semblable, & va s'implanter devant le pubis du côté opposé.

L'inférieur plus court, mais un peu plus gros, présente une espèce de gouttière dans sa partie supérieure, & s'attache au pubis de son côté.

L'endroit de la réunion des deux

piliers est affermi par des fibres entrelacées en tout sens.

Les usages de l'anneau inguinal, sont de laisser passer le cordon des vaisseaux spermatiques dans l'homme, & le ligament rond dans la femme. Ces deux ouvertures sont le siège le plus ordinaire des hernies.

L'arcade crurale est l'espace qui se trouve entre le ligament de Fallope & l'échancrure antérieure du bassin. Cet espace est beaucoup plus grand chez les femmes, par là plus exposées que les hommes aux hernies de cette partie.

Le ligament de Poupart, en descendant de l'épine supérieure de l'os des iles au pubis, se replie sur lui-même, comme les osiers sur le bord d'un panier, disposition qui donne de l'épaisseur & de la force à cet endroit de l'aponévrose. Les arcades crurales sont occupées par les muscles

psoas & iliaque ; le muscle pectiné, les vaisseaux & les nerfs cruraux.

Les muscles de l'abdomen ont pour usage de fléchir la poitrine sur le bassin, & réciproquement le bassin sur la poitrine. Ils agissent sur les parties contenues dans le bas-ventre, & par l'espèce de ballotement qu'ils excitent dans la cavité, à l'estomac, aux intestins, au foie & autres parties, ils facilitent la digestion, la sécrétion & l'excrétion des urines, &c.

Le péritoine est une tunique membraneuse, qui non-seulement tapisse toute la face interne des parois du bas-ventre, mais encore les parties qui y sont contenues ; & leur fournit des tuniques & des ligamens qui les retiennent dans une position respective.

La face interne du péritoine est adhérente en devant, & sur les côtés à la face interne des muscles abdominaux, par un tissu cellulaire moins

ferré aux environs de l'anneau & de l'arcade crurale, où il se continue avec celui des cuisses; en arrière, cette face externe recouvre les viscères contenus dans l'abdomen, en suivant leur position respective & celle des vaisseaux qui vont de l'un à l'autre, ou des parois du bas-ventre à ces mêmes viscères. Cette face externe n'est pas également adhérente à l'extérieur des viscères; dans quelques endroits le tissu cellulaire, qui l'y unit, est ferré; dans d'autres, il est très-lâche.

La face interne du péritoine est très-lisse & très-poreuse; elle est contigüe à elle-même dans la plupart de ses points, puisque la face externe des viscères renfermés dans la cavité, est toujours appliquée contre la face interne des parois. Les porosités du péritoine laissent transsuder continuellement dans l'intérieur du bas-

ventre une humeur lymphatique, qui empêche la cohésion de ces parties. Cette humeur est rapportée dans le torrent de la circulation par les vaisseaux lymphatiques qui sont béants dans la même cavité.

Le péritoine est susceptible d'une très-grande extension. La grosseffe, l'hydropisie & les grandes hernies le prouvent. Ses usages font de contenir les viscères du bas-ventre comme dans une espèce de sac, qui d'ailleurs s'étend assez par ses prolongemens pour fournir à chacun d'eux, une tunique appelée membraneuse, & qui, en accompagnant les vaisseaux libres & flottants, les soutient en rapport mutuel. Les principaux ligamens ou prolongemens que forme le péritoine, sont ; le ligament suspenseur du foie, le petit & le grand épiploon, le mésentère, le mésocolon transverse, & quelques

autres replis moins essentiels à connaître.

Le ligament suspenfeur du foie ; ou la faulx de la veine ombilicale , est un repli , qui , de la partie fupérieure & droite de la face interne du mufcle tranfverfe , fe réfléchit fous le diaphragme & fur le foie. Son principal ufage eft de contenir dans l'un de fes bords la veine ombilicale.

Le petit épiploon eft un repli du péritoine , qui de la partie inférieure du foie , fe rend à la partie fupérieure de l'eftomac. Il contient dans fa duplication des vaiffeaux de communication & des plexus nerveux.

Le grand épiploon eft de tous les replis , le plus étendu ; il eft flottant fur les inteftins , il defcend plus ou moins bas , fuivant l'embonpoint du fujet , & différentes circonftances impoffibles à déterminer. Il foutient les vaiffeaux de communication de l'ef-

tomac à l'intestin colon. De toutes les parties renfermées dans le bas-ventre, après les intestins, c'est celle qui fait plus souvent hernie.

Le mésentère a été comparé à une manchette, par la disposition de ses plis & l'inégalité de ses bords. Le péritoine, devant la colonne vertébrale, se réfléchit sur & sous les vaisseaux qui vont aux intestins grêles, les recouvre jusqu'à ce qu'arrivé à ces intestins, il les embrasse ensuite pour former leur première tunique. Les plis du mésentère varient suivant les circonvolutions des intestins. Le bord de ce ligament, répondant à la colonne vertébrale, est beaucoup plus court que celui qui répond aux intestins. Dans sa duplication on trouve des artères & des veines sanguines, des veines lymphatiques, des vaisseaux chylifères, des glandes & des plexus nerveux. Ce

prolongement fait hernie à la suite des hernies intestinales un peu considérables.

Le mésocolon transverse est, à l'arc du colon, ce que le mésentère est aux intestins grêles. Il a la même structure, les mêmes usages respectifs, & enfin comme lui il peut sortir à la suite de l'intestin auquel il est attaché.

Tous les points de la face interne des parois du bas-ventre, étant recouverts du péritoine, aucunes des parties contenues ne peuvent sortir sans pousser devant elles un prolongement de cette membrane, qui leur forme une enveloppe que l'on nomme sac herniaire. Il n'y a de hernie sans sac que celles qui sont la suite de solutions complètes de continuité de toute l'épaisseur des parois, & les hernies de vessie qui, ordinairement entraînée à la suite des hernies intestinales, se trouve derrière le sac de la hernie première.

Des parties contenues.

Les parties contenues dans le bas-ventre , sont destinées à des fonctions particulières ; les unes servent à la digestion , les autres à la sécrétion & excrétion des urines , enfin les autres à la génération. Elles ne sont pas toutes également exposées à former hernie. Nous nous bornerons à l'exposition de celles qui peuvent constituer cette maladie. Telles sont l'épiploon , les intestins grêles , les gros intestins , le mésentère , la vessie , l'estomac , la matrice & ses dépendances.

L'épiploon , comme nous l'avons déjà dit , est le plus grand de tous les replis du péritoine. Il prend son origine à l'estomac , descend de-là à l'arc du colon ; étant plus étendu que l'espace qu'il parcourt , il en résulte un pli transversal entre ses attaches su-

périeure & inférieure ; par conséquent il devient libre & flottant pour se porter plus ou moins bas dans la cavité. Sa grandeur varie ; on observe qu'il est moins grand chez les enfans, & qu'il a plus de longueur du côté gauche que du côté droit ; longueur occasionnée, à ce qu'il paroît, par la position de l'estomac. On l'a comparé à une gibecière, dont l'ouverture seroit en haut & le fond en bas, mais dont les parois seroient étroitement collées entr'elles. Il est formé de deux lames fort minces, très-peu résistantes, & comme pulpeuses dans quelques sujets. Ces lames sont très-chargées de graisse dans les sujets qui ont de l'embonpoint ; elle y est disposée par bandelettes irrégulières ; d'ailleurs l'épiploon est parsemé d'une grande quantité de vaisseaux. On ne peut y suivre les nerfs. Nous avons déjà dit qu'il avoit pour usage de contenir en position res-

pective les vaisseaux de communication de l'estomac à l'arc du colon.

De l'estomac.

L'estomac , ou ventricule , est une poche musculieuse & membraneuse , placée à la partie supérieure & gauche de l'abdomen , dans l'hypochondre gauche , au-dessous du diaphragme & du foie , au-dessus de l'arc du colon & des intestins grêles. Sa grandeur varie beaucoup dans les différens sujets & les différens âges. On l'a très-bien comparé à une cornemuse , il en a la figure. On observe à l'estomac sa grande courbure , qui est tournée en devant & en bas , & qui donne naissance au grand épiploon ; la petite courbure qui a une direction contraire à la première , & qui reçoit la terminaison du petit épiploon ; son grand cul-de-sac placé dans l'hypochondre

gauche ; le petit cul-de-sac peu remarquable, & qui est tourné vers le côté droit ; enfin deux ouvertures ; l'une à gauche & en haut , elle est nommée orifice cardiaque , c'est la terminaison inférieure de l'œsophage , qui porte les alimens dans l'estomac. L'autre ouverture est à droite & connue sous le nom de pylore, elle s'abouche à l'ouverture supérieure du canal intestinal : c'est par là que les matières contenues dans l'estomac , descendent dans les intestins. L'estomac est formé de quatre tuniques. La première , ou celle qui est à l'extérieur , lui vient du péritoine , c'est la tunique membraneuse. Au-dessous d'elle on trouve la tunique charnue unie à la membraneuse par du tissu cellulaire ; elle est formée de fibres charnues , dirigées en toute sorte de sens. La troisième , ou nerveuse , n'est formée que de tissu cellulaire très-ferré , parcourue
par

par des vaisseaux & des nerfs. Enfin l'interne ou veloutée paroît être la continuation de l'épiderme qui recouvre la peau de l'extérieur du corps. Elle est poreuse, & laisse passer dans l'estomac le suc gastrique, filtré dans des follicules glanduleuses, placées entre les deux dernières tuniques. L'estomac reçoit une très-grande quantité de vaisseaux de tout genre. Il est le premier organe de la digestion.

Des intestins ou boyaux.

Le canal intestinal est un conduit tortueux, plus ou moins bosselé, & replié sur lui-même, qui s'étend depuis l'orifice pylorique de l'estomac, jusqu'à l'anus. Les intestins occupent la majeure partie du bas-ventre, en formant de nombreuses circonvolutions, dont la disposition varie à chaque instant de la vie; ils sont d'ail-

leurs courbés , de manière que par leur concavité ils sont adhérents aux parois du ventre , par les prolongemens du péritoine. La convexité de la courbure est libre & très-étendue. On la dit égale à six ou sept fois la longueur du corps dont les intestins sont tirés. Quoique ce canal soit continu dans tous ses points, pour assigner avec plus d'exactitude la position de ses différentes portions , on les a distinguées par des noms particuliers.

La portion supérieure, ou celle qui est immédiatement continue à l'estomac , étant moins ample que l'autre , porte le nom d'intestins grêles ; on nomme la dernière, les gros intestins. Chacune d'elles est subdivisée en trois autres. La première des intestins grêles se nomme *duodenum* , la seconde *jejunum* & la troisième *iléon*.

Le premier des gros intestins s'ap-

pelle *cæcum*. Celui qui suit, *colon*, & le dernier, *rectum*.

On a donné le nom de *duodenum* au premier des intestins grêles, parce qu'on a cru qu'il étoit ordinairement long de douze travers de doigt. Il commence au pylore qu'il embrasse, & finit à l'endroit où commence le mésentère, sur le côté gauche du commencement de la colonne lombaire. C'est dans cet intestin que sont versés la bile & le suc pancréatique, qui agissent sur les matières alimentaires. Aussi quelques auteurs le regardent comme un second ventricule.

Le second des intestins est nommé *jejunum*, parce qu'ordinairement il se trouve vide. Il commence où finit le duodénum, & se termine dans le troisième des intestins grêles, sans que l'on puisse assigner exactement la ligne de démarcation. Il occupe sur-tout la

région ombilicale par ses circonvolutions nombreuses.

L'*iléon*, ou le troisième & dernier des intestins grêles, reçoit son nom de sa position ordinaire, dans les régions iliaques. Il commence où finit le jejunum, & vient occuper les régions iliaques, & une partie de la cavité supérieure du bassin. Il se termine dans le premier des gros intestins, le cœcum ; & à son embouchure l'on remarque une double valvule, l'ilicocolique & l'ilicocœcale.

Le jejunum & l'iléon sont les intestins dont la mobilité est la plus grande. Ils sont comme flottants dans la cavité du bas-ventre. Aussi remarque-t-on qu'ils donnent ordinairement naissance aux hernies ventrales & inguinales, &c.

Le premier des gros intestins est le *cœcum*. Son nom lui vient de ce qu'il forme une espèce de cul-de-sac, ou

de cavité sans ouverture. Il est assez gros, & de forme à peu-près triangulaire, inégalement bosselé. Il donne naissance à une appendice de cinq à six travers de doigt, dont la grosseur est à-peu-près celle d'une plume à écrire. Elle ressemble assez bien à une espèce de ver, ce qui lui a fait donner le nom d'appendice vermiforme. Le cœcum est placé assez ordinairement dans la région iliaque droite, ou dans la fosse iliaque de l'os des hanches de ce côté. Il reçoit l'extrémité inférieure de l'iléon, & se termine dans le commencement du colon.

Le colon est le second des gros intestins. Son nom lui vient de ce que le grand nombre de cellulosités qu'on y remarque, le rendent propre à retarder le cours des matières qui le parcourent. Il commence à la partie supérieure du cœcum, s'élève au-devant du rein droit, en se portant en

arriere, jusqu'au-dessus du foie & de la vésicule du fiel, d'où il change de direction en se réfléchissant de droite à gauche. Il passe ensuite transversalement sous l'estomac, & arrive au-dessous de l'hypochondre gauche. Il se recourbe de nouveau pour descendre devant le rein gauche, & se terminer, en passant dans la fosse iliaque gauche, à l'extrémité supérieure du dernier des gros intestins, appelé le rectum. Le colon est divisé en trois portions. La première, ou la portion ascendante, ou lombaire droite du colon, est celle qui s'étend depuis le cœcum, jusques au foie & à la vésicule du fiel. Cette portion est maintenue dans la région lombaire droite, par un repli du péritoine; les matières circulent, dans cette portion, contre leur propre poids.

La seconde portion, ou l'arc du colon, s'étend depuis l'extrémité supé-

rière de la première , jusqu'à la courbure de ce canal, au-dessous de l'hypochondre gauche. Cette portion a plus de longueur que le trajet qu'elle a à parcourir. Elle forme des circonvolutions plus ou moins étendues. L'arc du colon occupe ordinairement la partie supérieure de la région ombilicale. Il y est retenu par un repli du péritoine, nommé mésocolon transverse, c'est à cette portion du colon que vient se rendre ce grand épiploon qui descend de l'estomac. Les matières circulent dans l'arc de droite à gauche.

La troisième & dernière portion du colon , se nomme l'S romaine du colon , à cause d'une double courbure que forme cet intestin avant de se terminer au rectum. Cette portion est retenue dans la région lombaire & iliaque gauche , par un repli du péritoine plus lâche vers la région iliaque , que dans les autres points.

La circulation des matières est favorisée dans l'S romaine du colon par leur poids.

Le dernier des gros intestins est appelé rectum, parce qu'on l'a considéré comme ayant une direction droite. Il commence où finit le colon, descend dans le bassin devant l'os sacrum & le coccyx, en se conformant à leur courbure, & se termine par une ouverture à l'extérieur que l'on appelle l'anus. Cette extrémité inférieure est entourée de muscles qui lui sont propres, & qui sont connus sous le nom de releveur & de sphincter de l'anus. Leurs usages sont d'ouvrir & de resserrer, presque volontairement, cette ouverture pour l'expulsion des matières stercorales : s'ils viennent à se relâcher & à perdre leur ressort, ils donnent lieu à la chute du fondement, comme nous le dirons ailleurs.

De la vessie.

La vessie est une poche musculeuse & membraneuse, placée dans l'excavation du petit bassin, derrière le pubis, devant le rectum, dans l'homme, & entre le pubis, le vagin & la matrice, dans la femme. Elle ressemble à un cône dont la base arrondie est en bas, & la pointe en haut. Sa structure est en général la même que celle des grands réservoirs; elle a quatre tuniques, des vaisseaux & des nerfs qui les parcourent. Elle est destinée à contenir, pendant quelque-temps, les urines qui, séparées dans les reins, sont déposées dans la vessie par deux canaux qui s'ouvrent à sa partie postérieure & inférieure; elle les transmet à l'extérieur par le canal de l'urètre qui s'abouche à sa partie antérieure.

Des parties de la génération.

Les unes peuvent former hernie, les autres contiennent les parties sorties.

Celles qui chez la femme peuvent former hernie, sont la matrice, les ovaires & le vagin.

Celles qui peuvent contenir les parties, sont les grandes lèvres.

Les parties de la génération, chez les hommes, ne peuvent former hernie, & il n'y a chez eux que le scrotum qui contienne les parties sorties.

De la matrice.

La matrice est un viscère creux, de substance très-ferme dans les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, ou chez lesquelles la matrice est dans l'état de vacuité. Elle est située entre la vessie & l'intestin rectum. On la compare très-bien à une poire aplatie d'ar-

rière en avant , & on la divise en fond , en corps & en col. Le fond occupe la partie supérieure , il est plus évasé que le reste ; le corps va en diminuant jusques au col , qui se termine par une fente transversale , qu'on nomme museau de tanche , à la partie supérieure du vagin. Quatre ligamens principaux retiennent la matrice en place. Les deux premiers , nommés ligamens larges , sont deux replis du péritoine , qui d'une part répondent aux deux côtés de la matrice , & de l'autre aux parties latérales de l'excavation du petit bassin. Ces ligamens renferment dans leurs bords supérieurs la trompe de Fallope & l'ovaire. La trompe par son extrémité interne , s'ouvre à la partie supérieure & interne de la matrice. Elle se termine en dehors par un évasement que l'on nomme pavillon : l'ovaire est une espèce de corps glanduleux , grisâtre ,

situé au bord supérieur du ligament large. Ces parties sont sujettes à différentes maladies, & l'ovaire sur-tout, à l'hydropisie & à former hernie.

Les deux autres ligamens de la matrice, sont les ligamens ronds. Ils naissent des parties latérales & supérieures de la matrice, se portent obliquement de haut en bas, & de dedans en dehors, dans l'épaisseur des ligamens larges; ils se réfléchissent ensuite pour gagner l'anneau inguinal qu'ils franchissent pour se perdre dans le tissu cellulaire des grandes lèvres, & aux parties supérieures des cuisses.

Comme ces ligamens sont de nature à se relâcher facilement, par les tiraillemens exercés par la matrice dans l'état de plénitude, même dans l'état de vacuité, il est aisé de concevoir que cet organe, en changeant de position, peut former hernie, ou par les ouvertures du bas-ventre, ou par le

vagin, qui lui-même poussé par la matrice, ou entraîné seul à cause de très-grands relâchemens, peut aussi constituer cette maladie.

Le vagin est un canal membraneux, qui s'étend depuis la matrice, jusqu'à cette fente que l'on observe au-dessous du pubis, & que l'on nomme la vulve, entre la vessie & le rectum. Sa longueur ordinaire est de cinq à six pouces, sa largeur varie beaucoup, suivant les changemens qu'il subit dans la grossesse, sur-tout dans l'accouchement.

Les grandes lèvres sont deux replis de la peau de la partie interne & supérieure des cuisses, elles bornent de côté & d'autre, la fente nommée la vulve ou *pudendum*. Dans leur épaisseur sont reçues les parties qui forment les hernies complètes chez les femmes.

Du scrotum.

Le scrotum, vulgairement appelé

les bourses , est un sac formé par le prolongement de la peau des cuisses & de la partie inférieure du tronc ; cette peau ne diffère de celle des parties voisines que par ses rugosités & les poils plus nombreux qui y croissent. Ce sac est divisé en deux cavités par une cloison membraneuse nommée le dartos. Cette cloison est désignée à l'extérieur , par une espèce de couture nommée raphé , qui commence en arrière à l'anüs , partage le périné en deux , en se portant en devant & vient , en passant au milieu du scrotum , se terminer à l'extrémité de la verge où elle est moins sensible qu'au scrotum. Les deux sacs du scrotum contiennent les testicules & les cordons des vaisseaux spermatiques. Les hernies inguinales complètes sont contenues dans le scrotum chez les hommes , comme elles le sont dans

l'épaisseur des grandes lèvres chez les femmes.

Des testicules.

Les testicules, au nombre de deux, sont situés dans le scrotum, séparés l'un de l'autre par l'adossement des deux sacs que forme le dartos qui leur fournit l'enveloppe la plus extérieure après la peau. Les testicules sont d'ailleurs enveloppés d'une tunique nommée vaginale, qui appartenoit dans les premiers temps au péritoine, & d'une tunique propre plus dense & plus blanche, nommée albuginée, laquelle enveloppe les vaisseaux des testicules. La tunique vaginale est contigüe à l'albuginée, & elles sont l'une & l'autre arrosées par un fluide limpide, qui quelquefois s'accumule en très-grande quantité, & forme l'hydrocèle par épanchement.

Dans les premiers temps de la conception, & jusqu'au septième mois de la gestation, les testicules sont encore renfermés dans le bas-ventre, hors du péritoine qui les enveloppe en partie, & situés dans la région lombaire, sur le muscle psoas près des reins. Ce n'est qu'après cette époque qu'ils franchissent l'anneau inguinal, pour descendre dans le scrotum. C'est à cette époque que se forme la hernie congénitale, dont quelques anatomistes expliquent le mécanisme de la manière suivante.

Les testicules ayant pris de l'accroissement, ils entraînent le péritoine, auquel ils sont adhérents, dans le scrotum &c.; de leur-marche résulte un conduit plus ou moins large, communiquant de l'intérieur du bas-ventre aux testicules, lequel s'oblitére bientôt après leur chute. Si cette ouverture ne se ferme pas au terme fixé

par la nature, une portion d'intestin, l'épiploon, ou même ces deux parties ensemble pourront former hernie, ne trouvant alors aucune résistance à leur descente. Ce mécanisme, déduit de la disposition des parties, sert à rendre raison des moyens que la nature emploie pour former la hernie congénitale, comme nous le dirons en temps & lieu. Si avant la naissance, les testicules ne sont point descendus, leur chute pourra être plus ou moins retardée; & les accidents pourront faire prendre le change pour une hernie, aux personnes peu habituées à observer ces vices de conformation.

Des hernies en général.

Sous le nom de hernie, on a compris un grand nombre de maladies ou d'infirmités, que leur diversité ne permet point d'affimiler, ni de con-

fondre. Pris dans sa signification la plus étroite , & par conséquent la plus vraie , ce mot signifie le déplacement des parties molles , & leur sortie à travers d'autres parties plus solides , destinées par la nature à les renfermer & les contenir avec soin. Par conséquent tout déplacement contre nature , avec ou sans tumeur sensible , des intestins , de l'épiploon , du foie , de la rate , de la matrice , des ovaires , du vagin , de la vessie , du *rectum* , du cerveau même , &c. , vient se placer sous la dénomination générale de hernie. Mais ce n'est que par le plus étrange abus de ce mot , qu'on a pu l'étendre au spermatocèle , au varicocèle , au cirrocèle , au sarcocèle , à l'hydrocèle , & même au bronchocèle des anciens , vulgairement connu sous le nom de goëtre , &c.

Les mots rupture & descente , quoiqu'à certains égards synonymes de

celui de hernie, ont une signification moins étendue : l'usage les a restreints à signifier le déplacement, la sortie des parties molles contenues dans l'abdomen, à travers les ouvertures naturelles ou accidentelles des parois qui circonscrivent cette capacité. C'est à bien déterminer les diverses espèces de déplacement comprises sous la dénomination de descente, à marquer avec le plus d'exactitude qu'il nous sera possible, les secours de tout genre qu'elles exigent de la part des Chirurgiens herniaires, à diriger enfin les personnes peu versées dans cette matière, & les malades eux-mêmes dans l'administration de ces secours, &c., que ce précis est destiné : nous tâcherons d'y réunir, dans le moindre espace possible, les notions les plus essentielles aux unes & aux autres. Souvent nous puiserons dans les écrits des grands maîtres ; quelquefois aussi nous

oferons nous aider de notre expérience particulière, soit pour confirmer, soit pour éclaircir & modifier les excellents préceptes qu'il nous ont laissés.

Différences des hernies.

Les hernies diffèrent entr'elles , à raison du lieu qu'elles occupent , des parties qui les forment & de la quantité du déplacement. A raison du lieu que la partie déplacée occupe , les hernies ont été nommées épigastriques ou hernies de l'estomac , lorsqu'elles sont placées dans quelques-uns des points de l'espace triangulaire , compris entre le *sternum* & les bords arrondis des fausses-côtes. Les hernies , qui se forment autour du nombril , sont appelées ombilicales ou exomphales ; celles des anneaux ou du pli des aînes , bubonocèles ou inguinales ; celles du haut de la cuisse , ou de l'espace com.

pris entre la tubérosité des os pubis ; & l'épine antérieure & supérieure des os des iles, ont reçu le nom de crurales. Enfin l'on appelle ventrales toutes les hernies qui occupent quelques-uns des points de l'abdomen , autres que ceux dont on a parlé. Il est encore d'autres espèces de hernies, mais plus rares que les précédentes qui tirent aussi leur nom du lieu qu'elles occupent : telles sont celles du trou ovalaire , de l'échancrure sciatique , du périné , du vagin , qu'on appelle vaginales.

Enfin quelques auteurs ont mis au nombre des hernies le passage dans la poitrine à travers le diaphragme , de l'estomac , d'une portion plus ou moins considérable de la masse intestinale ; l'introduction d'un segment d'intestin dans la matrice, après l'opération césarienne , ou la rupture spontanée de ce viscère dans les efforts

de la délivrance ; enfin les intus-susceptions inflammatoires des intestins, qu'on fait être une des causes de la passion iliaque ou colique de *miserere*.

On voit par ce qui vient d'être dit ; que les parties , dont le déplacement peut former des hernies , sont en grand nombre ; celles qu'on distingue , comme les plus sujettes au déplacement , sont les intestins , l'épiploon , la vessie , les ovaires , la matrice , le foie , la rate , &c.

Les hernies ont reçu des noms particuliers , à raison des parties qui les constituent : celles qui sont formées par l'intestin , s'appellent intestinales ou entérocéles ; l'on donne le nom d'épiploïques ou épiplocèles aux tumeurs de ce genre , formées par le déplacement & l'issue de l'épiploon ; & lorsque l'intestin & l'épiploon forment ensemble & sont contenus dans le même sac , on appelle cette es-

pèce de hernie entero - epiplocèle ; ou hernie intestinale épiploïque. Cette nomenclature se compose de même, à raison des autres parties susceptibles de former des hernies, par leur sortie ou du moins par les éminences qu'elles forment à la surface des parois de l'abdomen, ou dans quelque'une des cavités qui l'avoisinent & en dépendent : par exemple, lorsque les intestins, l'épiploon, ou quelque'autre partie fait bomber dans le vagin l'une de ses parois, on appelle cette dernière espèce de hernie, vaginale.

Les hernies formées par la matrice, le vagin, le rectum, sont plus communément appelées descentes ou chûtes, en y joignant le nom de la partie déplacée : chûte de matrice, de vagin, de rectum ou du siège. A raison du degré de faillie que les parties déplacées font à la surface du corps, on a distingué les hernies en

incomplètes & complètes : elles sont incomplètes lorsqu'elles forment à peine une éminence sensible au-dessus de la partie qui leur livre passage , & complètes quand le déplacement & l'élévation sont considérables. Ainsi la hernie inguinale est réputée incomplète , lorsqu'elle ne dépasse pas les aînes , & complète lorsqu'elle se prolonge , chez les hommes jusques dans le *scrotum* , & chez les femmes dans les grandes lèvres. Cette dernière espèce de hernie étoit jugée impossible du temps de Blégny , & nous lui devons d'en avoir constaté la possibilité par une observation faite sur

» la personne d'une femme nouvel-

» lement accouchée , à qui *il remit*

» l'intestin qui étoit tombé dans la

» lèvre gauche , & où il faisoit une

» tumeur au moins de la grosseur du

» poing «.

Une différence encore plus importante

tante des hernies se tire de la plus ou moins grande disposition que les parties conservent à reprendre leur situation naturelle, & sur-tout de la possibilité ou de l'impossibilité de les réduire. Les hernies qui rentrent d'elles-mêmes, ou que la main du Chirurgien peut faire rentrer facilement, sont appelées libres ou mobiles, & celles qui se refusent à toute réduction, *arrêtées* ou immobiles.

Les hernies se divisent encore en celles qui sont précédées du péritoine, ou ce qui est la même chose, en celles où les parties déplacées sont contenues dans une enveloppe ou poche, appelée sac herniaire, & en celles où les parties se présentent à nud sous les téguments communs. Enfin, on divise ces tumeurs en récentes & en anciennes, douloureuses & indolentes, enflammées ou suppurées, étranglées ou sans étranglement. On peut

négliger d'autres différences de moindre importance , & se dispenser de diviser avec quelques anciens auteurs, en grandes & petites, dures & molles, rondes & longues , hautes & basses , &c.

Des causes des hernies.

Les causes des hernies sont naturelles ou accidentelles. Les causes naturelles sont certaines dispositions extraordinaires des parties qui se déplacent , & de celles qui permettent , favorisent ou déterminent le déplacement. Ce sont ces dispositions à la hernie , ces causes prédisposantes que les parens transmettent aux enfans, avec leur stature, leur conformation, leurs traits, leurs goûts, leurs penchans , leurs habitudes , &c.

En effet , les hernies doivent être mises au nombre des maladies héréditaires.

ditaires ; non que les parens transmettent réellement les hernies, mais ils communiquent à leurs enfans une conformation propre à leur donner naissance, & c'en est sans doute assez, pour qu'on soit autorisé à ranger les hernies parmi les infirmités qui se propagent d'une génération à celles qui la suivent. Sur cent personnes nées de parens exempts de hernies, à peine en trouveroit-on une seule atteinte de cette infirmité, tandis que, selon nos observations, dans un pareil nombre de sujets nés de parens *hernistes* ou *hargneux*, on en rencontreroit plusieurs, affectés de la même défecuosité.

Les causes accidentelles des hernies sont internes & externes. Les premières comprennent tout ce qui peut relâcher & procurer l'allongement des parties contenant, dilater leurs ouvertures, ou permettre aux parties

contenues de se pratiquer des issues à travers les lieux les moins résistans de l'abdomen. La surabondance de la sérosité , l'embonpoint excessif , le passage , sur-tout subit , de l'embonpoint à l'extrême maigreur , &c. , peuvent être rapportés à ce premier genre de causes des hernies. L'influence des choses non-naturelles sur la production des hernies, quoique éloignée , n'en est pas moins réelle. Ainsi l'on peut regarder comme des causes qui concourent plus ou moins efficacement à la formation des hernies , l'air humide & épais , le séjour continué dans des lieux marécageux, les alimens huileux, gras , muqueux , &c. Les derniers produisent deux mauvais effets : ils relâchent les solides & fournissent une grande quantité d'air , qui s'accumulant dans les intestins trop dépourvus de ressort, pour s'en débarrasser par les voies ordinaires, cherche

à s'échapper par les lieux les moins résistans de l'abdomen , le plus ordinairement par ses ouvertures naturelles, chasse devant lui les parois du canal qui le renferme, le pousse au dehors, & forme la hernie. Les herbes, les fruits très-visqueux, les pois, les haricots, la bière, le cidre, le poiré, &c., agissent de cette manière. Voilà pourquoi ce genre d'alimens est si contraire aux personnes actuellement atteintes de hernie. La vie trop sédentaire, en faisant perdre le ressort aux fibres des tégumens communs & propres de l'abdomen, les dispose à céder au moindre effort des parties qui tendent à s'échapper de la cavité qui les renferme. L'excès du sommeil produit le même effet : il épuise les forces & relâche les solides, sur-tout lorsqu'il est accompagné de sueurs ou seulement d'une moiteur légère. On peut aussi mettre au

nombre des causes des hernies, les évacuations ordinaires diminuées ou considérablement augmentées; le volume des viscères abdominaux, développé d'une manière vicieuse par une cause quelconque, dans un court espace de temps; l'hydropisie, la grosseffe; la situation debout ou à genoux, habituelle & trop long-temps soutenue, sur-tout cette espèce de flexion du tronc qui l'amène, & le retient dans la position qui fait un angle droit avec les extrémités inférieures, attitude fort ordinaire à certains ordres religieux, parmi lesquels les hernies sont très-communes. Cette position détermine d'autant plus facilement la sortie des parties molles hors de l'abdomen, qu'on fait aujourd'hui à n'en pouvoir douter, que c'est toujours durant la flexion & le relâchement des muscles abdominaux, accompagnée de l'action simultanée des mus-

cles de tout l'individu, que les parties mobiles franchissent les barrières qui les renfermoient.

On met communément au nombre des causes externes des hernies, les coups portés sur l'abdomen, les plaies pénétrantes de cette capacité, les chûtes sur les pieds & sur les genoux, les sauts & les courfes forcées, les secousses d'un cheval qui trotte rudement, les inspirations violentes & soutenues, comme dans la toux, le chant, les cris, l'action de donner du cor & des autres instrumens à vent, l'accouchement laborieux, les efforts pour déplacer, soutenir ou porter dans une attitude inclinée des corps pesants, pour chasser les urines ou les gros excréments, &c.

Des signes des hernies.

Les signes des hernies sont com-

muns & propres , & les uns & les autres commémoratifs ou diagnostics. Nous ne parlerons que des signes communs à toutes les hernies , réservant les signes propres pour la section où nous parlerons de chaque espèce de hernie en particulier.

Les signes commémoratifs communs se tirent de la manière dont la tumeur s'est formée , du temps qu'elle a mis à se former , des changemens survenus à l'économie animale pendant sa formation , des lésions de fonctions qui l'ont accompagnée , enfin de l'absence des signes propres aux autres espèces de tumeurs , &c.

Les signes diagnostics communs des hernies sont , une tumeur plus ou moins ronde & circonscrite , sans altération de couleur à la peau , sans douleur , sans dureté , survenue tout-à-coup durant ou après un effort ,

une toux violente, une attitude gênée, les muscles abdominaux étant fléchis, ou fléchis d'un côté & tendus de l'autre, placée sur les ouvertures naturelles des parois abdominales, ou en d'autres endroits de cette capacité, comme dans l'étendue des aponeuroses des muscles abdominaux, vers la ligne blanche, sur-tout aux environs de l'ombilic, enfin dans toute l'étendue de ces muscles, principalement s'ils ont souffert précédemment des coups violents, des plaies pénétrantes, de grands abcès, des alongemens & des distentions contre nature, &c.

Quelquefois la tumeur herniaire se forme lentement & sans causer de lésion sensible dans les fonctions. D'autres fois elle produit de petites douleurs momentanées, principalement lorsque la personne se mouche, tousse, marche, se tient à genoux, ou

debout trop long-temps, fait effort pour chasser les excréments, les urines, &c. Communément cette tumeur rentre d'elle-même, lorsque le malade reste long-temps couché sur le dos, ou qu'il la touche dans cette position, même sans avoir le dessein de la faire rentrer. Alors, si c'est l'intestin qui forme la hernie, le malade sent une sorte de *gargouillement*, quelquefois même il entend un petit bruit, causé par l'air & par les autres matières fluides, qui se déplacent. La hernie reparoît avec la même facilité qu'elle avoit trouvée à rentrer, dès que le malade est debout & fait quelques pas. Le volume de la hernie varie perpétuellement : il est à peine sensible lorsque le malade évite la position perpendiculaire, fait peu d'exercice, évite les congestions d'alimens ou d'excréments, tandis que la fatigue, la marche, les efforts, &c. ;

la rendent considérable. Le doigt, appliqué sur la tumeur, éprouve une percussion plus ou moins forte, lorsque le malade touffe. Enfin dans l'examen qu'on fait de cette tumeur, on reconnoît sans peine qu'elle n'est pas appliquée, si l'on peut ainsi parler, à la partie sur laquelle elle repose, mais qu'elle n'est que juxtaposée, qu'elle vient du dedans & s'y continue.

Des différentes espèces de hernies.

De la hernie inguinale.

La hernie inguinale, ou bubonocèle, est une tumeur formée à l'aîne par une ou plusieurs des parties molles placées dans l'abdomen, qui s'en échappent par les ouvertures des muscles obliques externes du bas-ventre. Quoique plus fréquente chez les hommes que chez les femmes, la

hernie inguinale ne laisse pas de se rencontrer chez ces dernières. Cette hernie peut rester cantonnée dans l'aîne, & pour lors elle retient le nom de bubonocèle ; ou descendre dans les bourses chez les hommes, & dans les grandes lèvres chez les femmes : chez les hommes elles prennent le nom d'oschéocèles ou hernies complètes.

Le plus ordinairement la hernie inguinale est formée par les intestins, sur-tout par l'iléon & le colon. On a quelquefois trouvé dans le sac herniaire des prolongemens ou appendices semblables à celle qui est particulière au colon. L'anatomie pathologique n'a pas encore décidé si ces prolongemens sont *congenits*, c'est-à-dire, dépendants de la première conformation, ou s'ils sont un des effets de la maladie. Gunz, d'après Mery, qui le premier fit mention de ces appendices, pense qu'il n'est pas hors de

la vraisemblance , que la paroi d'un intestin, pincée & serrée par le sac herniaire , s'amincisse , s'allonge & forme une appendice en tout semblable à celles que Ruyfch a trouvées sur l'iléon , & qu'il a jugées susceptibles de s'échapper hors de l'abdomen , & de former une hernie. Il est d'autres parties qui quelquefois accompagnent l'intestin dans sa sortie, telles que l'épiploon, un testicule, un ovaire, la vessie , &c. , dont le concours embarrasse le diagnostic, & semble exiger des précautions particulières dans la réduction.

Les causes de cette hernie étant les mêmes que celles dont on a parlé plus haut , passons aux signes qui la caractérisent. L'intestin peut n'être que pincé par l'une de ses parois entre les deux piliers des muscles obliques, (& c'est le cas le plus ordinaire,) franchir ce détroit, faire saillie au dehors, &

former une tumeur plus ou moins considérable , à raison de la quantité d'intestin sortie , & des matières qui le distendent. Cette tumeur est ronde ou allongée , mais assez ordinairement elle se renfle , elle grossit à mesure qu'elle s'éloigne de l'anneau qui lui livre passage. Elle est communément lisse , lorsque la portion d'intestin sortie est distendue par les vents ; elle grossit & se tend pendant que le malade touffe ; lorsque ce sont des matières fécales fluides qui remplissent l'intestin sorti, la tumeur retient passagèrement l'impression des doigts qui la touchent , tandis qu'elle ne reçoit pas même ces impressions , lorsque les matières fécales enfermées dans l'anse , sont endurcies & solides. La hernie inguinale rentre communément tout à la fois , à moins qu'elle ne soit très-volumineuse , & fait entendre un bruit particulier , accompagné

de borborygmes produits par les vents & autres matières retenues qui se déplacent, pour aller occuper des lieux où la résistance est moindre, que dans ceux qu'ils abandonnent. Les coliques, les vents qui s'échappent par la bouche, les digestions laborieuses, &c., ajoutent à la preuve que l'intestin forme la hernie & complètent le diagnostic. Les accidents sont les mêmes, mais moins considérables, lorsque le canal intestinal n'est que pincé par les piliers des muscles abdominaux.

La hernie, formée par l'épiploon, offre une tumeur plus ordinairement oblongue que ronde, molle, quelquefois pâteuse, d'autant plus difficile à réduire, que repoussée doucement, la portion graisseuse, sortie, s'applatit contre les bords de l'anneau, & par ce changement de forme rend la réduction plus ou moins difficile,

quelquefois même impossible , dans les premières tentatives. Ici la rentrée des parties dans l'abdomen n'est point accompagnée de ce bruit particulier qui suit celle de l'intestin. Enfin l'épiplocèle n'est pas moins difficile à contenir qu'à réduire.

De la combinaison des signes propres à ces deux espèces de hernie , résulte le diagnostic de la hernie intestinale-épiploïque ou entéro-épiplocèle. Celle-ci semble avoir cela de particulier qu'elle produit des tiraillemens d'estomac , de petites nausées , un sentiment de défaillance , dont les retours sont également importuns & fréquens , &c.

De la hernie congénitale.

La hernie inguinale , qu'on appelle de naissance ou congénitale , se distingue difficilement de l'oscécèle

ordinaire. » Elle ne diffère des autres
 » hernies inguinales & scrotales, qu'en
 » ce que la portion d'intestin ou d'é-
 » piploon, échappée, est dans un con-
 » tact immédiat avec le testicule, ou
 » encore , parce que l'intestin sorti
 » est renfermé dans le même sac que
 » le testicule, recouvert seulement de
 » sa membrane albuginée, tandis que
 » dans les cas ordinaires , chacune de
 » ces parties est renfermée dans un sac
 » particulier qui n'a rien de commun
 » avec le sac voisin , c'est-à-dire, l'in-
 » testin dans le sac herniaire , & le
 » testicule dans la tunique vaginale «.

La hernie congénitale entrevue , à ce
 qu'il semble , dans le siècle dernier,
 n'a été bien connue qu'après le milieu
 de celui-ci ; mais il n'en résultoit pas
 un grand inconvénient , puisque les
 nouvelles connoissances acquises à
 cet égard n'ont rien changé dans la
 pratique. Au défaut de signes vrai-

ment caractéristiques de cette espèce de hernie , on peut être conduit à soupçonner sa nature par la considération qu'elle existoit au moment de la naissance ou peu de jours après ; que son apparition a suivi de près la descente du testicule ; qu'elle a passé rapidement de l'état de bubonocèle à celui d'oschéocèle ; enfin par l'impossibilité , ou la très-grande difficulté , de distinguer au tact , dans cette tumeur , le testicule , des autres parties contenues dans le même kiste , tandis que dans les hernies ordinaires , on sent toujours très-distinctement le testicule à la partie inférieure & postérieure de la tumeur herniaire. (Voyez plan. II. lettre G).

De la hernie de vessie ou cystocèle.

La hernie formée par la vessie , échappée à travers les anneaux des

muscles de l'abdomen, la plus fréquente de toutes les issues que ce viscère affecte, se reconnoît à la rondeur que prend la poche soumise à la vue & au tact, par l'accumulation des urines; à la fluctuation qui s'y manifeste; à l'instabilité de son volume qui diminue considérablement par la compression exercée sur la tumeur, pendant que le malade rend ses urines, qui, malgré le secours de la main, ne sortent souvent que goutte à goutte lorsque la hernie est considérable. La vessie peut former seule la hernie, ou se joindre aux autres parties qui la forment : ainsi on l'a trouvée dans des hernies inguinales, crurales, vaginales, périnéales, accompagnant les divers organes qui constituent ordinairement ces sortes de descentes.

De la hernie crurale.

La hernie crurale est plus ordinaire

aux femmes qu'aux hommes (comme l'inguinale l'est davantage aux hommes qu'aux femmes). Elle est principalement caractérisée par sa position au pli de la cuisse , par son moindre volume , & par les signes communs à toutes les espèces de hernies. Lorsqu'elle est sans accident , on pourroit la confondre avec certains engorgemens glanduleux , très-communs dans le lieu qu'elle occupe. Ici les parties s'échappent par l'angle interne de l'arcade formée par le ligament de Poupart , (rarement par une fente pratiquée dans les fibres musculaires les plus voisines de ce ligament ,) & se portent dans le tissu cellulaire qui environne les vaisseaux cruraux , qu'elles recouvrent quelquefois , & que d'autre fois , elles laissent tantôt au côté interne , & tantôt à l'externe. Dans ce dernier cas , la hernie crurale peut se trouver si voisine de l'anneau , qu'on

la confonde avec la hernie inguinale. Il faut que la grosseur soit une cause bien puissante de la hernie crurale; puisque sur vingt femmes attaquées de hernie, il y en a dix-neuf, selon Arnaud, dont la hernie est crurale; tandis que de cent hommes ou cent femmes non mariées, on n'en trouve pas un avec cette espèce de hernie. Outre les signes communs à toutes les hernies, la crurale, par la pression qu'elle exerce sur les vaisseaux fémoraux, sur-tout quand c'est l'épiploon qui la forme, peut produire divers accidens à la cuisse : tels qu'insensibilité, pesanteur, édématié, difficulté de mouvement, &c.

De la hernie ombilicale.

On donne le nom de hernie ombilicale au déplacement des parties molles, dont l'issue forme une tu-

meur , tantôt ronde , & tantôt allongée & presque cylindrique , autour ou dans l'anneau même de l'ombilic : dans l'adulte les parties s'échappent ordinairement de la première manière , & chez les enfans nouveau-nés , de la seconde. Ces dernières hernies , c'est-à-dire , celles qui se font par l'anneau ombilical , ont quelquefois manqué ou paru manquer de sac herniaire. Les parties , qui forment ces hernies , sont le jéjunum & le colon , ensemble ou séparément , & presque toujours l'épiploon , au moins chez les adultes , placé pour l'ordinaire à la partie antérieure de la tumeur. Aux signes communs des hernies , se joignent dans celles-ci , de petites douleurs de colique après le repas.

Des hernies ventrales.

Toutes les hernies répandues sur

la surface de l'abdomen, excepté l'ombilic, l'anneau & l'arcade crurale, sont appellées ventrales. Ces hernies sont plus rares que les précédentes, & quelquefois sans poche qui les renferment, comme lorsqu'elles succèdent aux grandes plaies de cette région, à certaines opérations, &c. ; celles que la grosseffe détermine, sont ordinairement pourvues d'un sac herniaire. Il y a même de ces hernies, comme par exemple, celles qui sont le produit d'un coup, d'une violence extérieure sur quelque point de l'abdomen, qu'un triple sac environne, le péritoine, les muscles & la peau. Ces hernies, pouvant occuper toutes les régions du bas-ventre, peuvent recevoir aussi toutes les parties qu'il renferme : on a trouvé, dans ces sortes de tumeurs, outre les intestins & l'épiploon, le foie, la rate, l'estomac, la matrice, &c.

Parmi les hernies ventrales, celles qui arrivent entre l'ombilic & le cartilage xiphoïde, ont pris le nom particulier de hernies de l'estomac. Cette dénomination semble pécher en ce qu'elle pourroit donner lieu de croire, que l'estomac est véritablement contenu dans toutes les hernies de ce nom. Ordinairement elles occupent la ligne blanche, quelquefois ses côtés, & plus communément le côté gauche. Tout ce qui peut occasionner une distention forte, un écartement léger des fibres musculaires, est susceptible de produire cette hernie : ainsi, un renversement subit des épaules, un effort violent pour vaincre un obstacle, soulever ou porter un fardeau, le corps sur-tout étant renversé en arrière, le vomissement, la toux, un coup, une chute sur la région épigastrique &c., sont les causes les plus fréquentes des hernies d'estomac.

Ordinairement

Ordinairement le volume de ces hernies est peu considérable, rarement excède-t-il la grosseur d'une olive, dont il prend la forme. Quelquefois les parties ne sont que pincées, & alors la tumeur n'est pas sensible à l'œil. Cette dernière circonstance rend le diagnostic si difficile, qu'on peut ici se méprendre. En général, lorsqu'on observe le mal-aise & les autres accidents de l'étranglement, & l'obstination de ces mêmes accidents sans cause manifeste, on doit soupçonner cette espèce de hernie, & parcourir, (le malade étant debout), toute la capacité de l'abdomen pour la reconnoître, & le situer ensuite convenablement pour la réduire. Cette hernie est presque toujours accompagnée de douleurs, de tiraillemens, quelquefois d'une extrême sensibilité à la région de l'estomac. La digestion est toujours dérangée, & les malades

font quelquefois tourmentés de hoquets, de nausées, & même de vomissement. Si, comme on a lieu de le croire, les parties pincées sont les intestins, l'épiploon, il faut au moins que l'estomac soit affecté par sympathie. La hernie dorsale est trop rare, & par conséquent trop peu connue, pour qu'on puisse en parler d'une manière utile à la classe de lecteurs qu'on a principalement en vue dans cet écrit. Nous en disons autant des hernies de la poitrine.

De la hernie vaginale & de la chute du vagin.

On appelle hernie vaginale, une tumeur formée à l'un des côtés du vagin, & rarement au milieu de sa face antérieure ou postérieure, par la présence d'une portion d'intestin, plus ou moins considérable. La connois-

fance de cette espèce de hernie est une découverte moderne, dont on fait honneur à Garangeot. L'intestin, l'épiploon, la vessie elle-même, qui forment ordinairement ces hernies, descendus auprès du vagin, distendent ses tuniques, & leur font faire saillie dans l'intérieur de ce canal. Quoique la hernie vaginale attaque ordinairement les femmes qui ont eu des enfans, on en connoît des exemples chez les filles dont on ne pouvoit soupçonner la vertu. La formation de ces hernies est quelquefois subite, & quelquefois lente & graduelle. Les signes les plus constans, & les plus caractéristiques de cette hernie sont les suivans : elle devient dure, grosse, tendue & rénitente, quand la malade touffe ou se tient long-temps debout ou retient son haleine ; elle diminue ou disparoît entièrement, lorsque la personne reste

long-temps couchée sur le dos. On la réduit avec la plus grande facilité, mais elle reparoît dès qu'on cesse la pression ; enfin un signe qui n'a lieu que lorsque la vessie est au nombre des parties déplacées , c'est la difficulté souvent même l'impossibilité que les malades éprouvent de rendre les urines dans une autre position que couchées sur le dos.

Dans des temps où la chirurgie étoit moins éclairée , on a dû souvent confondre la hernie vaginale avec la chute du vagin, qui n'est souvent que le relâchement & la prolongation de la tunique interne de ce canal membraneux. Aujourd'hui l'on ne sauroit confondre ces deux maladies , surtout en joignant aux signes décrits plus haut, les considérations suivantes. La hernie vaginale se manifeste subitement, pour l'ordinaire à la suite d'un effort ; la chute du vagin survient

peu - à - peu : la première est accompagnée de plusieurs accidents, de tiraillemens , de coliques , &c. ; la seconde ne fait rien éprouver de semblable , à moins que toute la membrane interne du vagin ne se renverse ; mais alors la tumeur ressemble à un boudin , perforé dans son milieu.

De la descente de matrice.

Comme le vagin , la matrice peut éprouver certains dérangemens, qu'on a placés parmi les descentes ou hernies. Les moyens destinés par la nature à fixer ce viscère devenus trop foibles pour remplir leur destination , il descend peu-à-peu, s'insinue de plus en plus dans le vagin , & vient quelquefois se montrer à la vulve , en partie ou en totalité : ce dernier cas est aussi rare, que le premier est commun. La matrice peut aussi se renverser , de sorte que son fond s'échap-

pant par son orifice externe, sa face interne devient la face externe de la tumeur qu'elle forme dans le vagin. On a donné à ces dérangemens divers les noms de descente incomplète ou relaxation, descente complète ou précipitation, & renversement.

La descente incomplète forme dans le vagin une tumeur plus ou moins molle, alongée, plus large en arrière qu'en devant, où l'on sent une ouverture transversale. Lorsque le col, où se trouve cette ouverture, se montre à la vulve, la descente est complète. Le renversement de matrice suit ordinairement l'accouchement, & se fait tout-à coup, ce qui le rend mortel, si la réduction n'en est faite aussi-tôt. Il y a pourtant des renversemens graduels & lents, mais ceux-ci même sont censés avoir commencé immédiatement après l'accouchement ou l'évacuation des eaux dans l'hy-

dropisie de matrice. On a vu de ces matrices renversées , abandonnées à elles-mêmes , descendre jusqu'à la partie moyenne des cuisses. Alors le désordre est extrême, & la vessie elle-même participe au déplacement.

Sans accuser ici le relâchement des ligamens, qu'il seroit difficile de prouver, tout vrai qu'il peut être, nous dirons que les causes les plus ordinaires de ces déplacements, sont les accouchemens laborieux, l'arrachement du placenta, des polypes, des efforts violents, les corps baleinés trop ferrés, l'excessif embonpoint, les fleurs blanches &c.

De la hernie obturatrice.

Il est une hernie aussi difficile à reconnoître qu'à réduire, c'est l'obturatrice ou hernie du trou ovalaire. On lui donne ce nom, parce que les

parties déplacées, suivant la route des vaisseaux obturateurs, sortent avec eux du bassin, par la partie supérieure du trou ovalaire. C'est à la chirurgie moderne, & notamment à M. Garengéot, que nous devons la connoissance de cette infirmité. Quoiqu'elle soit fort rare, elle a dû coûter la vie à bien des individus, car on ne sauroit douter qu'elle ne soit aussi ancienne que l'espèce qu'elle afflige. Les parties qu'on a trouvées dans cette hernie, sont les intestins, l'épiploon, la vessie.

Cette hernie n'a été vue qu'une fois chez l'homme : elle est moins rare chez les femmes, sur-tout après l'accouchement. La tumeur, qu'elle forme, est ordinairement ronde, inégale & peu volumineuse. On la distingue de la hernie inguinale, la seule avec laquelle elle ait quelque rapport de situation, par le lieu précis qu'elle occupe, qui répond aux bourses. Si

la hernie inguinale & la crurale se présentent quelquefois dans le même endroit, elles n'en naissent point, & l'on peut les reconnoître en les suivant jusqu'à leur sortie de l'abdomen.

De la hernie périnéale.

La hernie du périné est encore une maladie ignorée de nos pères ; les modernes eux-mêmes ne l'ont reconnue que depuis environ un siècle. Elle attaque les deux sexes, plus communément les hommes, rarement les filles, & presque jamais les femmes qui ont fait des enfans : chez ces dernières, au lieu d'être périnéale, elle devient vaginale. Les intestins, l'épiploon & la vessie peuvent former cette espèce de tumeur. Les deux premiers se glissent entre le *rectum* & la vessie, dans l'homme, & entre le *rectum* & le vagin chez la femme, descendent

à la région la plus basse du bassin , & vont se montrer au périnée près de l'ouverture de l'anus , sur l'un des côtés du raphé, & rarement au milieu.

Les hernies du périnée se forment ordinairement peu-à-peu ; car il est difficile que l'intestin puisse en un moment parcourir un aussi long espace que celui du bas-ventre au périnée.

De la réduction des hernies.

La réduction est une opération de la main , par laquelle on fait rentrer les parties sorties dans la cavité qu'elles avoient quittée. Il seroit également long & difficile d'assigner les règles particulières qui doivent guider le Chirurgien dans cette opération : quant aux règles générales , après avoir vidé les intestins au moyen des lavemens , & fait uriner le malade , on le place ordinairement sur le dos ,

la tête fléchie sur la poitrine, les cuisses & les jambes également fléchies, les hanches un peu élevées, & le corps légèrement incliné sur le côté opposé à la hernie. Dans la réduction on doit diriger les parties, de manière à leur faire parcourir la même route qu'elles ont tenue en sortant. Ainsi dans la hernie inguinale, l'impulsion se fait vers les hanches; dans la crurale, presque parallèlement à l'axe du corps, & dans les hernies ombilicales & ventrales, perpendiculairement à ce même axe.

Avant de procéder à la réduction, on manie doucement la hernie, avec l'extrémité des doigts, pour augmenter la fluidité des matières contenues dans l'intestin; on la pousse ensuite graduellement avec les doigts d'une main, pendant qu'avec l'autre, on ramasse les parties les plus éloignées, & on les rapproche de l'ab-

domen; c'est-à-dire, que la main la plus voisine du corps, dirige & soutient la portion d'intestin sortie à mesure qu'elle rentre; tandis que l'autre main, par une impulsion légère & bien ménagée, amène vers l'anneau le reste de l'intestin. Le soulagement instantané du malade, & quelquefois un certain mouvement suivi de borborygmes & d'un bruit particulier, toujours sensible au malade, & souvent même à l'oreille du Chirurgien, annoncent que l'intestin a repris son ancien domicile. Dès-lors, les accidents cessent pour l'ordinaire; s'ils continuent un ou deux jours après la réduction, c'est que l'intestin étoit enflammé, & que ce n'est qu'après cet espace de temps qu'il reprend son état naturel. Une ou deux onces d'huile d'amandes douces, données au malade, immédiatement après la réduction, procurent le double avantage

d'évacuer les matières retenues, devenues âcres, tant par leur séjour, que par la chaleur extraordinaire de l'intestin qui les renferme, & de fournir la certitude que l'intestin rentré dans l'abdomen a repris ses fonctions. A la vérité l'huile pourroit passer, quoique l'intestin fût encore pincé, mais alors le malade ressentiroit une douleur plus ou moins vive dans le lieu du pincement.

Pour réduire la hernie crurale, on fait rentrer, comme on l'a dit, les vents & les autres matières fluides, en comprimant légèrement & par intervalles la tumeur, dans toute sa circonférence, & de temps en temps, s'il est possible, la retirant un peu au dehors; enfin on fait rentrer l'intestin lui-même, en le dirigeant parallèlement, ou un peu obliquement, à l'axe du corps.

Dans la réduction des hernies om-

bilicales & ventrales , on réunit aux procédés décrits ci-dessus , de petits mouvemens demi-circulaires , & une impulsion perpendiculaire à l'axe du corps.

Par les procédés qu'on vient de décrire , diversément combinés , on obtient la réduction de toutes les hernies , sur-tout lorsqu'elles sont nouvelles , peu volumineuses , sans inflammation , que le sujet est jeune , &c. ; mais il en est qu'on ne sauroit réduire ainsi , à cause des obstacles divers qui s'opposent à leur rentrée. Parmi ces obstacles , les plus ordinaires sont : 1°. Le volume considérable & l'ancienneté de la hernie. 2°. Son étranglement inflammatoire , je veux dire , l'inflammation de l'intestin étranglé , qui augmente son volume , en même-temps qu'elle le prive de sa souplesse & de sa *lubricité* , propriétés infiniment favorables à la réduction. 3°. L'engoue-

ment sans inflammation, c'est-à-dire, l'accumulation & la stagnation d'excrémens plus ou moins solides dans l'anse d'intestin qui forme la hernie, & dans le segment supérieur du même canal qui répond à celle-ci. 4°. Enfin les adhérences, suite ordinaire de l'ancienneté & du volume considérable des hernies, sur-tout chez les vieillards & les sujets de tout âge, qui ont négligé de les contenir. Les trois premiers genres d'obstacles peuvent être vaincus quelquefois par le concours de la main & des médicamens, mais le quatrième ne peut être levé que par l'opération.

De la cure des hernies.

Soit qu'on se propose la cure radicale des hernies, ou qu'on n'ait en vue que la cessation des accidents, la première intention du Chirurgien

est toujours de faire rentrer les parties dans le lieu qu'elles ont quitté. Lorsqu'on ne peut les réduire par le taxis, on passe à l'opération; non dans la vue de guérir la hernie, car l'opération produit rarement cet effet, mais dans l'intention de faire cesser les accidents & de sauver les malades, menacés alors du plus pressant danger.

Ce petit ouvrage étant principalement destiné à l'instruction des personnes atteintes de hernie, & tout au plus aux élèves en chirurgie, nous nous écarterions de notre but en décrivant les divers procédés opératoires employés dans la vue de guérir radicalement les hernies, soit qu'on profite de l'incision faite aux tégumens, dans la nécessité de réduire les parties, afin de prévenir la mort, soit qu'on pratique cette même incision sans nécessité & dans la seule vue de rendre possible l'application des moyens dont

on attend la guérison, comme l'ont pratiqué les anciens Chirurgiens, & Maget parmi les modernes.

Quelque méthode qu'on emploie pour guérir radicalement les hernies, on suppose toujours l'intestin réduit. On a cherché cette guérison dans les topiques, les remèdes généraux & l'instrument tranchant, aidé de la ligature, du caustique, &c. Les Chirurgiens Arabes & Arabistes ont décrit diverses espèces d'opérations instrumentales, qu'ils estimoient propres à guérir radicalement les hernies, & sur-tout le bubonocèle. La chirurgie moderne n'opère point dans cette vue. Contre l'ordinaire en s'éclairant elle a paru s'appauvrir : en épurant ses ressources elle en a diminué le nombre; elle a comblé les précipices sous les pas des imprudens malades, toujours prêts à s'y laisser entraîner par les promesses trompeuses de certains guérif-

seurs non moins imprudens qu'eux.

Certains coureurs, en vain réprimés par les loix , opèrent encore dans la vue d'obtenir la guérison radicale , & par malheur leur manière d'opérer suppose toujours la perte d'un testicule , lorsque la hernie est un bubonocèle. En 1733, le Présidial de Reims condamna au fouet & à cinq ans de prison , Marie-Anne Presse , pour avoir fait la castration à plus de cinq cents enfans , attequés de hernie inguinale. Cet exemple d'une juste sévérité n'a guère été utile que dans le ressort du Tribunal qui l'a donné. Le mal ne peut être arrêté que par une loi générale. En attendant , ces mutilations , qui ne sont pas sans danger , continuent , & tombent sur la classe de sujets la moins exposée à la subir , sur les enfans , qui n'éprouvent presque jamais d'étranglement , & qui guérissent pour l'ordinaire par l'usage

du bandage , quelquefois même , par celui des fomentations astringentes. On en a vu guérir par l'usage externe , continué pendant six mois ou davantage , d'une décoction de quatre onces de galles concassées dans une pinte d'eau , à laquelle on ajoute en la retirant du feu , deux onces d'eau-de-vie. On n'applique cette fomentation que la nuit seulement ; le jour on en bassine les parties toutes les cinq ou six heures.

On a cherché la guérison des hernies dans l'usage interne de certains médicamens , & l'on a proposé ces médicamens comme spécifiques : cela devoit être , puisque les inventeurs de ces remèdes étoient étrangers à l'art , ou très-peu versés dans les connoissances qui les constituent. Les guérisons qu'ils promettoient ne se sont point effectuées , & c'est accorder à ces remèdes tout ce qu'ils méritent ,

que de les admettre dans le traitement comme moyens auxiliaires des agens topiques.

Pour procéder avec avantage à la cure radicale des hernies par ces derniers moyens, il importe d'abord de bien choisir & le malade & la maladie; car l'un & l'autre peuvent apporter des conditions favorables ou contraires à la guérison. Quel que soit le topique qu'on préfère, le succès en sera d'autant moins incertain, que la compression sera plus exacte; je dirai même plus forte; pourvu que le malade puisse l'endurer sans un préjudice notable pour sa santé. La folle farine de tan, remise en vogue il y a quelques années, après un oubli de plusieurs siècles, n'a réussi qu'autant que la pelotte qu'on en forme s'est trouvée assez dure & assez serrée pour ajouter l'action mécanique à la propriété physique de la substance astringente qu'elle renferme.

Tout se réduit ici , 1°. à faire disparaître par la pression les suc aqueux & grasseeux qui abreuvent les solides , ou qui sont déposés dans les aréoles du tissu cellulaire. 2°. A déterminer une sorte de phlogose , qui réunisse les lames du tissu cellulaire entr'elles , avec les muscles & les autres parties soumises à la compression , enfin qui oblitère le col du sac herniaire , s'il n'est pas réduit. Qu'on examine d'après cette vue générale , tous les topiques employés avec quelque succès , & l'on trouvera qu'ils produisent tous les effets que nous leur attribuons , même indépendamment de l'intention & des vues particulières du praticien qui les met en œuvre. Telle étoit la manière d'agir du topique , ou plutôt de l'appareil décrit par Aëtius , vers la fin du cinquième siècle , selon la remarque qu'en a faite le savant auteur du deuxième volume de l'Histoire de la Chi-

rurgie. Les deux principales pièces de cet appareil étoient , l'une , une sorte d'emplâtre dont le sumach des corroyeurs , ou le tan , constituoit la principale vertu ; l'autre, une sorte de cône de papier mouillé, mâché, enfoncé dans l'anneau , & maintenu par un bandage ferré , qu'on ne renouvelloit ordinairement que tous les sept jours. C'est à la pression long-temps continuée, & à la phlogose qu'elle excite , qu'un célèbre Professeur des écoles de chirurgie , M. Peyrilhe , attribue , dans ses leçons , les guérisons qu'il a vu opérer par l'application long-temps soutenue d'un bandage de linge , dont la pelotte n'étoit qu'une pierre anguleuse qu'on tâchoit d'enfoncer dans l'anneau par son angle le plus aigu. L'excoriation qui suivoit quelquefois l'application de ce rude moyen , loin de mettre obstacle à la guérison , sembloit au contraire la favoriser.

L'appareil annoncé par un expert herniaire , il y a quelques années , ressembloit aux précédents , en ce qu'il exerçoit comme eux une forte pression , en ce qu'il irritoit , enflammoit , quelquefois même excorioit la peau , plus ou moins profondément.

Comme Aëtius, le discret possesseur du mystérieux topique moderne a pu guérir quelquefois , sur-tout des enfans , ou des hernies récentes & peu considérables chez les adultes ; mais qu'il assure avoir guéri tous ceux qu'il a traités, le plus grand nombre, la moitié, le quart seulement, c'est excéder les bornes de la vraisemblance, & compromettre sa véracité. Le temps nous fait raison de toutes ces promesses exagérées : elles meurent ordinairement aussi-tôt que les papiers publics & les prôneurs à gages cessent de les répandre & de les ali-

menter par des guérisons controuvées ou des succès exagérés.

Des bandages en général.

Tout ce que promettent les moyens divers exposés plus haut, on peut l'attendre d'un bon bandage ; aussi son application , long-temps continuée , a-t-elle plus d'une fois produit le rétrécissement du col du sac herniaire, même son oblitération , & par conséquent la cure radicale de la hernie.

On donne le nom de bandages ou brayers , à des liens plus ou moins solides , qui par la pression qu'ils exercent & qu'on tâche de rendre toujours égale , bouchent exactement les ouvertures par où les parties cherchent à s'échapper , & s'opposent à leur sortie. Cette définition ne peut convenir qu'aux bandages doués de quelque élasticité , & mieux encore aux bandages

dages *élastiques*, les seuls dont nous nous proposons de parler dans ce précis ; parce qu'ils sont les seuls qui remplissent complètement les vues pour lesquelles on les applique. S'il se rencontre des cas où l'on doive préférer les brayers de fer, roides & sans ressort, ces cas sont infiniment rares. On évite autant qu'on peut l'emploi de ces derniers, parce que rarement ils s'adaptent bien : quoique plus épais & plus pesants que les autres, s'ils ne sont pas toujours très-ferrés, ils se faussent, s'élargissent, & laissent échapper les parties, qu'ils doivent réprimer & contenir.

Quoique simple en apparence, & facile à inventer & à construire, le bandage élastique n'a été connu que dans le siècle dernier, & l'on peut ajouter qu'il n'a été rendu généralement utile que par les perfectiones reçues dans celui-ci : on les doit prin-

principalement à des François, à Blégny, Lequin, Arnaud lui-même, bien que leurs bandages n'étant composés que de fer ou de la réunion de parties égales de fer & d'acier battues à froid, tinssent le milieu entre le rigide & l'élastique. A cet égard, c'est de la capitale de la France que la lumière est partie, depuis environ trente ans, pour se répandre dans les provinces du royaume, & dans les pays étrangers. Si l'on doutoit de ce que nous avançons, on pourroit s'en convaincre, en comparant entr'eux les bandages construits à divers degrés d'éloignement de la capitale de la France. On les trouvera constamment d'autant plus imparfaits, que le lieu de leur fabrication est plus éloigné de ce centre. Londres seule mérite peut-être une exception.

Les brayers diffèrent entr'eux, à raison de leur rigidité ou de leur éla-

sicité, de leur grandeur, de leur figure, de leur forme, qui doit varier en raison de l'espèce de hernie, de son volume & de vingt autres circonstances, qu'il seroit trop long de parcourir. Tout bandage est composé de trois parties principales : son corps, & ses deux extrémités ; de celles-ci l'une appelée antérieure ou herniaire, est destinée à recevoir l'écusson & la pelotte, qui, pour remplir complètement sa destination, doit être tantôt convexe, tantôt plane & tantôt concave ; l'autre extrémité, qu'on nomme postérieure ou vertébrale, reçoit une courroie qui termine le cercle ou l'ovale, en s'attachant, par le moyen d'une bande de cuir, au bouton pyriforme implanté sur la face externe de l'écusson.

On a construit autrefois des bandages de futaine, de peau, en partie d'ivoire, de bois, des bandages à

ressort , à charnière , de fil-de-fer ; d'acier trempé & non trempé , & enfin ceux qui , réunissant toutes les bonnes qualités des autres sans en avoir les inconvéniens , ont été appelés élastiques ; ces derniers possédant éminemment les deux conditions essentielles à tout bandage , la stabilité , & la pression toujours égale , ou du moins proportionnée à la tendance que les parties ont à fortir , dans certaines attitudes & certaines positions du corps ; aussi n'en emploie-t-on pas d'autres , excepté pour quelques hernies particulières , & sur-tout chez les enfans ; encore est-il bien rare qu'on ne préfère pas les bandages élastiques , même pour les enfans du plus bas âge.

Telle étoit la matière dont on a construit long-temps , & dont quelques artistes construisent encore des bandages prétendus élastiques , mais qui ne méritent pas ce nom , parce

qu'ils ne réunissent pas les qualités que ce nom désigne.

L'utilité des bandages est aujourd'hui si bien établie, si généralement reconnue, qu'il seroit superflu d'en faire l'éloge. On fait que tel malade atteint de hernie, qui ne pourroit, sans les plus grands dangers, se livrer au torrent des affaires, continuer certaines professions non moins utiles à la société que pénibles pour celui qui les exerce; on fait, dis-je, qu'un tel malade, pourvu d'un bandage, retrouve toutes ses forces & les exerce avec impunité. Par l'application de cet utile moyen, les hernies guérissent quelquefois, toujours elles sont arrêtées dans leurs progrès, maintenues réduites, & par conséquent mises à l'abri de ces adhérences, de ces étranglemens funestes, qui tôt ou tard ont coûté la vie, au milieu des plus vives douleurs, aux trois quarts des

individus qui ont négligé l'usage des brayers, ou n'ont pas eu le bonheur d'en rencontrer d'assez parfaits pour contenir parfaitement leurs hernies.

On voit déjà que s'il importe au malade de recourir au bandage, dès l'instant que la hernie se manifeste, il ne lui importe pas moins de se confier pour l'exécution de cette précieuse machine, à des personnes qui joignent à l'art de les construire, les connoissances chirurgicales qui doivent guider l'artiste, & dans la construction & dans l'emploi qu'il en doit faire. Eclairé par les lumières de l'anatomie, il peut seul distinguer les diverses espèces de hernies, les parties qui les forment, les circonstances particulières qui les accompagnent, & donner aux bandages, la forme, les contours, le degré de force, &c., d'où dépend leur stabilité, sans laquelle loin d'être utiles, ils pourroient

devenir dangereux. Tantôt l'habile artiste, tel que nous le supposons, donne à la machine entière un plus ou moins grand ressort, afin d'exercer un juste degré de pression; tantôt il allonge ou raccourcit l'écusson, il le retrécit ou l'élargit; quelquefois il sillonne la pelotte transversalement à sa partie inférieure, pour loger le pubis trop saillant, il la rend concave pour loger & soutenir les parties qui ont contracté des adhérences, il la bombe ou l'applatit, pour l'amener enfin aux dimensions précises d'où doit résulter le plus grand effet.

Comme il est non-seulement difficile, mais presque impossible de poser des règles particulières, certaines, applicables à la construction de ces machines, & d'indiquer toutes les modifications, toutes les nuances que leur perfection exige, nous nous bornerons à dire, qu'elles diffèrent à rai-

fon du lieu, du genre, de l'espèce de hernie, de la constitution, des occupations, de la manière de vivre de la personne affectée de cette infirmité, &c. Nous négligeons mille autres considérations que le Chirurgien herniaire est seul capable de sentir, & qu'il lui seroit très-difficile de rendre. Il suffit à la classe de lecteurs pour qui nous écrivons, de savoir, qu'on construit des bandages simples & doubles, foibles, moyens ou forts, plus ou moins alongés & ceintrés; que le corps de ces machines est plus ou moins contourné, plus ou moins ovale, pour s'accommoder à la forme du ventre, des hanches, aux enfoncemens ou élévations qu'il doit recouvrir, à l'embonpoint ou la maigreur du sujet, &c.

De la fabrication & de la conformation des bandages.

Dans la construction des bandages,

le point principal c'est de leur donner un degré convenable d'élasticité. Le fer, le mélange de fer & d'acier sont trop mous; de quelque manière qu'on les prépare, ils ne peuvent ni recevoir ni conserver une bonne trempe, ni par conséquent acquérir une parfaite élasticité.

Le véritable bandage élastique doit être de pur acier. Le choix de la matière prépare le succès, mais ne le garantit pas : il exige des manipulations multipliées, difficiles & peu connues, que nous allons décrire, d'après notre propre expérience, persuadés qu'elles pourront être utiles aux Artistes, & que leur connoissance aidera les malades eux-mêmes à distinguer les bandages bien construits, de ceux qui n'ont que l'apparence des perfections qu'ils recherchent. On choisit une plaque ou bande de ce métal, parmi celles qu'on fabrique pour les

ressorts à pendule, & on en coupe une lame, de la longueur & largeur qu'on veut donner au bandage. Pour une personne dont la circonférence du bassin, dans l'endroit que le bandage doit recouvrir, auroit trente-deux pouces, la lame en ressort doit en avoir dix neuf, si la hernie est inguinale, & dix-huit, si elle est crurale. La largeur ordinaire de nos ressorts, pour les adultes, est depuis sept jusqu'à huit lignes, & pour les enfans, depuis quatre jusqu'à cinq, & jamais au-delà.

Sous une largeur donnée, la force compressive de tout bandage élastique, est proportionnée à la plus ou moins grande épaisseur de son ressort : la plus grande épaisseur qu'il puisse recevoir est depuis demi-ligne, jusqu'à trois quarts de ligne. Le malade le plus robuste ne soutiendrait pas, au moins sans une grande gêne & même

sans danger , un ressort d'une ligne d'épaisseur , sur huit de largeur , fait d'un bon acier , bien corroyé , bien trempé & bien *revenu*.

Un ressort de dix-neuf pouces appliqué à nud sur un bassin de trente-deux pouces de circonférence , & contourné de manière à ne point laisser de vide , touchera la symphyse du pubis par son extrémité antérieure , s'il est inguinal , & par l'extrémité postérieure , il excédera de trois pouces la commissure des fesses : si le ressort est crural , n'ayant que dix-huit pouces , il s'éloignera d'un pouce , de la même symphyse.

Ce ressort en recevant son écusson & la garniture convenable , perdra plus d'un pouce de sa longueur : il arrivera de cette réduction , que l'extrémité antérieure restera éloignée de la symphyse de trois à quatre lignes , tandis que l'extrémité postérieure n'excédera

plus l'axe des vertèbres, que de deux pouces moins trois ou 4 lignes. Il est inutile de dire que la même réduction arrive au bandage crural. Au reste, comme il faut toujours que la résistance l'emporte sur la puissance, c'est-à-dire le bandage, sur la hernie; plus celle-ci aura de tendance à s'échapper, plus il faudra de réaction dans le ressort; plus le bandage aura de réaction, plus il faudra donner d'épaisseur à sa garniture, afin qu'il ne blesse point les parties qu'il embrasse, & plus par conséquent, il perdra de sa longueur. Ce surcroît de raccourcissement doit être exactement calculé dans la longueur qu'on donne d'abord au ressort: sans cette attention, les points d'appui, tant antérieur que postérieur, seroient changés, & le bandage deviendrait chancelant, fatiguerait & ne contiendrait point.

Nos ressorts pour les bandages om-

bilicaux diffèrent des précédens par leur largeur, leur épaisseur & leur longueur : la largeur de ceux-ci varie depuis huit jusqu'à douze lignes; l'épaisseur excède rarement un tiers de ligne, à moins que le sujet ne soit gros & replet; dans cette circonstance la longueur qu'on est forcé de donner au ressort diminuant sa force compressive, on le tient un peu plus épais. On se conduit de même à cet égard lorsque les parties qui forment les hernies abdominales ont une grande tendance à s'échapper. Ici l'Artiste est placé entre deux écueils : si son ressort ne presse pas assez, il ne contient pas; s'il presse trop, il gêne les fonctions des viscères de la digestion, & préjudicie à la santé.

Continuons à décrire la manipulation du bandage à ressort. Avant de couper la lame d'acier de la longueur & largeur convenables pour les

vues qu'on se propose , on la fait rougir , afin de la rendre plus douce aux cisailles & au *pannage*. Après l'avoir coupée , on la redresse sur le tas à coups de marteau. On examine ensuite , si ses deux extrémités sont de même épaisseur : on destine la plus épaisse à porter l'écusson & la pelotte. Comme cette lame n'est pas exactement de même épaisseur dans tous ses points , on la *panne* dans les endroits forts , en dirigeant les coups de *panne* d'une extrémité à l'autre. Après qu'elle est *pannée* , on l'écrase de l'un & de l'autre côté , alternativement dans toute sa longueur , pour la bien écrouir & la tenir de même épaisseur , excepté vers l'extrémité antérieure , qui doit être un peu plus épaisse que le reste du ressort. Pour réussir , il est essentiel de frapper toujours à plat & des coups parfaitement égaux. Lorsque la lame sera bien cor-

royée , on la cisailera de nouveau pour lui conserver la largeur qu'on desire & égaliser ses bords. Comme le ressort s'est un peu contourné pendant les opérations précédentes , on l'écrasera doucement de nouveau, du côté des enfoncemens , pour le rendre droit. Ensuite on le ceintre , en commençant à quatre pouces de son extrémité antérieure , & finissant à pareille distance de l'extrémité postérieure. Dans cette opération , on évasé un peu son bord inférieur , pour qu'il s'adapte mieux aux parties qu'il doit embrasser. Enfin on donne quelques coups de marteau aux extrémités dans l'étendue de trois à quatre travers de doigt , à l'opposé du bord qu'on vient d'élargir , pour les ceintrer , ce qui les fera baisser : par ce moyen , le ressort étant tourné convenablement , lorsqu'il sera mis en place , s'appliquera parfaitement

dans toute sa longueur , à la circonférence du corps , tandis que son extrémité antérieure répondra parfaitement à l'ouverture herniaire , & l'extrémité postérieure , qui doit être nécessairement plus ascendante , portera horizontalement sur l'os sacrum. Si l'on omettoit de ceinturer le ressort à ses extrémités , il gêneroit beaucoup , & malgré les moyens auxiliaires qu'on pourroit employer , le bandage qui en résulteroit ne contiendrait qu'imparfaitement , parce qu'il tendroit toujours à monter , & laisseroit la hernie à nud. Au reste plus les hanches seront élevées , par rapport à l'ouverture herniaire , plus il faudra que l'extrémité antérieure soit baissée ; seul moyen , dans cette circonstance , d'éviter la sous-cuisse.

L'extrémité antérieure du ressort crural doit être plus ceintrée que celle du ressort inguinal , parce qu'elle doit

descendre plus bas , afin que l'écusson qu'elle reçoit porte directement dans le pli de la cuisse.

La lame du bandage ombilical , dont l'extrémité postérieure doit poser à quatre pouces de distance du milieu de la colonne épinière , est ordinairement droite , dans toute sa longueur , c'est-à-dire , qu'elle n'est pas ceintrée ; mais on est souvent obligé d'incliner plus ou moins son extrémité antérieure , soit supérieurement soit inférieurement , pour que la plaque qui y est adaptée , réponde exactement à la forme du ventre , & que la pelotte , dont celle-ci est recouverte , puisse remplir complètement l'indication. Si la tumeur herniaire est *plane* , la lame doit être droite , si le ventre est bombé à la partie supérieure de la hernie , l'extrémité antérieure du ressort fera torse de bas en haut ; elle le fera de haut en bas , si le ventre est plus élevé vers la partie

inférieure de l'espace soumis à la pression. Si l'abdomen est très-enfoncé, l'on sent qu'en coudant un peu le ressort dans l'étendue du côté sur lequel il doit poser, étant garni, il produira le meilleur effet possible, sans gêner le malade. Telle est la longueur que nous donnons à nos ressorts abdominaux, qui, comme on l'a vu, font plus de la moitié de la circonférence du corps qu'ils doivent embrasser. Par cette longueur, il résulte, si la personne incommodée a de l'embonpoint, & qu'elle ait l'épine très-déprimée en forme de gouttière, comme on le voit souvent, qu'on a l'avantage de couder suffisamment l'extrémité postérieure, à l'endroit qu'elle recouvre la colonne vertébrale; opération qui sert à rendre la machine stable : nous ajouterons que dans certains cas, nous nous sommes très-bien trouvés de les tenir assez longs pour en faire le circulaire entier, que

dans d'autres circonstances, nous rî-
vons deux demi-corps sur la plaque,
dont les extrémités postérieures pro-
duisent le même effet que celles du
bandage double inguinal (*voyez pag.*
133), se fixant de même, au moyen
d'une boucle & d'une jaretière qu'on
ferre à volonté. Ce dernier, que nous
mettons en usage, depuis plus de dix
ans, nous a toujours réussi dans les
cas les plus difficiles. Comme dans
le ressort inguinal nous pouvons lui
donner la forme relative à celle de
l'abdomen, & par-là le rendre d'une
stabilité permanente.

La lame ayant reçu ses dimensions,
on la limera à plat de chaque côté,
pour la dégrossir, & lui donner l'épais-
seur convenable; elle sera telle, lors-
qu'elle ira en diminuant impercepti-
blement, depuis l'extrémité antérieure
jusqu'à la postérieure. Ensuite, on lime
ses bords, & l'on arrondit son extré-
mité vertébrale, à laquelle on perce

deux trous : on en perce trois à l'extrémité antérieure ou herniaire, distans l'un de l'autre d'environ demi-pouce. On donne quelques coups de marteau sur ces extrémités, après les avoir limées, pour aplatisir les bou-lures faites par le poinçon, & on efface de nouveau avec la lime les aspérités. Enfin on équarrit les trous, pour les rendre ronds & unis, précaution nécessaire sur-tout pour l'extrémité postérieure.

La lame disposée comme on vient de le dire, on la contourne avec les deux mains, pour lui donner la forme analogue à la configuration des parties qu'elle doit embrasser. On commence à la courber, de dedans en dehors, à cinq pouces & demi de distance de son extrémité herniaire, vis-à-vis l'épine antérieure & supérieure de la crête de l'os des iles, & on continue à l'enfoncer dans toute son étendue, pour lui donner l'ovale dont elle a

besoin. Il faut faire la plus scrupuleuse attention au point qui répond à la hanche, entre le grand trochanter & la crête de l'os des iles, que nous appellons la grande courbure : elle doit être plus ou moins concave ou enfoncée, & plus ou moins étendue, relativement à la saillie de la hanche qui, tantôt est ronde ou aplatie & tantôt très-obtuse. Nous insistons sur cette partie du ressort, car si elle n'est pas bien configurée, le bandage ne peut remplir l'indication. Si cette courbure est trop étroite, le bandage laissera un vide au haut de la cuisse, & la pelotte n'atteindra pas l'anneau ; si elle est trop étendue, le col du bandage sera trop long, & la pelotte portera son action au-delà de l'ouverture herniaire. Enfin c'est de l'exacte proportion de cette partie que dépendent les justes points d'appui & de compression. On forme l'en-

torse du col en enfonçant la lame de dehors en dedans , à trois pouces de distance de son extrémité antérieure. Après qu'on a formé l'enfoncement, on fait rentrer cette extrémité en dedans, & on la fait pincer légèrement du bas, en la tordant de bas en haut & de dehors en dedans. Il est superflu de dire que, relativement à la plus ou moins grande grosseur du sujet, on éloigne ou on rapproche le col & la partie coudée de l'extrémité herniaire; il ne le seroit pas moins d'ajouter que tout ceci suppose une lame de dix-neuf pouces de longueur, & que les lames abdominales n'admettent point de pli ou coude antérieurement.

Nous voilà parvenu au moment de tremper la lame, qui portera désormais le nom de ressort à bandage, quoiqu'à la rigueur elle ne mérite ce nom, qu'après qu'elle est revenue,

& qu'elle est prête à recevoir l'écusson.

Trempe.

Pour tremper le ressort, on le place dans un brasier, au milieu de charbons également embrasés, on diminue le courant d'air le plus qu'il est possible, & pour qu'il chauffe & rougisse par-tout également, on anime davantage les charbons avec le soufflet, vers l'extrémité antérieure que nous avons laissée plus épaisse que la postérieure. Lorsque le ressort a rougi suffisamment, c'est-à-dire, lorsqu'il a passé un peu la couleur de cerise, on le retire & on le plonge dans un vase plein d'huile. A la rigueur, on pourroit tremper dans l'eau, mais la trempe qu'elle donne est sèche, souvent même l'acier s'écaille & se fend. On essuie ce ressort en le passant dans les cendres, & l'essuyant avec un

linge. Ensuite, on l'éclaircit avec un morceau de brique & du grès très-fin, dans la vue de découvrir les nuances du *revenu*. Après que le ressort est éclairci dans toute sa face interne, on lui donne le *recuit* convenable, ainsi que son ancienne forme, qu'il avoit perdue en partie en rougissant & à la trempe. Pour cette dernière opération, on se sert de deux pinces, dont l'une agit pendant que l'autre ne fait que résister & fixer la pièce.

Revenu.

L'opération du *recuit* ou du *revenu* est d'autant plus importante, qu'elle donne au ressort la propriété élastique, & que de celle-ci dépendent en grande partie sa bonté & sa solidité. Pour cette opération, l'on dispose un fourneau bien allumé, recouvert de deux plaques de tôle d'égale grandeur;

deur ; on les écarte l'une de l'autre , de manière qu'elles laissent entr'elles une ouverture plus ou moins large , proportionnée à la largeur du ressort qu'on veut recuire. On saisit le ressort avec les pinces , on le place par l'extrémité *antérieure* , vis-à-vis de l'ouverture mentionnée plus haut , & on le fait chauffer , de manière qu'il passe successivement , dans tout son contour , par les nuances de couleur , d'*or* , de *pourpre* , d'*ardoise* & de *paille*. C'est ce *recuit* ou *revenu* qui lui donne son élasticité , d'où dépendent , comme nous l'avons déjà dit , sa bonté & sa solidité. On huile ensuite le ressort , & on l'essuie légèrement : la légère teinte d'huile dont il reste couvert , le garantit de la rouille.

Après avoir ainsi donné ses qualités physiques au ressort à bandage , on achève sa conformation mécanique. On adapte à son extrémité

antérieure un écusson ou platine de tôle, rivée aux trois trous dont elle est percée. Cette platine est oblongue & légèrement allongée de derrière en devant, afin de couvrir exactement l'anneau inguinal, dont elle *suit la direction*. Pour le ressort crucial, l'écusson est en général plus long transversalement, que large de haut en bas. Au reste, la forme & l'étendue de cette pièce du ressort, sont subordonnées à l'état de la maladie, aux parties qui la forment, ou qui l'environnent, &c. ; circonstances presque aussi variées que les hernistes eux-mêmes, & qui par conséquent, ne promettent qu'un à-peu-près, lorsqu'on détermine la figure & les dimensions de l'écusson, avant de s'être procuré les connoissances locales individuelles, dont nous annonçons ici la nécessité. Il nous semble que cette partie du bandage doit être calculée

sur l'état de l'ouverture herniaire , du moins c'est d'après elle que nous lui donnons ses dimensions , & nous nous arrangeons toujours , d'après la mesure prise de l'anneau , avec le doigt indicateur accoutumé à l'évaluer. Ainsi nous prenons nos dimensions de manière , que la pelotte qui doit boucher l'issue , dépasse la circonférence de l'ouverture d'un demi-pouce , par conséquent si nous estimons que l'anneau ait un pouce de long sur un demi-pouce de large , &c. , notre écusson , suivant la direction de cet anneau , aura deux pouces sur un pouce & demi. Par ce moyen on voit qu'un demi-pouce de pelotte comprimera les parties voisines , & que la hernie sera contenue.

Ce même écusson est aussi légèrement concave en dedans , pour mieux s'adapter à l'écusson de liége , & à la pelotte dont il est chargé. Sa face ex-

terne doit être surmontée d'un bouton d'acier pyriforme : il est préférable au clou-à-crochet , parce qu'il s'élève moins , qu'il est plus commode , qu'il n'accroche pas le linge , & n'expose pas le bandage à des secousses ou tiraillements , presque indispensables , dans le clou-à-crochet. Si nous faisons quelquefois usage de ce dernier, la pointe est en haut & légèrement inclinée sur le col du bandage. Après avoir rivé solidement l'écusson de tôle à l'extrémité antérieure du ressort , on en forme un semblable de liège , fort mince , mais qui le dépasse de deux lignes dans toute sa circonférence ; ce qui sert principalement à garantir le premier de la rouille , & à assujettir la pelotte plus solidement. On recouvre l'un & l'autre de toile , & on les coud dans leur pourtour. On recouvre également le reste du ressort jusqu'à son extrémité verté-

brale. A la pointe de l'écuffon en liège, on attache une lisière de bon drap, qu'on assujettit à la face interne du ressort, en la conduisant jusqu'à son extrémité postérieure. Là, on la fixe solidement aux deux trous qu'on y a pratiqués à cet effet. Le reste de la lisière qui demeure flottant pour achever le tour du corps, est terminé par une bande de cuir de cinq ou six pouces de long sur huit ou neuf lignes de large, d'une épaisseur convenable & percé dans toute son étendue, & de trois en trois lignes, de trous ronds propres à recevoir le bouton pyramidal, placé à la face externe de l'écuffon. Enfin, on recouvre le tout de peau de chamois, & on fixe le long de la face interne un matelas légèrement rempli de laine très-fine, suffisamment large, pour qu'il dépasse le ressort d'environ quatre lignes dans toute son étendue : il résulte de la

largeur qu'on donne, à ce corps doux
 & mollet, que les parties comprises
 sous le bandage, sont garanties de la
 pression. On fait deux gances ou bri-
 des sur l'écusson. De ces gances, l'une
 est placée à la partie antérieure, &
 l'autre à la postérieure, à égale dis-
 tance du bouton. Le cuir, ainsi fixé
 sous ces deux gances, est absolument
 invariable, quelques mouvemens que
 puisse faire le malade. Quant à la pe-
 lotte, partie infiniment essentielle,
 pour la former on coupe un morceau
 de peau, plus ou moins ovale, plus
 ou moins grand, &c., on le faufile
 en manière de bourse à jetons; on
 le remplit de laine, couche par couche,
 d'égale épaisseur : c'est en raison du
 nombre ou de l'épaisseur de ces cou-
 ches que la pelotte prend la convé-
 xité propre à remplir l'indication.
 On le resserre légèrement pour ne pas
 trop le durcir, & on l'adapte à

l'écuffon de liége qui doit le recevoir.

Il est essentiel de donner , à la conformation de la pelotte , la plus scrupuleuse attention ; car si elle étoit trop dure , elle gêneroit nécessairement les parties qu'elle doit comprimer ; si elle avoit trop de mollesse , les parties qui forment la hernie luttant continuellement contr'elle , s'échapperoient ou la creuseroient , de manière à la rendre concave ; ce qui pourroit occasionner les plus graves accidens.

Comme en général la plaque ombilicale excède , en étendue , la pelotte qu'elle reçoit , on se contente le plus souvent de percer cette première de petits trous , pour y condre la pelotte ; mais par ce moyen on parvient difficilement à lui donner la forme que les circonstances exigent ; & s'il est nécessaire d'y retoucher après qu'elle est formée , on est obligé de démonter la machine entière.

Pour éviter tous ces inconvéniens, nous formons nos pelottes abdominales de la manière suivante. Nous perçons d'un trou rond la plaque dans son milieu, & nous la garnissons de manière à la rendre douce & mollette. Ensuite nous faisons un trou à la peau qui la recouvre, vis-à-vis celui de la plaque : enfin nous formons la pelotte, à laquelle nous donnons la figure relative aux parties qu'elle doit comprimer. Pour cet effet, nous coupons un morceau de tôle, tantôt rond, tantôt ovale, ou plus ou moins alongé; nous rivons dans son milieu une vis assez longue pour traverser l'épaisseur de la plaque : la grosseur de cette vis est proportionnée au trou de la plaque qui doit la recevoir, & dans lequel elle doit être libre.

Après avoir garni cette pelotte convenablement, nous présentons la vis à la face interne de la plaque, qu'elle

traverse par le trou qu'on y a pratiqué , pour être reçue à la face externe , par un petit écrou qu'on tourne jusqu'à ce que la pelotte soit fixée solidement , & qu'elle ait pris la direction désirée.

On l'a déjà dit , & l'on ne sauroit trop le répéter , la forme des bandages doit être donnée aux ressorts lorsqu'on les tourne , & s'ils la perdent à la trempe , la leur rendre pendant l'opération du *revenu* ; parce que lorsqu'ils ont reçu leurs garnitures , cette forme est invariable. Ainsi des bandages dont on peut changer les contours en les appliquant , ne peuvent être regardés comme des bandages d'une élasticité permanente. C'est une vérité sensible aux yeux de toutes sortes de lecteurs , que si ces bandages sont susceptibles d'être corrigés au besoin avec les mains pour les accommoder aux parties qu'ils doi-

vent recouvrir, ils pourront également se déformer dans le plus léger mouvement lorsqu'ils seront en place.

Des bandages en particulier.

Du bandage inguinal simple.

Les bandages particuliers ont pris leurs noms des parties qui reçoivent la pelotte : on appelle inguinal celui qui s'applique à l'aîne. Ce bandage est un demi-cercle, dont l'extrémité antérieure appuie sur l'anneau, & la postérieure sur la colonne vertébrale, convenablement garni d'un corps souple & mollet, & revêtu de peau de chamois dans toute sa longueur, comme nous l'avons dit plus haut. M. Camper, en prolongeant l'extrémité postérieure de ce demi-cercle, & redressant l'antérieure qui doit être plus ou moins courbée pour remplir l'enfoncement qui se trouve au-dessus

de l'arcade crurale , cherchoit des perfections , & n'a trouvé que des défauts. La ceinture de ce bandage doit appuyer légèrement , mais exactement , sur tous les points de la circonférence qu'il embrasse ; sans cette condition il blesse & n'est jamais stable. Nous pourrions nous dispenser de dire , que si la pelotte ne pose pas exactement sur toute la circonférence de l'anneau , ne presse pas également tous les points qui lui sont soumis , la hernie pourra reparoître au moindre effort. Pour remplir complètement sa destination , la pelotte ne doit pas être trop convexe ; son milieu presseroit trop l'anneau , tendroit à le dilater , à faciliter par conséquent l'issue des parties , tandis que ses bords ne portant point , elle manqueroit de stabilité. Pour qu'elle conserve l'immobilité dont elle a besoin , elle doit porter un peu sur *la branche antérieure*

des os pubis. La pression qu'elle exerce sur cette partie a même cet avantage, qu'elle rend de jour en jour le sac herniaire moins ample, moins perméable, & qu'elle peut même l'oblitérer dans le lieu comprimé.

Un bandage, dont la pelotte exerce toute son action au-dessus du pubis sur les parties molles, seulement, n'est pas à l'abri de tout inconvénient : la pression que la pelotte exerce directement sur les extrémités des muscles abdominaux, non-seulement gêne leur mouvement, peut laisser l'anneau à nud inférieurement, mais encore peut occasionner une nouvelle hernie, en diminuant la capacité de l'abdomen, & en comprimant vivement les parties réduites qui peuvent s'échapper alors par d'autres ouvertures. Cette nouvelle hernie pourra être crurale du même côté que la première, ou inguinale ou crurale du

côté opposé , comme on en a des exemples , même assez fréquens.

Du bandage inguinal double.

Si deux hernies se rencontrent dans le même sujet , il faut employer deux bandages simples pour les contenir , c'est-à-dire , deux demi-corps d'égale longueur. Par le moyen de ce double bandage on donne à chaque branche qui le compose , la pression dont elle a besoin , pour s'opposer à l'issue des parties.

S'il n'est point rare de trouver deux hernies au même sujet , il l'est infiniment de les rencontrer toutes les deux également volumineuses & violentes , je veux dire qui aient la même tendance à s'échapper. Presque toujours on n'éprouve aucune difficulté pour réduire & maintenir l'une , tandis que l'autre , étant replacée , exige une

pression bien plus forte, pour la contenir. Le malade fera à cet égard, dans une parfaite sécurité, si l'on tient un côté du bandage plus fort que l'autre. Cette manière de construire ou disposer ce bandage, est d'autant plus nécessaire que si la pression, du côté de la hernie moins violente, est égale à celle qui l'est davantage, non-seulement le malade sera gêné du côté où il ne doit pas l'être, mais encore les parties tendront à se porter vers le côté le plus foible. Au reste, il en résulte encore cet avantage : le malade ayant deux hernies, si l'une est inguinale & l'autre crurale, comme il arrive quelquefois, on conçoit combien ce bandage deviendra utile, puisqu'on peut donner à chaque ressort & à chaque pelotte, les formes & les dimensions que les cas exigent.

Les branches ou demi-corps, larges

d'un pouce par derrière , dans l'étendue de trois à quatre travers de doigt chez les adultes , moins chez les enfans ; les bords légèrement inclinés de dedans en dehors , sont unis par derrière , au moyen d'une boucle & d'une jarretière en fil , qui se lâche & se resserre comme la ceinture d'une culotte ; par devant , au moyen d'un bouton pyriforme , & d'un cuir plus ou moins allongé , rivés l'un & l'autre sur chaque écuillon. Selon l'indication , il est quelquefois nécessaire que les deux écuillons soient surmontés chacun d'un bouton d'acier , comme dans le cas où deux sous-cuisses seroient utiles.

Les extrémités vertébrales doivent être distantes l'une de l'autre , d'un pouce , lorsque la mesure a été bien prise , & que le bandage , suffisamment ferré , est appliqué sur le corps. A l'égard des extrémités antérieures

ou herniaires , on a la liberté de les éloigner ou de les rapprocher l'une de l'autre , en raison de l'espace qui règne entre les ouvertures herniaires. Si les extrémités vertébrales , de ce bandage se croisoient , & qu'elles fussent fixées solidement l'une sur l'autre , les extrémités herniaires arrêtées à-peu-près de la même manière , on doit sentir , & combien la force compressive seroit augmentée , & combien la machine entière seroit défectueuse , difficile à appliquer , & sujette à se casser , &c. Nous croyons donc , d'après l'expérience , qu'il doit nécessairement résulter de l'union de ces demi-corps , deux charnières , l'une antérieure , au moyen du cuir qui unit les deux pelottes , l'autre postérieure , formée par la jarretière & la boucle , &c.

Du bandage inguinal simple à deux écuillons.

Le bandage simple, à deux écuillons, portés sur le même ressort, est incommode, & ne s'adaptant jamais exactement des deux côtés, il manque son effet. Nous le mettons seulement en usage, avec des modifications, qui ont principalement pour objet les écuillons, dans le cas, assez rare, d'une hernie inguinale & d'une crurale du même côté.

Avis aux personnes attaquées de hernies.

C'est ici le lieu de donner aux malades quelques conseils utiles, par rapport à l'emploi des bandages. Il vaudroit presque autant n'en point porter, que de les quitter quelquefois, sur-tout dans les premiers temps de

leur application. Car, plus ils opèrent efficacement dans ces premiers temps, pour retrécir ou même oblitérer le col du sac herniaire, plus les parties venant à s'échapper sont exposées à l'étranglement. La petite incommodité qu'ils causent, devient de jour en jour plus légère, & les malades arrivent enfin à les garder pendant la nuit sans le moindre mal-aise, ni le moindre dérangement durant le sommeil. Si le bandage opère à la longue, comme il arrive quelquefois, la guérison radicale; le malade en est averti, la soupçonne; mais dans ce cas même, il ne doit le quitter qu'après les recherches & l'examen d'un chirurgien expérimenté.

Tout herniste doit posséder plusieurs bandages, afin de remplacer, sur le champ, celui qui viendrait à se casser, comme aussi pour n'en point manquer pendant qu'on recouvre ce-

lui dont le chamois est corrodé par la sueur : il ne faut pas même attendre que la peau soit détruite pour la renouveler , une fois imbibée de sueur , elle la transmet au ressort ; que celle-ci rouille & détruit. On sent combien il importe aux personnes atteintes de hernie , de se surveiller avec soin. Le meilleur bandage ne sauroit opposer un obstacle invincible aux parties qui cherchent à s'échapper. Une attitude extraordinaire peut le déranger , un mouvement , un effort violent peut le casser , & faire reparaître une hernie qui ne s'étoit point montrée depuis long-temps , qu'on pouvoit supposer en voie de guérison , & qu'on a souvent bien de la peine à réduire. Si ce contre-temps arrive , par quelque cause que ce puisse être , le malade doit à l'instant se coucher sur le dos , ôter le bandage , prendre des lavemens , s'il en a la commo-

dité, & tenter lui-même la réduction, s'il n'est pas à portée des secours éclairés d'un habile Chirurgien.

Du bandage crural.

Le bandage approprié à la hernie crurale, est essentiellement le même que celui de l'inguinale; il n'en diffère que par des nuances que nous avons fait remarquer plus haut, & qu'il seroit dangereux de négliger. Le col de celui-ci doit être plus court, parce que la tumeur herniaire est plus voisine de la hanche; la pelotte doit être plus longue de devant en arrière, que large de haut en bas, afin de gêner moins les mouvemens de la cuisse, & d'être moins exposée au déplacement. Ici sur-tout on doit bien proportionner la force du ressort à l'action des parties qui tendent à s'échapper : une pression trop forte

comprimerait , engourdirait les vaisseaux cruraux , gênerait les mouvemens de la cuisse , peut-être même produiroit - elle la ruméfaction.

On voit par-là combien il importe de ne pas donner aux malades un bandage inguinal pour un crural, faute essentielle qu'on reproche à certains artistes, & que rien ne peut excuser. Par ce bandage la hernie crurale est d'abord contenue , mais bientôt la pelotte glisse vers la symphyse, & ne contient plus.

Du bandage ombilical & ventral.

Le bandage ombilical est élastique, ou à ceinture molle. Le premier est absolument nécessaire pour les adultes. On a construit de ces bandages sur divers principes, & comme aucun n'a rempli l'objet qu'on se propose,

dans toutes les circonstances, les praticiens ne sont pas encore satisfaits de ceux que nous possédons. Un des plus parfaits, & en même temps le plus simple, c'est le bandage inguinal ordinaire, modifié de la manière indiquée, *page 108--113*, il ne s'agit, comme on l'a vu, que d'effacer l'entorse du col, & de tenir le ressort plus ou moins mince & large, de manière qu'il représente un demi-cercle; on agrandit l'écusson qu'on rive à l'extrémité herniaire, & on le recouvre dans sa face interne d'une pelotte, plus ou moins large, ronde ou ovale, & bombée de façon à porter son action sur les bords de l'ouverture qu'elle doit fermer. L'avantage qu'a ce bandage élastique sur le non-élastique, c'est qu'il prête suffisamment aux mouvemens d'inspiration & d'expiration, qu'il presse continuellement & exactement sur l'ouverture herniaire, qu'il

a vraiment un point d'appui sur la colonne vertébrale qui répond à celui de compression exercé antérieurement, qu'enfin il gêne & presse moins latéralement, les viscères de la digestion, que celui à ceinture molle qui les comprime de toutes parts ; de manière qu'il arrive souvent que ce dernier appuie moins sur le lieu de la hernie que sur les côtés du corps sur lequel il est appliqué : d'ailleurs ce ne sont point les ressorts qui entrent dans la plaque qui le rendent stable ; si les praticiens qui le mettent en usage, sont de bonne-foi, ils conviendront que cette plaque compliquée, n'étant fixée que par une ceinture à *un chef*, elle fait souvent la bascule. Ils conviendront aussi, que le bandage élastique n'a pas ce défaut essentiellement vicieux, puisqu'il reste également en place avant & après le repas.

Chez les enfans le bandage non-élastique fuffit pour l'ordinaire , non-seulement pour contenir , mais encore pour guérir l'exomphale , souvent même dans l'espace de quelques mois , ce qui n'a jamais lieu chez les adultes. La difficulté de fixer la pelotte d'un bandage de futaine , sur les parties molles & tendres d'un jeune enfant , de telle manière qu'elle ne se déplace point , a fait imaginer de simples bandes diversément conformées , qui fixent sur l'ombilic tantôt un corps ferme & plat , tantôt un corps convexe. Les partisans de la première forme se sont élevés contre la dernière , qu'ils ont jugée absolument contraire à la fin qu'on se propose , au resserrement de l'anneau ; mais l'on a aussi prétendu d'un autre côté , que cette forme , dans le corps qui remplace la pelotte ordinaire , est la seule qui puisse repousser suffisamment les parties

parties qui se présentent pour qu'elles ne séjournent pas dans l'épaisseur des muscles abdominaux. Il faut convenir que ces procédés sont également appuyés sur des succès. Dans quelques circonstances , un carton humide , moulé sur le corps , pendant qu'il se desséchoit , contenu par des liens convenables , a procuré des succès qu'on cherche souvent en vain dans les machines les plus ingénieuses & les plus compliquées.

Nous avons été souvent consultés pour des enfans qui avoient des élévations considérables le long de la ligne blanche , communément dans l'étendue comprise entre le cartilage xiphôide & l'anneau ombilical , qui faisoient craindre l'éventration. Pour l'ordinaire ces élévations sont occasionnées par les cris immodérés , par la toux , &c. Dans ces circonstances nous nous sommes toujours servis avec

avantage , d'une espèce de corset ; convenablement garni & médiocrement ferré , aidé de fomentations aromatiques, continuées pendant quelque temps.

La hernie de l'estomac , étant en quelque sorte propre aux adultes , exige toujours , comme les hernies ombilicales sur ces mêmes sujets , un bandage élastique , & ce bandage doit peu différer du précédent. Comme dans celui-ci , la pelotte fera plus ou moins ovale , pour s'accommoder à la fente qui laisse échapper les parties , & plus ou moins convexe , en raison de la profondeur de cette même fente. Il est vrai que cette forme peut , selon l'opinion de quelques praticiens , écarter les fibres musculaires ou tendineuses qui bordent l'ouverture , & l'agrandir , mais ces ouvertures ne se resserrent & ne se ferment jamais , ce qui rend moindre l'inconvénient

de la pelotte : d'ailleurs la convexité que nous prescrivons de donner à cet obturateur, est la seule qui puisse, dans la plupart des circonstances, empêcher l'intestin de s'introduire dans l'écartement des fibres, & remplir complètement sa destination.

Nous en disons autant du bandage de la hernie obturatrice ou du trou ovalaire. Il doit être élastique, & sa pelotte ronde, ovale, oblongue, en un mot, conformée de manière à remplir le vide que les parties laissent après leur réduction. Malgré les inconvéniens qu'on pourroit attribuer à ces sortes de pelottes, on a vu guérir radicalement des hernies obturatrices, long-temps contenues par ce moyen.

De la manière de prendre la mesure des bandages, des renseignemens qu'on doit donner au Chirurgien herniaire chargé de les construire, & des règles à suivre dans leur application, &c.

On prend un ruban large de quelques lignes, & suffisamment long pour faire le tour du corps. On pose une de ses extrémités sur l'endroit qui répond à la symphyse, tandis que l'autre extrémité, après avoir fait le tour du corps, est ramenée vers la première (voyez planche première lignes II). Ces extrémités étant jointes & fixées d'une main, on promène l'autre autour du corps pour s'assurer si le ruban est placé exactement sur la circonférence que le bandage doit recouvrir. Cette première condition sera remplie, s'il passe sur le côté du bassin, au milieu du léger enfoncement qu'on remar-

que à la partie supérieure de la cuisse , entre le grand trochanter (lettres LL) & le bord que forme la crête de l'os des iles (CC) ; par derrière à un demi-pouce au-dessus de la commissure des fesses , & par devant au-dessus de la verge ou de la vulve. Alors on ferre ce ruban pour avoir la mesure juste , en observant de le ferrer davantage chez les personnes grasses , attendu que chez elles le bandage étant appliqué , affaisse toujours le tissu graisseux. Le ruban ayant été coupé , on a la circonférence juste du bassin. On marque sur ce ruban , avec de l'encre , la distance comprise entre l'ouverture herniaire & l'épine antérieure & supérieure de l'os des iles , située en devant , & un peu plus bas que les lettres CC. S'il se trouve des enfoncemens ou éminences sur la circonférence du bassin , on s'y prendra de même pour les faire connoître , & s'il se

rencontre deux hernies , on marquera également la distance qu'il y aura entre les ouvertures qui leur livrent passage.

Pour les hernies ombilicales & ventrales, après avoir conduit le ruban autour du corps, on fait rejoindre ses deux extrémités sur l'ouverture herniaire.

S'il est essentiel de bien prendre la mesure du corps, il l'est également de spécifier d'une manière exacte ,

1°. Le lieu & l'état de la maladie, afin que l'instrument herniaire puisse remplir complètement sa destination.

2°. On mandera si la hernie est au côté droit ou au côté gauche; si elle est inguinale ou crurale , c'est-à-dire, si elle est dans l'aîne (lignes FF), ou au pli que forme la cuisse lorsqu'elle est fléchie sur le bas-ventre (lettres GG).

3°. On mandera encore si la hernie inguinale est bornée au pli de l'aîne, ou si elle descend plus ou moins dans les bourses (H), ou dans les grandes lèvres.

4°. On tâchera d'indiquer la cause qui a pu donner lieu à la hernie , c'est-à-dire , si elle est survenue à la suite d'un coup , d'une chute , d'un effort violent , &c. , ou si elle a été produite d'une manière lente , dans l'état de santé , pendant ou après une maladie.

5°. On fera connoître ses progrès , son ancienneté , son volume.

6°. On observera si elle rentre facilement & totalement , debout ou couché ; si on est obligé de faire beaucoup d'effort avec la main pour en opérer la réduction , & si malgré les tentatives qu'on aura faites , on ne peut parvenir à cette fin , on spécifiera d'une manière précise , le volume de la tumeur scrotale.

7°. Si lorsqu'elle est rentrée le malade étant debout , & appuyant avec l'extrémité des doigts sur l'ouverture herniaire , il sent une vive impulsion

de la part des parties qui cherchent à s'échapper. On doit déterminer l'effort ou la pression qu'on fait pour maîtriser ces parties, & dire, si malgré la pression qu'on exerce, on ne sent point un corps gras, comme parsemé de très-petites glandes, se glisser sous les doigts. Au reste si l'épiploon forme la hernie, quoi qu'on puisse le maintenir réduit, en ménageant la pression des doigts, on le sentira sortir, comme nous venons de le dire.

8°. Le malade étant couché & la réduction étant faite, il peut déterminer, avec le doigt indicateur, la grandeur de l'ouverture herniaire, & sentir si le pourtour de cette ouverture est flasque, ou s'il offre plus ou moins de résistance.

9°. On indiquera l'état du testicule & du cordon, s'ils sont sains ou malades, &c.

10°. On marquera l'âge du malade

& s'il est gras ou maigre, & au cas qu'il ait deux hernies, on dira si elles sont toutes les deux du même côté, ou non; & quelle est la plus ancienne & la plus volumineuse, & s'il n'éprouve pas plus de difficulté à faire la réduction de l'une que de l'autre, &c.

11°. Dans les hernies ombilicales & ventrales, après avoir indiqué la forme du ventre, on spécifiera le lieu où ces hernies se manifestent, à quelle distance elles sont de l'ombilic (B), si elles sont placées à ses parties, supérieure, inférieure, latérales, droite ou gauche.

Quant aux autres renseignemens, ils sont les mêmes que pour les hernies inguinales.

12°. S'il arrivoit que la hernie fût obturatrice, vaginale, périnéale, &c., il faudroit nécessairement que l'Herniaire prît lui-même ses mesures, pour l'exécution de la machine, ou

qu'elles lui fussent transmises par un Chirurgien très-éclairé.

La pelotte du bandage étant destinée à boucher l'ouverture par où s'échappent les parties qui forment la hernie, & à empêcher ces mêmes parties de sortir du ventre lorsqu'elles y sont rentrées, on doit sentir combien il est essentiel de les réduire exactement, avant d'en faire l'application.

En supposant que la hernie soit inguinale, du côté droit, la réduction faite, & le malade couché sur le dos, il ne s'agit plus que d'appliquer le bandage comme nous allons l'indiquer.

Le malade ouvrira ce bandage avec les deux mains; le pouce de la main gauche appuiera sur la face interne de la pelotte, & les extrémités des doigts embrasseront sa face externe: la main droite fera le même effet sur l'endroit du circulaire qui répond

près de la colonne vertébrale. Il le présentera au haut de la cuisse, du côté de la hernie, & le passera autour du corps, ce qu'il exécutera facilement en soulevant suffisamment la partie inférieure du tronc. Alors il retirera la main gauche, qui sera remplacée par la droite; non pas de la même manière, puisque celle-ci ne fera que tenir la pelotte en respect vis-à-vis de l'anneau, pendant que l'autre ira chercher la ceinture, qui étoit remployée sous les reins, pour la conduire autour du corps. Le bandage étant placé à la circonférence du bassin, comme l'indiquent les lignes II, de la première planche, le malade posera le milieu de la pelotte sur l'anneau, (voyez la jonction des lignes FF & II, première planche): elle aura pris la position convenable, si sa partie inférieure *porte un peu sur le pubis, à côté & presque au niveau de la verge, ou de la vulve chez la femme*; il l'as-

sujettira de la main droite , tandis
 que de la gauche , il fixera la sous-
 cuisse , s'il la juge utile , au bouton
 d'acier ou au clou à crochet , dis-
 posé pour la recevoir. Ensuite , sans
 abandonner la pelotte , il passera la
 main sous la ceinture , près du ressort ,
 & la glissera jusqu'au cuir qui la ter-
 mine , pour l'amener vers la pelotte
 en la ferrant convenablement. Alors
 il fera passer le cuir sous la première
 gance , le fixera sur la sous-cuisse , au
 bouton pyriforme , que la deuxième
 gance assujettira de manière à ne pou-
 voir s'échapper. Le malade , ayant
 appliqué son bandage , tirera légère-
 ment les bourses en en-bas , afin d'ef-
 facer les plis que la peau auroit pu
 former dessous la pelotte , bien entendu
 que celle-ci sera assujettie d'une main ,
 pendant cette opération.

Voilà en général , en quoi consiste
 la manière d'appliquer les bandages :

elle exige toujours la situation horizontale, pour les hernies crurales; mais cette situation est rarement nécessaire, lorsque la hernie, supposée inguinale, ombilicale ou ventrale, est incomplète, & tellement mobile, qu'elle cède au moindre attouchement, & fuit en quelque sorte sous la main occupée de son examen ou de sa réduction.

Dans les cas difficiles, comme par exemple, dans de certaines épiplocèles, & dans quelques autres hernies mixtes très-volumineuses, s'il est important d'employer le bandage, il l'est également de donner la plus scrupuleuse attention à ce qui se passe durant les premiers jours de l'application de cet instrument. Quelquefois, quoique le brayer soit construit méthodiquement, il arrive que les muscles & le tissu cellulaire sont si flasques, l'ouverture herniaire si di-

latée , que les parties qui constituent la descente , habituées dans le scrotum , passent par-dessous la pelotte , malgré les précautions qu'on avoit prises pour les maintenir réduites. Ce seroit en vain , dans les cas dont nous parlons , que les malades feroient plusieurs tentatives pour contenir leur descente ; mais il est d'autres moyens , non moins faciles qu'efficaces , qu'ils doivent mettre en usage , afin d'éviter les dangers qu'ils encourroient , en persévérant à vouloir maîtriser la hernie par le bandage seulement.

La conduite que je prescris ordinairement en ces circonstances , consiste à garder le lit quelques jours de suite ; à se procurer la liberté du ventre , par l'usage continué de quelque léger minoratif ; à couvrir l'ouverture qui livre passage à la hernie , avec une compresse épaisse imbibée de quelque décoction astringente ou de

quelque emplâtre de même propriété, soutenus l'une & l'autre par la pelotte du bandage. La réunion de ces divers moyens donne aux parties soumises à la pression, le ton & le ressort qu'elles avoient perdus, & rend aux malades une entière sécurité.

Des bandages propres à contenir les chûtes ou les renversemens du vagin, du rectum, les chûtes ou descentes de matrice.

Quoique à proprement parler ces dérangemens ne soient pas des hernies, on les range dans la même classe, parce qu'ils exigent le même genre de secours de la part de l'Herniaire.

Il est d'autant plus essentiel de contenir le renversement du vagin dès les premiers tems de sa formation, que négligé, il fait de jour en jour,

de nouveaux progrès, augmente de volume, s'endurcit & devient enfin une source perpétuelle de maux & d'infirmités. Ici comme dans toutes les hernies, on procède d'abord à la réduction, & l'on fait garder le lit à la malade. Si la chute est récente & peu considérable, une injection astringente, celle par exemple, qu'on a conseillée pour le bubonocèle des enfans, opère quelquefois la guérison. Il faut la porter froide dans le vagin plusieurs fois le jour, au moyen d'une seringue à bec en arrosoir, & lorsqu'elle est sortie, placer dans ce canal, un petit tampon imbibé de la même décoction. Lorsque ce moyen ne réussit point, ou qu'on ne juge pas à propos de le tenter, il faut sans différer appliquer un pessaire. On donne à cet instrument construit d'un corps léger, comme nous le dirons bientôt, la forme d'un cylindre, percé

dans son grand diamètre comme un grain de chapelet , pour laisser échapper les humidités de la matrice. Il est essentiel , pendant l'usage du pessaire, qu'on s'injecte , au moins , une fois le jour ; & comme la chute du vagin ne s'oppose pas à la fécondation , la femme peut devenir grosse , & alors même , elle doit garder le pessaire jusqu'aux approches de l'accouchement. Enfin l'habileté de l'Artiste en cette circonstance consiste moins dans le choix de la matière dont il construit l'instrument , que dans les justes dimensions qu'il lui donne : trop libres dans le vagin , ils ne s'opposent pas à son renversement ; trop gros , ils contondent , engorgent , enflamment ses parois. Ceux qu'on destine à soutenir la matrice , sont susceptibles des mêmes défauts.

La descente de matrice est également contenue par un pessaire ,

mais la forme de celui-ci diffère du précédent par des nuances que nous aurons soin de faire remarquer. Lorsque le col de ce viscère est descendu très-bas dans le vagin, on ne peut pas toujours appliquer cet instrument : quelques jours de repos dans le lit procurent ordinairement un peu d'ascension, dont on profite pour mettre le pessaire en place. Ce pessaire, percé comme le précédent, dans son milieu, doit avoir la face qui reçoit le col de la matrice, concave, ou taillée en cuvette, selon l'expression de M. Levret.

Une descente de matrice, soignée, comme il convient, dès les premiers tems de sa formation, non-seulement est contenue, mais elle guérit, sans que le moyen qu'on emploie fasse souffrir la malade qui en fait usage : il arrive souvent aussi que la descente est négligée, alors elle fait des progrès, tels, que

le viscère affecté, vient se montrer extérieurement; l'urine, toujours plus ou moins âcre, le froissement des cuisses & l'impression du linge, l'ensanglantent, l'escorient & rendent la réduction douloureuse & difficile : on parvient bien, par la situation & les applications émollientes, à obtenir le remplacement de la matrice; mais quelque doux, quelque peu gênant que soit pour l'ordinaire le pessaire, il est des femmes qui n'en peuvent soutenir la présence, à cause des douleurs qu'il occasionne & qu'il feroit dangereux de négliger. Dans ces cas, je me suis servi souvent, & toujours avec succès, d'une vessie, mise d'abord dans le vagin, convenablement soutenue & remplie d'air au degré nécessaire, par le moyen d'un soufflet. J'ai changé la vessie tous les deux ou trois jours, n'omettant point les injections appropriées, & j'ai continué

jusqu'à ce que les ulcères fussent guéris & la douleur évanouie.

Les descentes de matrice étant très-communes, on a cherché dans tous les tems les moyens de les contenir, sans jamais être satisfait d'aucun. En général c'est le pessaire qui réunit le plus de suffrages. Celui-ci peut être d'ivoire ou de liége imbibé & recouvert de cire, qu'on s'est plu quelquefois à dérober à l'œil par l'application d'une ou plusieurs feuilles d'argent. La partie supérieure du pessaire d'ivoire a plus ou moins d'étendue en raison du volume des parties qu'elle doit supporter. Elle est arrondie & creusée pour recevoir le museau de tanche, & percée, pour laisser librement échapper les humidités utérines. Cette partie du pessaire présente un bourlet arrondi, & cette forme a des inconvéniens, que nous avons écartés des pessaires de notre

construction. Le bourlet étant destiné comme on fait, pour embrasser & soulever légèrement le col de la matrice, il est évident qu'il remplira moins bien sa destination, qu'un bord incliné de haut en bas & de dehors en dedans.

Quelque forme qu'on donne à la partie supérieure de ce pessaire, elle est soutenue par trois branches de 6 à 7 lignes de long, terminées inférieurement par un corps rond de 4 lignes de haut, sur 14 de circonférence. Ce corps rond est percé & a trois pas de vis destinés à recevoir la tige, qui sans y comprendre la partie vissée, a $2, 2 \frac{1}{2}, 3$ pouces de longueur, sur 14 lignes de circonférence; cette tige est terminée par une espèce de mamelon, bien poli, percé de quatre trous opposés, auxquels on coud une des extrémités des sous-cuisses, tandis que l'autre

extrémité va s'attacher à la ceinture fixée autour du corps.

Le pessaire de liège couvert de cire, a pour lui des succès & le suffrage du célèbre M. Levret ; mais dans la hernie vraiment complete, il trompe quelquefois l'espoir du praticien. En effet si ce pessaire ne remplit pas entièrement le conduit vaginal, s'il ne pose pas continuellement, sur les tubérosités des os ischion, la matrice ne peut manquer de le repousser & de descendre avec lui. D'ailleurs, pour contenir une descente de matrice, quelque petite qu'elle soit, par ce moyen, il faut que ce moyen soit lui-même retenu par le ressort des parties, ce qui suppose une compression fatigante qui peut entraîner des accidents de conséquence, sur-tout des engorgemens qu'il est quelquefois difficile de dissiper, même en enlevant le

corps étranger qui les a produits. Enfin si la matrice déplacée a séjourné long-temps dans le vagin & au bord de la vulve, ce conduit est dans un grand relâchement, ce qui nécessite un pessaire d'un grand volume, les parties revenant avec le temps sur elles-mêmes, pressent ce corps de toutes parts & rendent difficile, pénible, douloureuse son extraction, nécessaire néanmoins soit pour le laver, soit pour faire cesser les douleurs qu'il produit. Cette extraction demande beaucoup de prudence : un peu trop de force ou de précipitation peut occasionner des déchiremens. En pareille circonstance, j'ai mis en usage les bains & les injections émollientes, quelquefois même la saignée, comme moyens préparatoires, & j'ai à m'applaudir de la sage circonspection qui me les a suggérés.

Dans ces derniers temps, on a cru reconnoître dans la gomme élastique une matière infiniment propre à former des pessaires, & les essais déjà faits de cette substance ont prouvé que l'art herniaire pourroit tirer un grand parti des qualités rares qu'elle réunit, la souplesse, la force, le ressort & sur-tout sa presque indissolubilité dans les menstrues animaux. C'est par le vice de la construction que les pessaires de gomme élastique, n'ont point réussi, comme on l'espéroit. En effet, devoit-on s'attendre qu'un corps de forme ovulaire, fait de peau, rembourré de laine & enduit superficiellement d'une dissolution de gomme élastique, soutiendrait le poids de la matrice, & les contractions musculaires qui tendent à la déprimer ? ne voit-on pas que ce pessaire, avec tous les inconvéniens du pessaire de liège, est encore susceptible de s'amollir

s'amollir par la chaleur, de changer de forme & de céder au moindre effort.

Le pessaire fait de gomme élastique pure, ne réussit pas davantage. Les vases de cette matière qui nous viennent par le commerce, ont en général la forme d'une figue. Cette forme, déjà peu favorable, est passagère & fugitive : à peine a-t-il éprouvé la chaleur du lieu, qu'il s'affaisse, s'allonge, s'échappe par la vulve & ne soutient plus.

Il est certain qu'un pessaire à tige, maintenu par quatre sous-cuisses, mérite la préférence dans la plûpart des cas; tant parce qu'il est le seul qui puisse offrir, sans blesser les parties, une résistance suffisante aux divers mouvemens de la malade qui tendent à chasser la matrice, que parce qu'il peut seul permettre & même faciliter les injections capables de

concourir à la guérison radicale de cette espèce de descente. Comme les Artistes dont nous avons fait connoître les tentatives sur la gomme élastique , nous employons cette substance à la construction de nos pessaires, mais d'une manière si différente que nos machines n'ont presque rien de commun avec celles du même genre, construites par d'autres mains. Nos pessaires contiennent également la descente de matrice , les hernies vaginales & les renversemens de vagin, ce qui leur a mérité la préférence sur ceux qu'on connoît déjà dans la capitale , au jugement de plusieurs Chirurgiens éclairés , témoins impartiaux de leur application. Nous allons décrire ces nouveaux pessaires , afin de mettre tout Artiste intelligent à portée de les construire & d'en reconnoître la supériorité : ils s'appercevront sur-tout dès le premier essai, que

sans avoir la dureté contondante des pessaires d'ivoire, ils en ont toute la solidité, que leur introduction est plus facile, leur dérangement plus difficile & moins dangereux, &c. Voici la forme & la construction de notre pessaire à tige creuse, de gomme élastique.

Il est composé de quatre pièces d'ivoire & d'un vase de gomme élastique. La première pièce est un entonnoir de six lignes de haut, sur dix lignes de diamètre à sa partie supérieure, & de cinq à sa partie inférieure ; ce qui donne quatre lignes de diamètre à son ouverture inférieure. Le bord de la partie supérieure de cet entonnoir, est en plan incliné, de la circonférence au centre, & percé dans son pourtour de petits trous, destinés à recevoir quelques points d'aiguille, qui fixeront une légère garniture de crin,

propre à maintenir le ressort du vaisseau de gomme élastique dont on va le recouvrir.

La seconde pièce est une vis creuse, en forme d'entonnoir, d'un pouce de longueur, sur six lignes de diamètre à sa partie supérieure, & de trois dans l'étendue de la partie vissée. Celle-ci a neuf lignes de longueur, & deux lignes de diamètre à son ouverture inférieure. La hauteur de la partie évasée est de trois lignes. La partie supérieure de cette pièce doit être contenue, dans le premier entonnoir que nous avons décrit, & sa partie vissée, dans la tige du pessaire.

Cette tige, qui forme la troisième pièce de notre machine, est un cylindre creusé dans toute sa longueur, pour permettre la sortie des humidités utérines & l'entrée des injections, médicales ou de propreté. Sa longueur

ordinaire est de deux pouces quelques lignes , sur cinq lignes de diamètre. La partie supérieure de cette pièce reçoit le petit entonnoir , au moyen des pas de vis qu'on y a pratiqués , & répond au collet du grand entonnoir ; sa partie inférieure est terminée en vis , afin de s'adapter solidement au mamelon perforé qui la termine. La hauteur du mamelon est de quatre lignes ; & son diamètre , près de son insertion à la tige , de cinq lignes , & de huit à sa base. Il est terminé par une face plane , percée de plusieurs petits trous , qui répondent dans l'intérieur auprès des pas de vis. Ces petits trous donnent attache aux sous-cuisses , qui sont arrangées de manière à ne pas diminuer le canal qui traverse toute la tige.

Le vase de gomme élastique , qui doit couronner cette machine , a la

H ;

forme d'une poire à long col. Sa partie étroite est percée d'un petit trou : on en perce un second au milieu de son fond , d'une ligne de diamètre à-peu-près. Avant de monter ces pièces , on garnit le bord supérieur du grand entonnoir , d'un bourrelet de crin , plus ou moins évasé , de la manière qu'on l'a dit plus haut. Je donne la préférence au crin sur d'autres matières , parce qu'il jouit d'un plus grand ressort.

On insinue l'entonnoir ainsi garni , dans le vase de gomme élastique , de manière que son grand diamètre réponde au fond du vase , c'est-à-dire , qu'il regarde le petit trou qu'on vient d'y pratiquer. Dans ce petit trou l'on insinue la vis creuse , qu'on enfonce dans l'entonnoir , où elle reste libre , ayant moins de diamètre que la cavité qui la reçoit. Le petit entonnoir , que forme cette

vis , reste visible à la face externe du fond du vase , parce qu'il ne sauroit franchir ce trou , qu'on a fait à dessein plus étroit que la pièce qu'il doit recevoir ; ce qui fait que la gomme élastique étrangle en quelque sorte son col , tandis que la partie inférieure entre dans l'entonnoir interne , en même-temps qu'elle est reçue par la tige placée dans le col du vase. On assujettit ce petit entonnoir , avec le pouce , en l'enfonçant dans le grand , tandis que de l'autre main on tourne la tige , qui se visse à la partie inférieure , jusqu'à ce que la pièce ne vacille point , c'est-à-dire , jusqu'à ce qu'on éprouve la résistance qui garantit la solidité nécessaire à tout l'instrument. Alors le grand entonnoir se trouve assujetti entre la partie évasée de la vis & la partie supérieure de la tige , qui est comme collée sur cette

pièce ; tandis que le fond du vase se trouve comprimé par les parois internes du grand entonnoir & les parois externes du petit , de manière à ne pouvoir changer de position ni de forme. Par cette conformation infiniment plus simple qu'elle ne le paroît dans la description , le fond du vase se rapproche de son col , à-peu-près comme le cul d'une bouteille , rentre dans son corps , & forme une cavité plus ou moins large , plus ou moins profonde , en raison du développement & de l'élévation du bourrelet , & proportionnée au museau de tanche qui doit s'y loger & s'y fixer à demeure. Après que le col du vase a recouvert la tige du pessaire , on l'assujettit dans l'endroit où commence la partie vissée ; mais on le conserve assez long pour qu'il recouvre le mamelon , afin de garantir les grandes lèvres de l'impression de l'ivoire. Avant de visser ce mamelon , on y

fixe les sous-cuisses, de manière que les points de fil ne forment point d'asperités, ce qui ne laisseroit point d'importuner les malades.

Pour les hernies vaginales & les renversemens de vagin, nous donnons à notre pessaire la forme d'un cylindre, mais il est essentiellement composé des mêmes pièces; avec cette différence que l'entonnoir qui répond au col de la matrice, est moins profond & moins évasé, & présente une surface presque plane. La partie inférieure de ce dernier pessaire est évasée & terminée comme la supérieure, mais avant de les recouvrir l'une & l'autre de gomme élastique, on les garnit, ainsi que la tige, convenablement, pour leur donner & la forme & le ressort convenables à leur destination.

On sent que la gomme élastique est préférable au linge imbibé de

cire, & nous pourrions nous dispenser d'en faire l'apologie. Aussi lorsqu'on nous demande des pessaires *spiraux* de M. Hoin, nous employons cette matière qui résiste puissamment aux humidités utérines & vaginales; nous l'employons encore, pour les petits enfans, à recouvrir les bandages, afin de les garantir de la corrosion, & les parties qui les supportent, de l'inflammation inséparable du contact & du séjour des matières âcres contenues dans les urines.

Les chûtes du rectum présentent souvent de grandes difficultés à celui qui cherche à les contenir. On a proposé diverses machines, pour retenir en place le fondement. Toutes les formes ont été soumises à l'épreuve de l'expérience, & aucune n'a mérité l'entière confiance des praticiens. Tel instrument contient fort bien la partie, dans les efforts pour rendre les excré-

mens , & blesse dans la marche ; tel autre contient fort bien , tant qu'il reste en place , mais il est difficile à fixer ; l'espèce de pessaire proposé par Arnaud , n'a guère réussi que dans ses mains. Enfin il est des cas où tout instrument devient inapplicable : tel est celui d'un renversement du *rectum*, produit & entretenu par des paquets d'hémorroïdes. Pour ce cas particulier , M. Lavédan , dans la 2^e. édition de sa dissertation sur les hémorroïdes , propose un bandage , que j'ai appliqué souvent avec succès , le voici : » avec de la charpie fine » & mollette , on remplit le creux » du fondement , on élève , couche » par couche , une sorte de massif , » qui dépasse un peu le périnée & » le coccx. On passe sur la charpie , » de derrière en devant , la longue » branche d'un bandage en T , & » on la fixe aux branches croisées.

» sur le pubis «. Comme M. Lavédan, j'ai vu cet appareil réussir lorsque les machines ordinaires avoient échoué. Il est le meilleur de tous pour les personnes qui montent à cheval. On l'ôte pour aller à la selle, on lave la partie & on le rapplique aussi-tôt. Il ne s'oppose point à la sortie des vents, comme je le croyois, avant que l'expérience m'eût détrompé.

Des bandages propres à l'écoulement involontaire des urines, ou sphincters artificiels.

Il seroit très-difficile de décrire la forme, la construction & les usages divers des bandages ou machines destinées à retenir les urines, lorsqu'elles s'échappent involontairement. Les instruments construits à cette fin, sont presque toujours suggérés par les circonstances, & ne

peuvent être employés utilement que par celui qui trouve en lui-même les ressources nécessaires pour les créer au besoin. Le Chirurgien qui manque de génie pourroit bien, par une imitation fervile, venir à bout de construire une machine grossièrement ressemblante à celle qu'il auroit vue décrite, mais cette machine auroit des imperfections que ses yeux ne découvreroient point, & n'atteindroit point son but.

Les petits bandages compressifs qu'on applique chez les individus mâles adultes, peuvent occasionner divers accidents, & rien n'est plus facile que d'en abuser. L'abus est manifeste, lors qu'on prend pour incontinence, un flux d'urine par regorgement. Ici la vessie est toujours atteinte d'une maladie organique, que le bandage ne peut qu'augmenter.

Chez les femmes, l'application au méat urinaire, ou sur l'extrémité antérieure de l'urètre, d'un bandage compressif, d'une sorte d'*obturateur urinaire*, a moins d'inconvéniens que chez les hommes, mais la construction en est plus difficile, l'application & la *fixation* plus embarrassantes. Le point de compression ne peut se prendre ici que sur la face externe ou inférieure de la symphyse des os pubis, tandis que le corps du bandage ne peut trouver son point d'appui qu'autour du corps. Lorsque l'incontinence d'urine a été produite par un accouchement laborieux, lorsqu'elle a sa cause dans l'affoiblissement accidentel du sphincter, le petit bandage, après avoir été long-temps un simple moyen palliatif, devient quelquefois un véritable moyen curatif; & cela par les raisons que nous exposerons dans un instant,

en parlant de l'incontinence d'urine des enfans.

Les enfans des deux sexes, surtout ceux qui sont à la fois très-foibles & très-sensibles, éprouvent souvent l'incommodité dont nous parlons. Pour cette classe de sujets, le petit sphincter artificiel a de grands avantages & peu ou point d'inconvéniens. La cause la plus ordinaire de ces incontinenances d'urine est l'excès de sensibilité de la vessie. L'extrême sensibilité de ce viscère rendroit douloureux son entier développement ; il résiste donc, & ne souffre point son entière évolution. Lorsque la résistance de celle-ci surpasse la résistance du sphincter, les urines coulent spontanément, à mesure qu'elles sont versées, par les uretères dans la vessie, & c'est le cas de l'incontinence d'urine par *regorgement*. Dans les livres de Pathologie, on

restreint le mot regorgement à ne signifier , que cette espèce d'écoulement involontaire des urines , qu'accompagne l'extrême distension de la vessie , & par conséquent l'accumulation d'une quantité considérable d'urine. Mais cette valeur du mot est trop limitée ; il embrasse tous les cas où la résistance du corps de ce viscère , supérieure à celle de son sphincter , le force de s'entr'ouvrir & de livrer passage aux urines retenues : Alors il s'établit une sorte de continuité de canal entre les uretères , la vessie & l'urètre. Chez les jeunes personnes , lorsque la distension de la vessie commence à produire un sentiment confus de mal-aise , ce qui a lieu principalement pendant le sommeil , le sphincter cède & les urines coulent. Dans cette circonstance l'obturateur vient à l'appui du sphincter. La résistance étant augmentée du

côté du canal de l'urètre, la vessie ne peut se vider lorsqu'elle est parvenue à sa dilatation ordinaire; elle est donc forcée par les urines, qui abondent sans cesse, à prendre une plus grande capacité. Ceci ne s'opère pas d'abord sans quelque sentiment de mal-aise ou même de douleur. Lorsque ce sentiment devient trop importun, on lève l'obstacle & les urines coulent. L'obturateur appliqué de nouveau avant que la vessie soit arrivée au degré de dilatation qui la détermine à se vider, ramène ce même sentiment de mal-aise, mais de jour en jour les intervalles s'allongent; parce que la vessie revient peu-à-peu à ses anciennes dimensions; ce qui demande pour l'ordinaire l'espace de plusieurs mois. Pour dire la chose en d'autres termes, d'une manière moins précise à la vérité, mais par-là même plus à la portée d'une partie de nos lec-

teurs , on place le sphincter-artificiel dans le lieu que le sexe détermine ; on le laisse en position jusqu'à ce que le besoin pressant d'uriner se manifeste ; on le lève alors , pour le replacer & le maintenir en place jusqu'au retour du même besoin. Ordinairement les intervalles s'allongent insensiblement , & lorsque la personne peut enfin supporter l'application de son bandage pendant l'espace de 5 à 6 heures , la vessie a repris la meilleure portion de sa capacité & la guérison est avancée & presque assurée. Nous prions nos lecteurs de distinguer en cette occasion l'étiologie , des faits qui lui servent de base. Nous avons d'abord appliqué des bandages avec la seule intention de nous rendre maître des urines. Ces bandages ont opéré des guérisons que nous n'espérions point ; nous avons discuté ces guérisons , & de la discussion que

nous en avons faite , est née enfin leur étiologie , que nous soumettons bien volontiers aux lumières & à la sagacité des maîtres de l'Art. Mais qu'ils ne s'arrêtent pas aux discussions purement spéculatives ; ils se tromperoient peut-être , au moins nous sommes nous trompés nous-mêmes sur un point capital de l'objet que nous traitons. Nous avons apperçu que le sphincter ne manqueroit pas d'être distendu par la même cause qui devoit distendre la vessie , par les urines , & par conséquent , que notre obturateur mettroit lui-même un nouvel obstacle à la guérison & l'évènement nous a trompés. Cherchant à nous rendre compte de l'évènement , nous avons reconnu que dans l'incontinence d'urine par regorgement , il s'établit une sorte de contre-balancement entre la résistance du corps de la vessie & celle de son sphincter.

Le premier résiste-t-il beaucoup & le second peu , ce dernier cède , & les urines coulent, autant de temps que l'action de l'un est supérieure à la résistance de l'autre.

Le sphincter artificiel dont il est ici question ne cède point au même degré d'action que le premier ; il force donc le corps de la vessie de céder encore , de se distendre , après même être arrivé au degré de distension où sa réaction devenoit suffisante pour surmonter la résistance du sphincter naturel. De jour en jour , la constriction de la vessie , sans cesse vaincue par notre obturateur devient moins puissante , cède plus facilement aux urines qui la distendent & en supporte davantage , jusqu'à ce qu'elle arrive enfin à ses dimensions naturelles. Alors on peut supprimer l'obturateur. Pendant quelques jours , le sphincter qui comme

la vessie a souffert une distension contre nature, conserve un certain relâchement maladif; mais bientôt le juste équilibre entre ce muscle constricteur & la vessie se rétablit : car il est plus facile au sphincter de reprendre son état habituel, qu'à la vessie de le perdre encore après l'avoir repris.

De l'utilité des bottines & de leur construction.

Si l'utilité des bottines n'est pas aussi généralement reconnue qu'elle devrait l'être, si, de nos jours même elle est encore problématique, c'est à l'abus qu'on en a fait, qu'on en fait encore, au centre même des lumières, qu'on doit attribuer l'indécision de quelques bons esprits, & l'éloignement de plusieurs autres. On tombe également dans l'erreur soit

en n'employant jamais les bottines, soit en les appliquant à toutes les inflexions ou courbures contre nature des extrémités inférieures, sans restriction, & sans avoir égard à leur cause.

Une courbure de ces extrémités dépendante d'un vice de conformation & de la disproportion entre la résistance des os qui les forment & du poids du corps qui les surcharge, une pareille courbure, dis-je, indique la nécessité d'étayer les jambes, d'empêcher par-là le progrès de la flexion vicieuse & de mettre la nature à portée de reprendre ses droits, de réparer ses torts, & de continuer la végétation dans l'ordre & les proportions qu'elle suit si volontiers, lorsqu'elle n'est pas détournée par les obstacles que la vie efféminée, l'insalubrité des grandes villes, les alimens malsains ou dépravés &c., élèvent sous ses pas.

Mais qu'un corps rachitique , qu'un corps obstrué dans toutes ses capacités , qu'un corps où l'on ne trouve , au lieu d'une véritable lymphe nourricière , que des sucs visqueux , vappides , incapables de fonder les molécules terreuses entr'elles , pour donner aux os leur consistance & leur solidité , se déjette ; la circonstance est différente , & comme elle n'offre pas les mêmes indications , elle ne promet pas les mêmes succès. Ici ce ne sont pas des machines que l'art de guérir indique , c'est un air salubre , une gymnastique proportionnée à l'âge & aux forces de l'enfant , l'insolation , le bon lait ou la bonne nourriture , la propreté , enfin des médicamens , pris sur-tout parmi les substances qui réunissent à la faculté de fondre , celle de fortifier. Si dans ce dernier cas , les bottines peuvent être de quelque usage , ce n'est jamais au premier

période de la maladie : la véritable époque où l'on pourroit en espérer quelque succès , ce seroit celle où la nature commence à surmonter le vice général des humeurs , à se réintégrer dans le libre exercice de ses fonctions.

C'est donc aux inflexions vicieuses qui n'ont d'autre cause que la débilité , la foiblesse de l'individu mal conformé , que le secours des bottines est spécialement & uniquement applicable. Mais aussi le succès est presque assuré dans cette circonstance ; pourvu 1°. qu'on s'y prenne de bonne-heure , avant que l'enfant ait atteint l'âge de l'adolescence , avant que ses os aient acquis assez de solidité pour résister à la puissance qui tend à les redresser. 2°. La seconde condition, non moins essentielle que la première, embrasse la construction des bottines. La bonne construction de ces machines a deux objets &

& peut être considérée sous deux rapports différents : la fabrication des machines en elles-mêmes , & leur conformation relative , c'est-à-dire , leur adaptation exacte aux parties qui doivent les recevoir. Pour obtenir une parfaite adaptation, il est essentiel de bien prendre ses mesures , & ces mesures supposent , sinon de l'habitude , au moins beaucoup d'intelligence dans la personne qui se charge de les lever. Il importe encore beaucoup que ces mesures , supposées bien prises , ne passent point de la personne qui les prend à l'ouvrier , qu'on a quelquefois l'imprudence de charger de l'exécution. Une machine , pour laquelle l'un commande & l'autre exécute , n'est jamais exacte , ou ne l'est jamais que fortuitement & par un hazard nécessairement fort rare. Convaincu de cette vérité , je prends mes mesures , & j'exécute moi-même l'ensemble de ma machine , sans né-

glier aucun de ses détails. Ce n'est que par la réunion de soins intelligents qu'on peut espérer de porter les bottines & les autres machines destinées à rendre au corps humain sa conformation naturelle , lorsqu'il s'en écarte , à ce degré de perfection qui seul peut donner à nos espérances un fondement solide. En effet l'expérience a montré cent fois combien l'on doit peu compter sur ces machines qu'on demande de Province, & qu'on construit dans la Capitale, d'après des renseignemens vagues, & par-là même inexacts & trompeurs. Elles sont toujours imparfaites , lors même qu'on s'est adressé pour leur fabrication à des herniaires habiles ; elles sont souvent meurtrières , lorsqu'on a chargé de ce soin des ouvriers présumptueux, qui prennent pour l'impulsion du talent leur aveugle cupidité. Malgré les inconvéniens attachés à la transmission des mesures des bottines,

de la personne qui les prend à l'Artiste chargé de les construire , si l'état de la fortune des parents , le trop grand éloignement & d'autres causes , empêchoient de conduire l'enfant dans quelque grande ville , on ne devroit pas négliger entièrement les secours que son état exige , & l'on pourroit raisonnablement espérer des bottines plus ou moins parfaites , & par-là plus ou moins utiles en choisissant un bon Artiste , & lui procurant les renseignemens nécessaires , pris avec soin & transmis avec fidélité.

On prend la mesure des bottines de la manière suivante.

Pour la longueur , on pose une bande de papier à la face interne de la jambe , au bas du talon & on la conduit sur le milieu du genou , où on la coupe. On marque ensuite , dans la note dont on accompagne la mesure , 1°. si c'est le genou ,

droit ou gauche, qui se porte en dedans ou en dehors, ou en arrière; 2°. si la jambe mal conformée est plus ou moins longue que l'autre, ou si elles sont égales : si elles étoient toutes les deux difformes, on décrirait séparément leurs défauts : 3°. on ne manquera pas d'observer, si la mauvaise conformation intéresse le corps des os; & dans ce cas on spécifiera, s'ils se portent en dedans ou en dehors, en devant ou en arrière, & l'on mesurera l'espace compris entre le talon & le commencement de la difformité. Dans le lieu où commence l'inflexion l'on tirera un trait de plume, & un second trait vis-à-vis l'endroit où elle se termine. L'espace compris entre ces deux traits de plume indiquera l'étendue de la difformité. Si c'est le pied qui est difforme, on tâchera d'indiquer exactement en quoi cette partie s'éloigne de l'état naturel; & pour compléter


le tableau de la difformité, l'on en transmettra une sorte d'empreinte à l'Artiste, le foulier, dont l'enfant a fait usage. Enfin dans l'exposé qui doit accompagner les mesures, on aura soin d'indiquer l'âge de l'enfant, l'état de ses forces, de sa santé, du reste de la charpente osseuse & les autres circonstances qu'on jugera propres à guider l'Artiste, dans la construction des machines dont il est chargé.

F I N.

Explication de la Planche Ire.

- A.** Epigastre ou région épigastrique , les côtés sont les hypochondres.
- B.** Omilic ou région ombilicale , les côtés sont les flancs.
- E.** Hypogastre ou région hypogastrique supérieure , les côtés sont les iles.
- CC.** Elévations formées par la crête de l'os des iles , & les attaches des muscles abdominaux.
- FF.** Les anneaux des muscles obliques externes , situés dans les aînes , dont le milieu est la région hypogastrique inférieure.
- GG.** Les arcades crurales ou les plis des cuisses.
- II.** Lignes qui indiquent la manière de prendre la mesure du corps , soit pour un bandage simple soit pour un double , inguinal ou crural , & qui marquent l'endroit que le bandage doit recouvrir.
- LL.** Les grands trochanters dont le gauche n'est pas apparent.
- H.** Côté gauche du scrotum , gonflé par la présence d'une portion d'intestin qui forme une hernie inguinale complète , ou oschéocèle.

Planche I^{re}







Planche II^e.



Explication de la Planche IIe.

- D.** Une portion de péritoine qu'on voit descendre dans le scrotum , auquel elle est devenue adhérente, après y avoir été poussée par l'intestin pour former le sac herniaire.
- AA.** L'épiploon dans l'état naturel recouvrant les viscères du bas-ventre.
- B.** Une partie de l'épiploon rangée de côté pour laisser voir les intestins.
- CC.** Les intestins.
- E.** Anse d'intestin descendue dans le scrotum ouvert, formant une hernie complète ou oschéocèle.
- G.** Le testicule situé à la partie inférieure & postérieure de l'intestin déplacé.

T A B L E

DES MATIÈRES.

A VERTISSEMENT , page	j
<i>La hernie , ou descente.</i>	i
<i>Du bas-ventre , ses limites & ses régions.</i>	2
<i>Des parties contenant.</i>	6
<i>De la peau.</i>	ibid.
<i>Du tissu cellulaire & de la graisse.</i>	7
<i>Des muscles abdominaux.</i>	ibid.
<i>De la ligne blanche & des ouvertures naturelles de l'abdomen.</i>	10
<i>Du péritoine & ses ligamens.</i>	15
<i>Des parties contenues.</i>	21
<i>De l'épiploon.</i>	ibid.
<i>De l'estomac.</i>	23
<i>Des intestins , de leurs divisions , &c.</i>	25
<i>De la vessie.</i>	33
<i>Des parties de la génération.</i>	34
<i>De la matrice & ses dépendances.</i>	ibid.
<i>Du scrotum.</i>	37

<i>Des testicules.</i>	39
<i>Des hernies en général.</i>	41
<i>Différences des hernies.</i>	44
<i>Des causes des hernies.</i>	50
<i>Des signes des hernies.</i>	55
<i>Des différentes espèces de hernies.</i>	59
<i>De la hernie inguinale.</i>	ibid.
<i>De la hernie congénitale.</i>	64
<i>De la hernie de vessie, ou cystocèle.</i>	66
<i>De la hernie crurale.</i>	67
<i>De la hernie ombilicale.</i>	69
<i>Des hernies ventrales.</i>	70
<i>De la hernie vaginale & de la chute du vagin.</i>	74
<i>De la descente de matrice.</i>	77
<i>De la hernie obturatrice.</i>	79
<i>De la hernie périnéale.</i>	81
<i>De la réduction des hernies.</i>	82
<i>De la cure des hernies.</i>	87
<i>Des bandages en général.</i>	96
<i>De la fabrication & de la conforma- tion des bandages.</i>	104
<i>De la trempe.</i>	119
<i>Du recuit ou revenu , &c.</i>	120
<i>Des bandages en particulier.</i>	130

<i>Du bandage inguinal simple.</i>	ibid.
<i>Du bandage inguinal double.</i>	133
<i>Du bandage inguinal simple à deux écussons.</i>	137
<i>Avis aux personnes attaquées de her- nies.</i>	ibid.
<i>Du bandage crural.</i>	140
<i>Du bandage ombilical & ventral.</i>	141
<i>De la manière de prendre la mesure des bandages, des renseignemens qu'on doit donner au Chirurgien herniaire chargé de les construire, & des règles à suivre dans leur application, &c.</i>	148
<i>Des bandages propres à contenir les chûtes ou les renversemens du vagin, du rectum, les chûtes ou descentes de matrice.</i>	159
<i>Des bandages propres à l'écoule- ment involontaire des urînes, ou sphincters artificiels.</i>	180
<i>De l'utilité des bottines & de leur construction.</i>	189

A Paris, chez CLOUSIER, Imprimeur
du R O I, rue de Sorbonne. 1789.

A P P R O B A T I O N.

J'AI lu , par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux , un manuscrit , intitulé : *Traité des Hernies , des différens bandages propres à les contenir , & des autres machines du ressort du Chirurgien herniaire* , par M. SELLÉE , Expert du Collège Royal de Chirurgie de Paris , pour la guérison des Descentes. Cet Ouvrage peut être utile aux personnes atteintes de Hernies & à celles qui s'occupent de la confection des bandages , & ne contient rien qui puisse empêcher la permission de l'imprimer. A Paris ce 31 Décembre 1788.

PEYRILHE , Censeur Royal.

P R I V I L È G E D U R O I.

LOUIS , par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand - Conseil , Prévôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra : SALUT. Notre amé le sieur SELLÉE , Expert du Collège Royal de Chirurgie de Paris , Nous a fait exposer qu'il désireroit faire imprimer & donner au Public, *un Traité des Hernies , des différens bandages propres à les contenir , & des autres machines du ressort du Chirurgien Herniaire* ; s'il Nous plaisoit de lui accorder nos Lettres de permission pour ce nécessaires. A C E S C A U S E S , voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera , & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume ; pendant le tems de cinq années consécutives , à compter du jour de la date des Présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs ,

Libraires , & autres personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient , d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance; à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris , dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume , & non ailleurs , en bon papier & en beaux caractères ; que l'Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie , & notamment à celui du 10 Avril 1725 , & à l'Arrêt de notre Conseil du 30 Août 1777 , à peine de déchéance de la présente Permission ; qu'avant de l'exposer en vente , le Manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage , sera remis dans le même état ou l'Approbation aura été donnée , ès mains de notre très - cher & féal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le Sieur BARENTIN ; qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique , un dans celle de notre Château du Louvre , un dans celle de notre très - cher & féal Chevalier , Chancelier de France , le sieur DE MEAUCOU , & un dans celle dudit sieur de BARENTIN ; le tout à peine de nullité des Présentes ;

DU CONTENU desquelles vous MANDONS & enjoignons de faire jouir ledit Exposant & ses ayans-cause , pleinement & paisiblement , sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la copie des Présentes , qui sera imprimée tout au long , au commencement ou à la fin dudit Ouvrage , foi soit ajoutée comme à l'original. COMMANDONS , au premier notre Huissier ou Sergent , sur ce requis , de faire pour l'exécution d'icelles , tous Actes requis & nécessaires , sans demander autre permission , & nonobstant clameur de Haro , Charte Normande , & Lettres à ce contraires. CAR tel est notre plaisir. DONNÉ à Paris , le vingt-cinquième jour du mois de Février , l'an de grace mil sept cent quatre vingt-neuf , & de notre Règne le quinzième. Par le Roi en son Conseil.

LEBEGUE.


Registré sur le Registre XXIV de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires-Imprimeurs de Paris , no. 1848 , Fol. 142 , conformément aux dispositions énoncées dans la présente Permission ; & a la charge de remettre à ladite Chambre les neuf exemplaires prescrits par l'Arrêt du Conseil du 16 Avril 1785. A Paris , le 10 Mars 1789. KNAPEN , Syndic.

RECHERCHES

S U R

LES MALADIES
VÉNÉRIENNES - CHRONIQUES ,

SANS SIGNES ÉVIDENS.



RECHERCHES

S U R

LES MALADIES VÉNÉRIENNES - CHRONIQUES

SANS SIGNES ÉVIDENS;

C'EST-A-DIRE,
MASQUÉES, DÉGÉNÉRÉES
OU COMPLIQUÉES.


Par M. CARRÈRE,

*Conseiller - Médecin ordinaire du Roi ,
Professeur Royal émérite en Médecine ,
Censeur Royal , ancien Inspecteur-Général
des Eaux minérales de la province du
Roussillon , & du comté de Foix ; de la
Société Royale de Médecine , de celle des
Sciences de Montpellier ; des Académies de
Toulouse , des Curieux de la Nature , &c.*



A P A R I S ,

Chez CUCHET, Libraire , rue & hôtel
Serpente.





RECHERCHES

S U R

LES MALADIES

VÉNÉRIENNES-CHRONIQUES,

SANS SIGNES ÉVIDENS,

C E S T - A - D I R E ;

MASQUÉES, DÉGÉNÉRÉES
OU COMPLIQUÉES.

IL n'est point de maladie sur laquelle on ait tant écrit, que sur les maladies vénériennes ; les ouvrages se sont multipliés au point que leur collection formeroit une bibliothèque assez considérable ; mais les gens de l'Art ne les ont jamais considérées que dans l'état où des signes évidens en démontrent l'existence ;

A,

si quelques-uns d'entr'eux se sont occupés de celles, qui, masquées sous la forme de différentes autres maladies, échappent le plus souvent aux regards les plus attentifs & à l'attention la plus réfléchie, ils ne l'ont fait, pour ainsi dire, qu'en passant, & d'une manière succincte; les idées qu'ils en ont données, ne sont que comme de simples aperçus, bornés à quelques assertions établies sans aucuns principes préliminaires, à quelques observations, à quelques résultats, souvent à de pures conjectures: elles n'ont aucun ordre, aucune suite, aucune liaison; elles sont dispersées dans des ouvrages plus ou moins volumineux, noyées dans une foule d'idées, d'observations, de préceptes, qui leur sont étrangers, difficiles à trouver, à connoître, par conséquent peu utiles, malgré le degré d'instruction qu'elles peuvent présenter.

Ces maladies masquées, dégénérées ou compliquées avec d'autres vices,

ont été cependant observées presque dès les premiers momens de l'apparition des maladies vénériennes en Europe ; beaucoup de Praticiens en ont parlé ; mais il n'en est aucun qui s'en soit occupé particulièrement ; M. *Sanchez* est le seul qui ait cherché à fixer l'attention des gens de l'Art sur un objet aussi important ; il est entré dans des détails assez intéressans , mais vagues , trop dispersés dans l'ouvrage qu'il a publié sur les maladies vénériennes , & encore insuffisans pour établir une doctrine positive sur les maladies vénériennes-chroniques.

J'ai cru qu'il seroit avantageux d'avoir un ouvrage particulier sur une maladie , qu'on porte souvent sans s'en douter , qui , assoupie pendant plusieurs années , se développe tout-à-coup avec plus d'activité , qui , dégénérée de sa nature primitive , prend un caractère qui paroît lui être étranger , qui se montre souvent sous l'aspect trompeur de ma-

ladies tout-à-fait différentes , qui fait des ravages d'autant plus certains, qu'on en méconnoît le principe , qui , déguisée sous toutes sortes de formes , échappe à la sagacité des Maîtres de l'Art & élude l'action des médicamens. Je l'ai entrepris avec d'autant plus de confiance , qu'une longue expérience m'a convaincu de l'existence de ces maladies , de la difficulté d'en établir un diagnostic certain, de les distinguer de celles dont elles prennent la forme & le caractère, de l'inutilité de nos efforts pour les combattre , & du grand nombre de victimes qu'elles moissonnent continuellement. Je réunirai sur un même tableau les préceptes épars des Maîtres de l'Art , & les observations isolées qu'ils nous ont transmises ; j'y joindrai mes propres observations , & quelques vues particulières , qui sont le résultat de mes réflexions & de ce que j'ai vu dans le cours d'une longue pratique.

CHAPITRE PREMIER.

DES MALADIES VÉNÉRIENNES- CHRONIQUES EN GÉNÉRAL.

ON appelle ordinairement *Maladies Chroniques*, celles qui parcourent lentement leurs périodes, & dont la durée s'étend au-delà d'un espace de quarante jours : sous ce point de vue, presque toutes les Maladies Vénériennes sont Chroniques; il en est peu qui ne s'étendent au-delà de ce terme; il en est beaucoup qui durent plusieurs mois, même plusieurs années; mais je ne comprendrai sous cette dénomination, que celles qui infectent la masse du sang, ou attaquent l'organisme de nos solides, sans donner aucun signe évident de leur existence, soit qu'elles restent long-tems assoupies pour se développer ensuite avec plus d'énergie, soit que, dégénérées de leur nature pri-

mitive, elles se cachent sous la forme insidieuse de plusieurs maladies qui paroissent n'avoir aucun rapport avec elles, soit que, compliquées avec d'autres vices particuliers, elles en prennent le caractère, ou se développent avec plus d'activité, ou en augmentent l'énergie; soit encore qu'on les tienne d'un vice héréditaire, soit qu'on les doive à un vice contracté. J'appellerai donc *Maladies Vénériennes-Chroniques*, toutes les maladies chroniques qui reconnoissent pour principe un vice vénérien, assoupi, caché, masqué, dégénéré ou compliqué.

ARTICLE PREMIER.

Existence de ces maladies.

L'existence des Maladies Vénériennes - Chroniques est certaine; quoique peu de Praticiens en aient parlé, aucun ne les révoque en doute; les autorités se présenteroient ici en foule pour confirmer cette vérité.

Je pourrois citer le temoignage :

1°. De *Mercurialis*, qui y croit au point, qu'il n'hésite pas à prononcer que toutes les fois qu'une maladie résiste aux remedes ordinaires, il y a lieu de craindre qu'elle ne soit entretenue ou produite par un vice vénérien.

2°. De *Fracastor* (a), de *Capodi-Vacca* (b), de *Tomitanus* (c), de *M. Agustini* (d), de *M. Schwediaver* (e), qui assurent que la maladie véné-

(a) *Fracastor*, *opera omnia*; Venise, 1555, in-4°. *Aphrodisiac*. p. 199.

(b) *Capivaccius*, *méth. pract. med.* Lyon, 1596. in-8. liv. V. p. 974.

(c) *Tomitanus*, *de morbo gallico*, dans la *Collection de Luifinus*; Lyon, 1728. in-fol. p. 1051 -- 1052.

(d) *Agustini*, *Stranguria quæ venerea dicitur, mercurii aliquando potest esse effectus*. Venise, 1763. in-8°.

(e) *Schwediaver*, *Observ. prat. sur les Malad. Vénér.* Paris, 1785. in-8°. p. 302.

rienne reste quelquefois assoupie pendant plusieurs années.

3°. De *Vigo*, qui a guéri différentes maladies chroniques des yeux, dépendantes de cette maladie.

4°. De *Fernel* (a), de *Cardan* (b), d'*Ingrassias* (c), d'*Ettmuller* (d), de *Duclos* (e), de *Baglivi* (f), de *M. Louis*

(a) *Fernel*, *De abditis rerum causis* Paris, 1560. in-8°. liv. II. ch. 14.

(b) *Cardan*, *In lib. HIPPOCR. de alim. comment*; Basle, 1582. in-8°. p. 266.

(c) *Ingrassias*, rapporté par *Cardan*, *ibid.*

(d) *Ettmuller*, *Opera medica*; Francfort, 1708. in-fol. *De Chirurg. transfus.* ch. 3. concl. 14. tom. 3. p. 115.

(e) *Duclos*, *Epist. ad Gr. Horstium...* apud *Horstium*, *opera medica*, Nuremberg, 1660. in-fol. liv. XI. obs. 14.

(f) *Baglivi*, *Opera omnia*; Lyon, 1733. in-4°. *prax. med.* lib. I. *De lue venerea*, p. 95.

(a), qui ont vu ces maladies céder à l'action des remèdes , rester ensuite assoupies , & se développer de nouveau après un tems très-long , même après dix , vingt & trente ans.

5°. De Blegny (b), de Baglivi (c) , de van-Swieten (d), & de M. Sanchès (e) , selon lesquels le virus vénérien peut s'introduire dans le corps sans aucune marque extérieure de son action & de sa pénétration.

6°. De Sydenham (f), d'Ucay (g) ,

(a) Louis , *Parallele des différ. méth. de traiter les Malad. Vén.* Amsterd. 1764. in-12. p. 14.

(b) Blegny , *L'art de guérir les malad. vénér.* Lyon , 1692. in-12. p. 134.

(c) Baglivi, *ibid.* p. 98.

(d) Swieten , *Comment. in Boerh. Aph.* Tome V, Paris, 1773. in-40. p. 352.

(e) Sanchès , *Obs. sur les malad. vénér.* Paris ; 1785. in-12. p. 154.

(f) Sydenham , *Opera* ; Leide , 1726. in-8°. *Epist. ad HENR. PAMAM*, p. 413.

(g) Ucay , *Tr. de la malad. vénér.* Paris ; 1718. in-12. p. 146.

& de *van-Swieten* (a), qui assurent qu'on porte souvent ce virus dans la masse du sang, sans aucune incommodité sensible, & même avec les signes d'une bonne santé.

7°. De *Turner* (b), qui a vu cette maladie se développer après avoir été cachée pendant dix ans.

8°. De *M. Louis* (c), qui en indique le caractère, de *Baglivi* (d), qui en détermine le siège, de *Fracastor* (e), de *Tomitanus* (f), de *Jordanus* (g),

(a) *Swieten*, *ibid.* p. 354.

(b) *Turner*, *Syphilis a practical dissertation of Venereal disease*. Londres, 1732. in-8°. hist. 16. p. 297 & suiv.

(c) *Louis*, *ibid.* p. 19, 20 & 21.

(d) *Baglivi*, *ibid.* p. 97.

(e) *Fracastor*, *ibid.*

(f) *Tomitanus*, *ibid.*

(g) *Jordanus*, *De Lue novâ Moraviæ*, rap-

SUR LES MALAD. VÉNÉRIENNES. II

de *van-Swieten* (a) , de *M. Vigarous* (b) , qui en décrivent les signes , de *MM. Louis* (c) & *Vigarous* (d) , qui en examinent quelques complications , de *M. Kern* (e) , qui en indique les effets , eu égard aux parties sur lesquelles le virus se dépose.

9°. Enfin , de *Levinus Lemnius* (f) ;

porté par *Schenckius*, *Obs. med. rarior. lib. VII.* Lyon, 1664. fol..... liv. VI. p. 792.

(a) *Swieten*, *ibid.* p. 352 , 354.

(b) *Vigarous*, *Obs. & rem. sur la complic. des sympt. vénér. avec d'autres virus* ; Montpellier, 178c. in-8°. p. 23 , 24 , 25 & 50.

(c) *Louis* , *ibid.* p. 8 & 9.

(d) *Vigarous* , *ibid.* p. 9 , 54 , 103 & suiv.

(e) *Kern*, *De infallibili remedio prophylactico Syphileos* ; Fribourg , 1777. in-8°. pag. 18.

(f) *Levinus Lemnius*, *De occultis naturæ miraculis* ; Anvers , 1574. in-8°. liv. II. ch. 14. p. 174.

de MM. O-Connel (a), Bisset (b), & Sanchès (c), qui ont donné un tableau succinct, mais exact de ces maladies, auxquels on peut joindre M. Vigarous (d), qui a traité particulièrement de la complication du virus vénérien avec quelques autres vices qui en sont absolument différens.

A R T I C L E II.

Description de ces Maladies.

Beaucoup de Praticiens ont parlé des maladies vénériennes-chroniques, mais ils ne les ont point décrites ;

(a) O-Connel, *Obs. medic. exper.* Dublin, 1746. in-8°. p. 407.

(b) Bisset, *Medical essays and observations* ; Londres, 1766. in-8°. sect. 17. pag. 130, 195 & suiv.

(c) Sanchès, *ibid.* 180.

(d) Vigarous, *ibid.* p. 23, 24, 25, 50 & 103.

Levinus Lemnius, & MM. *Bisset*, *O-Connel* & *Sanchès* sont les seuls qui aient tracé un tableau succinct des maux qu'elles peuvent produire; encore M. *Bisset* n'a-t-il point donné ce nom aux maladies qu'il a décrites; il les a présentées sous celui de *Land-Scurwy*, c'est-à-dire *Scorbut de terre*. M. *Sanchès* croit que ce Médecin a voulu flatter ses malades en leur déguisant le vrai nom de leur maladie; il se fonde surtout sur ce que la réunion des symptômes décrits, présente le vrai caractère d'un vice vénérien dégénéré, & que M. *Bisset* recommande beaucoup les mercuriaux, qui seroient un remède vraiment dangereux si la maladie étoit réellement scorbutique; mais il observe avec raison que c'est induire les jeunes Médecins en erreur; il auroit pu ajouter que c'est aussi entretenir les malades dans une sécurité qui peut avoir des suites fâcheuses. La conjecture de M. *Sanchès* est d'autant plus vraisemblable, que

M. *O-Connel*, que je viens de citer , avertit que les maladies chroniques , hypocondriaques , cachectiques , qui dépendent d'un vice vénérien dégénéré , sont assez communément rangées dans la classe des scorbutiques.

Baglivi est entré dans des détails assez positifs , & M. *Van-Swieten* a établi quelques résultats , qu'il a déduits des seules observations de *Tomitanus* & de *Jordanus* ; il paroît que ce Médecin n'a point connu les observations & les assertions de *Levinus Lemnius* , de *Baglivi* , d'*O-Connel* & de *Bisset* ; il en auroit déduit des conséquences utiles. M. *Sanchès* , qui les a connues & citées , en a fait une application d'autant plus juste & plus utile , qu'une expérience longue & heureuse l'a mis à portée de les comparer avec ses observations ; aussi , devons nous à ce Médecin les détails les plus complets que nous aions jusqu'ici sur

la doctrine des maladies vénériennes-chroniques.

La réunion des symptômes décrits par ces Médecins , peut former un tableau intéressant ; mais il seroit encore insuffisant ; il ne peut être complet , qu'en puisant des nouvelles lumières dans les écrits des autres Praticiens qui ont parlé de ces maladies ; c'est en comparant les assertions , les observations , les réflexions , les vues particulières des uns & des autres , en les combinant ensemble , qu'on peut établir des résultats exacts & utiles ; c'est aussi ce que j'ai fait , & c'est de cette réunion que dérive le tableau que je vais tracer de ces maladies , en y ajoutant le résultat de mes observations particulières.

Je n'entreprendrai point cependant d'en donner une description précise ; ces maladies se masquent & se présentent sous trop de formes ; il n'est

presque point de maladie chronique , qui ne puisse en dépendre , ou se combiner avec elles.

Nous les voions tous les jours se présenter sous la forme d'érésipèles , dartres , boutons , ou pustules sur différentes parties du corps , de douleurs de sciatique , nocturnes , catarrhales , rhumatiques , de phthisie , soit pulmonaire , soit nerveuse , de fièvre hectique , de fièvre nerveuse , de toutes sortes de maux de nerfs , d'ophtalmies rebelles , & différentes autres maladies des yeux , &c.

Nous les voions produire des gonflemens & des duretés des glandes , des tumeurs & des squirres qui résistent aux remèdes ordinaires , des ulcères & des plaies , le plus souvent de très-mauvaise qualité , des obstructions des viscères qu'on attaque inutilement par les apéritifs , des tremblemens de membres , différens vices de l'estomac dont on méconnoît le principe , une

irrégularité souvent funeste dans le cours des regles, des toux séches ou humides, habituelles, ou revenant par intervalles, quelquefois convulsives, qu'on confond souvent avec des toux catarrhales, différentes maladies, toujours fâcheuses, & le plus souvent funestes, comme l'asthme, la cachexie, l'hydropisie, la dysurie, & autres affections de la vessie, la paralysie, l'épilepsie, l'apoplexie, &c.

Nous les voions se compliquer avec les vices cancéreux, scrophuleux, rachitique, scorbutique, goutteux, rhumatismal, dartreux, laiteux, &c. les développer ou augmenter leur activité, tandis qu'elles en reçoivent à leur tour un nouveau degré d'énergie. Nous les voions même former quelquefois, par le mélange & la combinaison de vices aussi différens, des maladies singulieres, d'un caractère incertain, sans type, sans ordre, tantôt insidieuses par leur marche sourde, cachée, & inconnue ;

tantôt cruelles par les ravages qu'elles produisent, toujours destructives de la constitution de la machine, le plus souvent méconnoissables aux yeux de l'observateur, par conséquent incurables par l'ignorance où l'on est du principe qui les produit.

Enfin, nous les voions souvent être la cause de l'extinction des familles, nuire à la propagation de l'espèce, en détruisant ou amortissant chez les hommes le principe & les facultés qui doivent l'opérer, & en altérant chez les femmes le jeu des organes qui doivent y concourir.

Il faudroit donner autant de descriptions qu'il y a de maladies, en lesquelles le vice vénérien peut dégénérer, ou qu'il peut produire, ou bien enfin avec lesquelles il peut se combiner; les détails particuliers dans lesquels j'entrerais en parlant du caractère, de la marche, des signes, & des effets de ces maladies, pourrout suffire pour former plusieurs

tableaux, relatifs aux différentes nuances qu'elles peuvent présenter.

A R T I C L E I I I.

Caractère de ces Maladies.

Les maladies vénériennes - chroniques ne présentent pas toujours le même caractère ; il peut y avoir autant de nuances, que d'espèces & de degrés de dégénération & de complications, & que de variétés dans les tempéramens.

Le vice vénérien assoupi ou retenu dans le corps, peut y être de trois manières ; ou il n'a éprouvé aucune dégénération, ou il a dégénéré de son caractère primitif, ou il est compliqué avec d'autres vices.

I. Dans le premier cas, il conserve son premier caractère ; il est simplement assoupi, contenu, sans éprouver aucune altération ; lorsqu'il se développe dans la suite, ses effets sont les

mêmes , que ceux qu'il auroit produits dans les premiers momens de son invasion ou de sa repercussion dans l'intérieur de la machine ; ils sont seulement plus marqués , plus violens , presque toujours plus dangereux , parce que le virus assoupi ou masqué a exercé souvent une action lente , sourde & cachée sur les parties intérieures , avant que de faire son explosion. De là vient que les accidens sont toujours plus graves , & qu'ils résistent plus long-tems aux remèdes ; de là vient encore que les os sont le plus souvent attaqués ; une observation constante nous apprend en effet que le vice vénérien assoupi pendant long-tems agit principalement sur les substances osseuses.

L'observation confirme mon assertion. Parmi les différens cas que j'ai vus , je ne citerai que les deux premières des observations que je rapporterai à la fin de cet ouvrage ; la pre-

mière contient une preuve de l'action du virus sur les substances osseuses ; la seconde est remarquable sur-tout par l'apparition de symptômes non-équivoques après plus de quinze ans d'une sécurité assez bien fondée. Je pourrois m'appuyer encore sur le témoignage de plusieurs observateurs ; je me bornerai cependant à deux observations rapportées par *Samuel Duclos*, & par *Turner* ; la première concerne un jeune homme, qui fut guéri en apparence d'un bubon Vénérien, jouit d'une bonne santé, se maria, eut un enfant très-sain, & chez lequel le virus se développa quelques tems après, se porta sur l'os de la jambe, & y produisit une exostose & une carie (a) ; la seconde est celle d'un ancien militaire, qui, sans avoir jamais éprouvé aucun accident qui pût lui faire croire qu'il avoit contracté une Maladie Véné-

(a) *Duclos*, *ibid.*]

rienne , fut sujet , après dix ans de mariage , à des maux de gorge fréquens , qui se terminèrent par un ulcère à une glande amygdale & une carie très-considérable aux os du palais ; sa maladie céda aux fumigations avec le cinnabre , qui produisirent une salivation abondante. (a)

On voit encore tous les jours , longtemps après la disparition des symptômes , soit spontanée , soit par l'effet des répercussifs , soit même à la suite d'un traitement méthodique , les symptômes se reproduire sous la même forme , ou sous une autre forme analogue non équivoque , souvent dans les mêmes parties , & toujours avec des accidens de la même nature , mais ordinairement plus graves & plus difficiles à détruire.

Ce n'est point cependant une règle

(a) *Turner*, *ibid.*

générale. Quelquefois le virus, après avoir été assoupi pendant quelque tems, se développe sans avoir perdu son caractère primitif, ne produit cependant aucun des symptômes évidens des Maladies Vénériennes, mais se dépose dans quelque partie; les maux qui sont l'effet de cette métastase, sont plus ou moins graves, relativement au degré d'importance des parties qui en deviennent le siège.

II. Dans le second cas, le vice vénérien a dégénéré, a perdu son caractère primitif, a cessé d'être proprement vérolique; il subsiste sous une forme qu'on ne sauroit déterminer, qui ne tient d'aucune de celles qui caractérisent les différens virus ou vices particuliers connus; il réside principalement dans la lymphe; il porte le plus souvent son action sur le système glanduleux ou sur le genre nerveux; il a ordinairement une marche lente, sourde, cachée, insidieuse, diffi-

cile à connoître , plus difficile encore à juger ; il donne lieu à un grand nombre de maladies , relativement aux parties sur lesquelles il se dépose , ou au genre d'action qu'il exerce sur nos humeurs ; il ne produit souvent des effets évidens , qu'après avoir miné pendant long-tems la constitution de la machine , & préparé sourdement sa destruction ; & ces effets , quoique évidens , sont toujours trompeurs , puisqu'ils ne présentent aucun caractère propre à constater le principe qui les produit.

De là dérivent tant de maladies chroniques , dont on méconnoit le caractère & le principe , & qui résistent aux remedes de l'Art , telles que celles dont j'ai déjà fait l'énumération ; mais les empatemens , les engorgemens , les obstructions des viscères , les dartres & autres maladies de la peau , & sur-tout les affections spasmodiques ou maladies nerveuses

nerveuses en font les effets les plus ordinaires.

C'est ici sur-tout le cas où se trouve un grand nombre d'enfans, qui portent en naissant une lympe altérée ou dépravée, un principe de maladie, qu'ils ont reçu de leurs peres, chez lesquels il a été originairement vérolique, & qui se présente chez eux sous la forme de gales rebelles, de rachitis, d'écrouelles, de carreau, &c.

III. Dans le troisieme cas, le virus vénérien, soit dégénéré, soit non dégénéré, se mêle avec un autre vice existant dans le corps. Ou ce vice est déjà développé, & alors le vice vénérien lui donne un nouveau degré d'activité; ou il est encore masqué, caché, enveloppé dans la masse des fluides, & alors le vice vénérien suffit souvent pour le développer & le mettre en action. Il arrive encore très-souvent que les remèdes mercuriels qu'on emploie pour combattre le premier, développe le dernier, &

occasionne ainsi le mélange & la combinaison de l'un avec l'autre.

On doit rapporter ici les vices scorbutique , rachitique , scrophuleux , cancéreux , dartreux ; laiteux , rhumatismal , goutteux &c , qui s'allient , se combinent , se confondent avec le vice vénérien.

Cette combinaison de ces différens vices dénature le plus souvent le caractère primitif & essentiel des uns & des autres ; il résulte de leur mélange , un assemblage informe , indéfinissable , j'ose dire , vraiment *monstrueux* , & , pour me servir des expressions de M. *Vigarous* , « produisant des accidens , » qu'on peut regarder avec raison « comme des monstres , parce que » participant par leur essence de l'un » & de l'autre virus , ils n'appartiennent absolument ni à l'un ni à l'autre. (a) »

(a) *Vigarous*, *ibid.* p. 9.

Il y a cependant toujours un de ces vices qui prédomine ; c'est vraisemblablement celui qui a le plus d'énergie , & rarement est-ce le vice vénérien. Cela paroît dépendre de ce que les autres vices sont innés dans les individus qui les portent , ou au moins existent dans leurs corps avant l'introduction du vice vénérien , qu'ils ont eu le temps d'infecter la masse des fluides , qu'ils ont déjà commencé ou au moins préparé leur action sur les solides , ou bien , s'ils sont développés , soit par le vice vénérien , soit par les mercurels , de ce que leur développement se fait avec violence , que leur explosion est prompte & subite , & que leur action en devient beaucoup plus vive ; le vice vénérien au contraire se trouve affoibli ou par les remèdes précédens ou par la dégénérescence , pénétrer dans la masse des humeurs sans l'avoir encore infectée , agit avec plus de lenteur , est en moindre quantité ,

& fléchit par conséquent , pour ainfi-dire , sous l'action vive & multipliée des autres vices déjà existans; aussi voions-nous presque toujours que les maladies résultantes d'une pareille complication retiennent les caractères principaux des vices primitifs avec lesquels le vice vénérien vient de se combiner.

La variété des tempéramens & des constitutions , produit encore des variétés dans le caractère de ces maladies; les reflexions suivantes démontrent cette vérité.

A R T I C L E I V.

Marche de ces Maladies.

La marche des Maladies Vénériennes-Chroniques n'est point la même chez tous les individus ; la vigueur ou la foiblesse des organes des différens sujets y apportent plusieurs variétés.

Dans les sujets vigoureux , les organes sont plus forts , ont encore tout

leur ressort , toute leur élasticité ; ils sont plus sensibles , plus susceptibles de recevoir les impressions , d'obéir à leur action , d'être excités , d'être mis en jeu ; ils répondent avec plus d'effort aux vues de la nature ; ils agissent avec plus d'énergie sur la matiere morbifique dont ils doivent opérer la séparation , l'atténuation , & l'excrétion ; leur action est plus facile , plus prompte , plus efficace ; aussi voions-nous ordinairement que leurs maladies se développent plus promptement , qu'elles sont plus vives , plus aiguës , plus violentes , qu'elles parcourent leurs périodes avec plus de rapidité , qu'elles tiennent davantage du caractère inflammatoire & de l'état d'éréthisme & d'irritation.

Le contraire arrive dans les sujets foibles & délicats par leur propre constitution , ou affoiblis par l'âge , les maladies , le travail , les excès ; leurs organes affoiblis ou délicats , sont moins

fenfibles , moins excitables , moins fufceptibles de répondre aux impreffions qu'ils reçoivent ; ils agiffent mollement , foiblement , avec lenteur ; ils n'opèrent qu'avec peine & dans un tems plus long , la fubaction & l'excrétion de la matiere morbifique ; auffi ceux-ci font ils bien plus fujets aux maladies d'inertie , de langueur , d'empâtement , en un mot aux maladies chroniques ; leurs maladies aiguës préfentent même des nuances qui tiennent à un état d'inertie , de foibleffe & de relâchement.

En général , les hommes , naturellement plus forts , plus robuftes , plus exercés , peuvent être mis dans la première claffe ; tandis que les femmes , plus foibles , plus livrées à une vie molle , douce & fédentaire , rempliffent la dernière : on peut même rapporter à celle-ci une multiplicité d'individus mâles & femelles , blasés par les plaifirs , ufés par l'abus de leurs

forces & de leur constitution, rongés par des inquiétudes qui sont la suite de l'ambition qui les domine, succombant sous le poids de l'agitation, de la cupidité, de l'intrigue, & des passions, tels qu'on en trouve beaucoup dans les Cours, & dans les grandes villes.

Ces différences influent beaucoup sur la marche & le développement des maladies Vénériennes-Chroniques.

Chez les premiers, elles se montrent avec plus de promptitude & d'énergie : chez les derniers, elles sont plus long-tems à se développer, & leur explosion est beaucoup moins vive ; chez les premiers, la nature mise en jeu par l'introduction du vice vénérien, excite tout de suite un mouvement violent & précipité dans les organes ; qui opère l'expulsion de la matière morbifique ; de là dérivent les symptômes inflammatoires, qui paroissent au dehors peu de jours après, & an-

noncent l'existence de la maladie : chez les derniers , la nature foible , ou affoiblie , souvent impuissante , n'agit qu'avec mollesse ; ses efforts sont insuffisans ; elle ne pousse la matiere morbifique au dehors qu'avec beaucoup de lenteur ; les symptômes ne se montrent extérieurement qu'après un tems beaucoup plus long ; ils sont moins pressans , moins violens , moins allarmans ; il en résulte plusieurs inconvéniens ; 1°. ils n'opèrent qu'une dépuration lente & imparfaite ; 2°. une partie du virus a le tems de passer dans la masse du sang , & d'infecter la lymphe ; 3°. les symptômes moins violens cèdent plus aisément , disparoissent même souvent sans le secours d'aucun remède ; leur légereté & leur disparition facile inspirent une sécurité qui devient dangereuse par la négligence qu'on met à prévenir les suites d'une nouvelle introduction du virus dans la masse du sang.

Il résulte de là que les maladies vénériennes aiguës , inflammatoires , sont plus fréquentes chez les premiers , qu'elles sont plus souvent chroniques chez les derniers , que celles-ci même se développent & agissent plutôt & plus fortement chez les premiers , & que leur marche est plus lente , plus sourde , moins allarmante , & en cela plus insidieuse chez les derniers.

C'est de là vraisemblablement que dérive la diminution frappante que nous observons tous les jours dans le degré d'activité des maladies vénériennes ; le tableau de leurs accidens dans le premier siècle de leur apparition , est terrible ; les siècles suivans en ont insensiblement diminué l'horreur , & celui où nous vivons nous fait appercevoir une diminution encore plus considérable ; la raison en paroît évidente ; les hommes étoient plus forts & plus robustes , il y a trois cents ans , & depuis cette époque , leur vigueur

a diminué d'une manière qui a été sensible & qui le devient encore plus tous les jours; les fastes de l'histoire, & les observations des Physiciens & des Médecins, ne laissent aucun doute sur la dégradation successive & graduée de l'espèce humaine. L'application des principes précédens donnera l'explication du phénomène que présente la diminution successive de l'énergie de ces maladies.

Je dois ajouter ici une réflexion intéressante; la production des Maladies Vénériennes-Chroniques est plus facile, plus fréquente, & leur marche plus lente, plus sourde, plus insidieuse chez les femmes, que chez les hommes : l'évacuation périodique qu'elles éprouvent tous les mois, diminue la masse & affoiblit l'action du vice vénérien; l'écoulement qui est habituel chez le plus grand nombre, & qu'on connoît sous nom de fleurs blanches, produit encore le même effet;

le virus ainsi affoibli , adouci , & en moindre quantité , a moins d'énergie , agit plus foiblement , provoque beaucoup moins l'action des organes propre à procurer son expulsion ; il s'insinue plus aisément dans les vaisseaux , infecte la masse des humeurs , se dépose dans les glandes , attaque enfin le genre nerveux. Ces mêmes fleurs blanches , dont je viens de parler , augmentent le danger dans un autre sens ; une femme peu instruite , sans méfiance , ou qui , emportée par la fougue des passions , cherche à se faire illusion & à s'aveugler sur son propre état , les confondra souvent avec un écoulement gonorrhéïque ; elle confondra de même , les chaleurs , les cuissens qui précèdent ou accompagnent ce dernier , ou qui annoncent souvent quelque autre symptôme vénérien , avec des accidens pareils qui sont quelquefois l'effet des fleurs blanches âcres ou abondantes ; elle ignorera son état , elle

fera dans une sécurité, qui deviendra d'autant plus dangereuse, qu'elle ne connoîtra point le principe des maladies fâcheuses qui lui surviendront dans la suite. Aussi voions-nous que les femmes sont plus sujettes aux Maladies Vénériennes-Chroniques, & que leur traitement est beaucoup plus difficile; plusieurs Praticiens l'ont observé; M. *Schwediaver* sur-tout l'a dit d'une manière bien positive (a). Le témoignage de *Sydenham* vient encore à l'appui de mon assertion; il assure que les femmes peuvent porter un vice vénérien caché avec les apparences de la bonne santé, le virus étant souvent délaïé & adouci par leurs évacuations menstruelles (b).

J'ajoute une nouvelle observation, qui n'est pas moins importante; les

(a) *Schwediaver*, *ibid.* p. 302.

(b) *Sydenham*, *ibid.* p. 413.

apparences d'une bonne santé en imposent quelquefois & inspirent une sécurité trompeuse. La marche des Maladies Vénériennes-Chroniques est lente, sourde, insensible; on peut en porter le germe pendant long-tems sans s'en appercevoir, en paroissant jouir même d'une santé florissante; on éprouve ensuite quelques incommodités, qui sont légères, peu importantes, d'une courte durée, qui reviennent cependant de tems-en-tems, quelquefois à des époques éloignées; on n'y fait aucune attention; on ne s'en occupe, que lorsque le vice vénérien, après avoir miné sourdement, fait son explosion; & les rend plus graves, plus suivies, plus longues, plus allarmantes.

Toutes les observations que je rapporterai à la fin de cet ouvrage, présentent des faits qui confirment cette vérité; les deux observations de *Du-*
clos & de *Turner*, que j'ai déjà citées, en contiennent de nouvelles preuves;

on peut s'en convaincre encore par le témoignage & les observations de tous les Praticiens que j'ai indiqués ci-devant, page 4, 5, 6, 7, 8 & 9; je ne citerai ici particulièrement que *Baglivi*, dont l'affertion est bien positive; après avoir établi que le vice vénérien, retenu dans le corps, infecte la lymphe & le suc nutritif & attaque les nerfs & les glandes, il ajoute : « il n'est pas sur-
 » prenant que de tels malades pa-
 » roissent vigoureux, bien portans,
 » qu'ils aient une face vermeille,
 » qu'ils ne paroissent attaqués d'au-
 » cun vice intérieur, qu'ils se croient
 » au contraire libres de toutes mala-
 » dies; mais c'est à tort & sans fon-
 » dement; ils portent le principe du
 » mal, & le portent dans la lym-
 » phe (a).

Enfin de tels malades portent sou-

(a) *Baglivi*, ibid. p. 96.

vent le principe de la contagion & ne le communiquent point; nouveau motif de sécurité ; les exemples en sont fréquens ; les observations de *Duclos* & de *Turner*, que j'ai déjà citées, & les deux premières des observations que je rapporterai à la fin de cet ouvrage, en fournissent une preuve convaincante ; on peut y joindre l'observation rapportée par *Trincavella*, de la femme d'un Avocat de Padoue, dont le mari étoit infecté d'un vice vénérien, & qui accoucha d'un enfant couvert de pustules & d'ulcères, sans en avoir jamais éprouvé elle-même aucun symptôme (a).

ARTICLE V.

Causes de ces Maladies.

La cause des Maladies - Vénériennes

(a) *Trincavella*, *De rat. cur. part. corp.*)
affect. liv. II. ch. 17.

Chroniques, n'est point équivoque ; un vice vénérien introduit dans le corps , combiné , enveloppé avec nos humeurs , mêlé sur-tout avec la lymphe , dont l'action est cachée , sourde , inconnue , est le seul vice qui peut les produire.

Ce vice est ou héréditaire , ou acquis : on tient le premier des parens , dont la masse du sang est infectée de la même maladie ; on acquiert le dernier par l'application immédiate du virus sur quelque partie du corps , disposée à le laisser pénétrer dans les vaisseaux absorbans.

C'est ainsi qu'on a vu quelquefois le virus s'introduire par la bouche à la suite de baisers lascifs , ou pour avoir bu dans le même verre qui venoit de servir à une personne infectée.

C'est ainsi qu'on a vu des chirurgiens , des Sages-Femmes , des gardes-malades , atteints de ces maladies ,

pour avoir touché les plaies ou le pus des personnes infectées, dans un tems ou une coupure de leurs doigts, de leurs mains, pouvoit faciliter l'introduction du virus.

C'est ainsi qu'on a vu des personnes en être aussi attaquées pour avoir seulement couché avec des personnes infectées, sur-tout si elles ont éprouvé dans ce moment des sueurs, & si elles se sont touchées de près.

C'est ainsi qu'on voit tous les jours une nourrice & un nourrisson se communiquer mutuellement la Maladie Vénérienne, dont l'un des deux est infecté.

C'est ainsi que la seule application d'une chose qui a servi à des personnes atteintes des symptômes extérieurs de cette maladie, l'a communiquée à celles qui s'en sont servies; j'ai vu une éponge produire cet effet sur une jeune de-

moiselle pour s'en être servie une seule fois (a).

C'est ainsi que , si nous devons nous en rapporter à des témoignages cités par M. *Sanchès* (b), on peut contracter ces mêmes maladies en respirant l'air infecté & renfermé de la chambre d'un malade qui a des ulcères vénériens (c).

Mais la copulation intime d'indivi-

(a) Voyez à la fin de l'ouvrage *l'Observ.* VIII.

(b) *Sanchès* , *ibid.* p. 153.

(c) J'ai fait une observation bien contraire à celle qui est citée par M. *Sanchès*. J'ai vu plusieurs fois, dans l'Hôpital-Militaire de Perpignan, des Soldats attaqués de maladies vénériennes, réunis au nombre de soixante & quatre-vingt, dans une salle qui n'est pas bien vaste ; un grand nombre portoit des ulcères ou des bubons en suppuration ; la salle étoit bien fermée & bien échauffée ; jamais, ni les chirurgiens qui les pansoient , ni les infirmiers qui les servoient , n'ont éprouvé le moindre signe d'infection ; ils y passoient cependant des tems assez longs.

des de deux sexes différens, dont l'un est infecté, est la maniere la plus propre à opérer la transmission & l'introduction du vice vénérien, & c'est la plus facile, la plus certaine, la plus commune, & celle qui produit des symptômes plus prompts & plus évidens.

Des signes extérieurs & évidens, manifestent ordinairement l'introduction du virus peu de jours après qu'elle a eu lieu, & leur existence ne laisse aucun doute sur la maladie qu'ils annoncent; cette regle n'est pas cependant générale, & beaucoup d'observations nous apprennent qu'on peut recevoir l'infection, sans qu'elle se montre au-dehors par des signes extérieurs. Cet objet est assez important pour mériter quelque discussion; la non-apparition de symptômes évidens peut entretenir une fâcheuse sécurité; je crois devoir la prévenir, & j'engage

mes lecteurs à parcourir les réflexions suivantes.

Les Médecins ne sont point d'accord sur la question intéressante que j'agite ici. Les uns croient que le virus vénérien peut s'introduire dans le corps sans produire au-dehors aucun signe évident de sa pénétration & de son existence ; les autres soutiennent , au contraire , que ce virus laisse toujours des signes de son introduction dans les parties même où elle a eu lieu.

Parmi ceux-ci , M. *Astruc* est celui dont le suffrage est le plus imposant ; ce Médecin allégué des conjectures pour soutenir son opinion ; il suppose que les malades peuvent déguiser la manière dont ils ont contracté la maladie , qu'ils peuvent se tromper eux-mêmes , & ne s'être pas aperçus des symptômes qui l'ont indiquée , qu'ils peuvent avoir pris ces derniers pour l'effet de quelqu'autre cause , comme de l'usage de la biere , d'une longue

équitation, d'un excès dans les jeux de l'amour (a) ; il fait encore une comparaison de l'action du virus vénérien avec celle des virus variolique, hydrophobique, scabieux & celui de la tarentule ; il conclut que ceux-ci produisant toujours des marques de leur pénétration dans les parties par lesquelles ils s'introduisent, il doit en être de même du vice vénérien (b).

Le raisonnement de M. Astruc ne contient qu'une simple supposition, dont il ne rapporte aucune preuve, & qui n'en est pas même susceptible ; la comparaison qu'il fait n'est pas mieux fondée. La peau est le siège de la petite vérole & de la gale ; il n'est pas surprenant que ces deux maladies attaquent cette partie qui est la seule qui puisse

(a). Astruc, *De morbis venereis*. Paris, 1740. in-4°. 2 vol. liv. II. chap. 3. n°. 2. tom. 1. p. 131.

(b). *ibid.* p. 132.

être exposée au contact du virus, ou de l'humeur qui les produit; il n'en est point de même des maladies vénériennes, qui n'ont aucun siège fixe & déterminé, & dont les symptômes ne paroissent pas toujours dans les mêmes parties. On peut ajouter une autre réflexion; si la petite vérole est communiquée par l'inoculation, il se fait une plaie par où elle pénètre, par où la communication avec les vaisseaux ouverts devient plus certaine & plus intime; il n'est pas surprenant qu'elle s'y fixe plus particulièrement; ce qui ne peut être appliqué aux maladies vénériennes; si elle se communique au contraire par le contact, il n'est pas possible de déterminer la partie qui a reçu la contagion; on voit même tous les jours que cette maladie se développe sur plusieurs parties à la fois. La morsure d'un animal enragé produit une plaie par laquelle le virus s'insinue; il n'est pas étonnant qu'elle s'enflamme, puisqu'elle devien-

le foier de la maladie. Enfin la comparaison avec le venin de la tarentule tombe d'elle-même, par les découvertes & les observations modernes qui démontrent la non-existence de ce venin.

L'affertion de M. *Astruc* & de ceux qui ont suivi son opinion, est encore contraire à l'autorité des Praticiens, & à l'observation.

I. *A l'autorité des Praticiens.* Je pourrois en citer un grand nombre, qui instruits par une longue expérience, n'hésitent point à prononcer non-seulement la possibilité, mais même la réalité de la transmission des maladies vénériennes sans aucun signe évident ou extérieur; je me bornerai à quelques-uns.

I^o. *Ettmuller* assure que le vice vénérien peut s'introduire dans le corps & y rester caché pendant long-tems avant de se montrer au dehors (a).

(a) *Ettmuller*, ibid. p. 115.

2°. *Sydenham* décide que les femmes peuvent présenter tous les signes d'une bonne santé , quoiqu'elles portent un vice vénérien dans leurs corps (a).

3°. *Blegny* présente ce virus comme s'insinuant quelquefois tout d'un coup assez avant pour faire la vérole , sans laisser au dehors aucune marque de sa pénétration (b).

4°. *Ucay* affirme que le venin peut rester dans la masse du sang pendant plusieurs années , sans donner aucune incommodité sensible , & sans qu'il soit possible de le remarquer. (c).

5°. *M. Van-Swieten* croit que le vice vénérien peut s'introduire dans le corps sans aucune lésion sensible des parties par lesquelles il a pénétré. (d).

(a) *Sydenham* , *ibid.* p. 413.

(b) *Blegny* , *ibid.* p. 134.

(c) *Ucay* , *ibid.* p. 146.

(d) *Swieten* , *ibid.* p. 352, 353 & 354

6°. Je citerai enfin *Baglivi*, dont les paroles sont remarquables « Si vous avez
 » cohabité , dit-il , avec une femme
 » infectée de la maladie vénérienne ,
 » quoique vous n'aiez éprouvé ensuite
 » ni bubons , ni gonorrhée , ni autres
 » symptômes semblables , ne croiez
 » point cependant que vous n'aiez
 » point contracté cette maladie ». Il
 en donne ensuite les raisons , qui paroissent assez vraisemblables. (a).

II. *A l'Observation.* Les observations sont encore assez multipliées ; je n'en citerai qu'un petit nombre.

1°. *Fracastor* a vu le vice vénérien ne se développer que deux , trois , & quatre mois après son introduction dans le corps (b) , & *Tomitanus* a fait la même observation. (c).

(a) *Baglivi* , ibid. p. 98.

(b) *Fracastor* , ibid. p. 199.

(c) *Tomitanus* , ibid. p. 1051 & 1052.

2°. *Turner* rapporte celle d'un Militaire qui a reçu & porté le vice vénérien pendant plus de dix ans sans qu'il se soit annoncé par aucun signe extérieur (a), & *M. Van-Swieten* assure avoir vu quelques cas pareils. (b).

3°. *Massa* a vu plusieurs fois cette maladie exister chez des personnes qui n'avoient éprouvé aucun symptôme aux parties génitales, & *M. Petit* a fait plusieurs fois la même observation (c).

4°. *M. Sanchès* affirme avoir vu plusieurs malades infectés du poison vénérien, sans la moindre inflammation, plaie ou signe visible dans les parties par lesquelles il avoit été contracté. (d).

(a) *Turner*, *ibid.* Hist. XVI, p. 297 & suiv.

(b) *Swieten*, *ibid.* p. 353.

(c) *Petit*, *Tr. des malad. des Os.* tom. II. sect. 3. ch. 17.

(d) *Sanchès*, *ibid.* p. 155.

5°. J'ai fait quelquefois la même observation ; j'ai vu entr'autres une dame porter le virus pendant plus de quinze ans sans avoir jamais éprouvé aucun accident ou symptôme visible (a). J'ai vu aussi un homme communiquer cette maladie à deux femmes différentes , sans avoir éprouvé aucun des signes extérieurs qui pouvoient lui inspirer des craintes pour lui-même.

6°. Enfin , *Boerhaave* a vu plusieurs fois cette maladie exister dans l'intérieur, sans avoir jamais été annoncée par aucun signe extérieur (b) ; il blame les Médecins, qui , parce qu'un malade n'a jamais éprouvé aucun signe extérieur , prononcent hardiment qu'il est exempt de cette maladie (c) ; il assure encore

(a) *Obs.* II. à la fin de cet ouvrage.

(b) *Boerhaave*, *De lue venerea*, Leide ; 1751. in-8°. p. 53, 54, 55 & 56.

(c) *ibid.* p. 54.

avoir connu plusieurs hommes, qui, avec l'apparence de la meilleure santé, & sans avoir jamais éprouvé aucun symptôme extérieur, avoient communiqué la maladie vénérienne à leurs épouses (a).

D'après ces réflexions & ces observations, il paroît qu'on ne doit point hésiter à conclure que le virus vénérien peut pénétrer dans le corps sans produire aucuns signes extérieurs, & que la non-apparition de ceux-ci ne suffit point point pour prouver sa non-existence.

La disparition des symptômes vénériens, soit spontanée & sans le secours d'aucun remède, soit après un traitement, même très-méthodique, est encore souvent la cause des maladies vénériennes-chroniques.

Les symptômes disparaissent souvent

(a) *ibid.* p. 316.

après un usage méthodique des remèdes le mieux administrés ; mais leur disparition n'est pas toujours une preuve de guérison ; souvent le virus n'est qu'adouci, diminué, bridé, contenu, & est retenu dans la masse du sang ; les observations qui le prouvent, sont très-communes, & il n'est presque point de Praticien qui ne s'en soit convaincu par sa propre expérience ; aussi voyons nous souvent les mêmes symptômes reparôître quelque tems après le traitement, ou se reproduire sous des formes nouvelles, ou bien enfin infecter la lympe, dégénérer de son caractère primitif, occasionner des maladies dont on méconnoit le principe, & donner lieu enfin aux maladies vénériennes-Chroniques.

Si les traitemens bien administrés, sont souvent insuffisans pour détruire le vice vénérien, s'ils n'opèrent quelquefois que des cures palliatives, que doit-on attendre des traitemens légers, in-

complets , illusoires , qui sont si communs aujourd'hui ? on veut être guéri promptement , sans s'assujettir à des précautions trop gênantes , sans observer un régime convenable ; on ne veut interrompre ni les plaisirs , ni les affaires ; on s'expose à toutes les intempéries de l'atmosphère ; on trouve beaucoup de prétendus guérisseurs , faciles à se prêter aux goûts , aux desirs , aux caprices des malades , empressés à saisir tous les moyens qui peuvent satisfaire leur cupidité , toujours prêts à employer des méthodes illusoires , des remèdes aisés , mais infideles , insuffisans , souvent dangereux ; les symptômes disparoissent , on se croit guéri ; mais le principe n'est point détruit ; on porte le germe de l'infection , qui doit opérer insensiblement l'altération & enfin la destruction de la machine. Aussi les maladies vénériennes-chroniques sont-elles plus fréquentes qu'on ne le pense , & deviennent-elles plus communes tous les jours ;

on en doit la multiplication à la multiplicité de traitemens incomplets ou palliatifs auxquels on se livre , sans réfléchir aux suites fâcheuses qu'ils peuvent avoir.

Les symptômes vénériens disparoissent aussi quelquefois d'eux-mêmes sans le secours d'aucun remède , & souvent par le seul usage des remèdes préparatoires ; cette disparition est une nouvelle cause d'infection ; on se croit guéri ; on néglige les remèdes nécessaires ; le virus passe dans la masse du sang , s'y combine , s'y enveloppe , l'infecte , dégénère , & produit enfin des maladies vénériennes-chroniques.

M. *Louis* a tracé un tableau intéressant , qui confirme cette vérité. Je me permets de copier ses propres expressions : » La disparition des symptômes » véroliques n'est pas un signe certain » de guérison.... Tout le monde fait » avec quelle promptitude les accidens

» les plus graves cèdent quelquefois
» aux remedes mêmes qui n'ont aucune
» prise sur la cause. Les remedes géné-
» raux, les bains, & autres secours pré-
» paratoires ont souvent effacé sans ré-
» cidive les pustules les plus caractéri-
» sées & différens autres symptômes
» cutanés; ils ont même suffi à dissiper
» les douleurs les plus vives. Non-seu-
» lement cette disparition ne prouve
» pas la guérison, mais souvent elle
» est une cause de plus grande infection
» par la répercussion du virus. On l'é-
» prouve dans les gonorrhées virulentes,
» traitées indistinctement par des injec-
» tions prématurées; on le voit aussi
» dans l'exsiccation inconsidérée des
» aphthes & petits ulcères chancreux,
» qu'on touche avec la pierre de vi-
» triol, & autres remedes de sembla-
» bles vertus.... De là vient le crédit
» de tant de remedes qu'on croit spé-
» cifiques contre la vérole, parce qu'on
» a détruit par leur moyen sans réci-

» dive des symptômes véroliques (a) ».

Les exemples de pareils événemens ne sont pas rares ; j'en rapporte quelques-uns dans les observations que je placerai à la fin de cet ouvrage ; on peut consulter les *Observ.* III. V. VII & VIII.

Les femmes y sont plus exposées que les hommes ; il leur est moins aisé d'appercevoir & de distinguer les symptômes qui annoncent l'infection , & elles emploient journellement des moïens propres à opérer leur disparition & la répercussion du virus , tels que sont par exemple les lotions fréquentes , froides , astringentes , répercussives ; j'en ai déjà donné les raisons ci-devant page 31 , 34 & 35.

ARTICLE VI.

Siège de ces Maladies.

La lymphe est infectée dans les Glandes

(a) *Louis* , *ibid.* p. 16.

ladies vénériennes-chroniques ; on ne sauroit le révoquer en doute , si on fait attention aux effets qu'elles produisent , aux maux qu'elles causent , aux symptômes qui les accompagnent. Cette humeur est donc le siège principal de ces maladies. Il n'est pas aussi aisé de prononcer sur la manière dont le vice vénérien agit sur elle. Si nous admettons l'hypothèse d'un très-grand nombre de Médecins qui ont regardé ce virus comme acide , si nous en jugeons par les effets , nous serons fondés à conclure que la lymphe en contracte un épaisissement plus ou moins considérable , qui donne lieu aux engorgemens , aux empatemens , & aux autres accidens , qui accompagnent ces maladies.

La réunion des mêmes effets doit nous faire croire que la lymphe ainsi viciée porte son action sur le système glanduleux , ou sur le genre nerveux , & quelquefois sur l'un & l'autre à la fois ; dans le premier cas , il en résulte

des engorgemens, dont les suites varient selon les circonstances & les individus ; dans le second cas, des spasmes qui se présentent sous différentes formes, & dont les suites peuvent devenir très-fâcheuses ; dans le troisième, les uns & les autres. Si nous considérons cependant les effets les plus ordinaires de ces maladies, les signes qui les annoncent, les symptômes qui les accompagnent, les maux qu'elles produisent, nous y trouverons le plus souvent une vraie affection nerveuse, les signes, les accidens & les suites du spasme, un vice du *sensorium commune*, cette partie altérée ou affoiblie. Le tableau que je vais tracer des signes & des effets de ces maladies en fournira la preuve. Nous devons conclure par conséquent que le virus vénérien agit plus fréquemment sur le genre nerveux, que sur le système glanduleux, & que ce dernier n'est affecté souvent que secondairement, & par

une suite de l'affection du premier.

Il ne faut point conclure cependant que tout le système glanduleux ou tout le genre nerveux soit toujours affecté; l'action du virus est bornée souvent à quelques parties, & l'observation nous apprend qu'elle se porte toujours sur les parties naturellement les plus foibles, ou affoiblies par des circonstances particulieres.

C'est ainsi que nous voions 1°. que, chez les personnes sujettes à des maladies de la peau, le virus se porte principalement vers cette partie, & donne un nouveau degré d'intensité à ces maladies. 2°. Que chez celles qui sont sujettes aux maux de nerfs, il affecte beaucoup plus le genre nerveux, & rend ces maladies plus graves, plus opiniâtres, leur retour plus fréquent, leur durée plus longue. 3°. Que chez les hémophthoïques, chez les personnes qui ont la poitrine foible & délicate, ou sujettes à des toux, à

des rhumes fréquens , il agit sur les poumons , & détermine la phthisie pulmonaire , &c.

De là vient encore , suivant l'observation importante de *Baglivi* (a) , que le siege secondaire de ces maladies varie , eu égard à la profession , au métier , à la condition & au genre de vie des différens individus. Le virus se porte principalement : 1°. chez les gens de lettres , vers la tête , fatiguée & souvent affoiblie par le travail du cabinet. 2°. Chez les Chantres , les Orateurs , les Comédiens , vers les poumons , affoiblis par un exercice long & forcé. 3°. Chez les femmes & les autres personnes qui menent une vie sédentaire , vers les glandes du mésentère , déjà relâchées , affoiblies , ou empâtées par la viscosité des suc qui les parcourent ; 4°, chez les per-

(a) *Baglivi*, ibid. p. 97.

sonnes livrées à la bonne chère, vers les premières voies, d'où il résulte des digestions lentes, difficiles & imparfaites, des suc mal élaborés, épais & visqueux, des obstructions des viscères. Ces exemples suffisent, sans qu'il soit nécessaire de parcourir les différents états; il est aisé de leur faire l'application des principes précédens.

A R T I C L E V I I .

Effets de ces Maladies.

La lymphe viciée, épaissie, parcourt avec peine les vaisseaux des différentes parties, & sur-tout ceux qui sont affoiblis, qui ont perdu une partie de leur ressort, qui sont hors d'état de réagir convenablement sur elle pour favoriser & soutenir son cours. Elle les parcourt encore plus difficilement, gêne leur mouvement, s'y arrête enfin, les empâte, les engorge,

& donne lieu à une infinité de maux, qui varient eu égard aux parties qui en font le siège.

Si elle se porte vers la peau , elle produit *des démangeaisons , des tumeurs , des éréfipeles , des clous , des pustules , des ulcères , des dartres farineuses , écailleuses , suppurantes , rongeantes.*

Dans les gâines des tendons....*des ganglions.*

Dans les os.....*des concrétions tophacées , des exostoses , des hyperostoses , des caries , des douleurs ostéocopes.*

Dans les articulations.....*des douleurs analogues à celles de la goutte.*

Sur les yeux....*des ophtalmies.*

Sur les oreilles.....*des bourdonnements , des tintemens , des inflammations , des suppurations , la surdité.*

Sur le nez.....*l'ozène , l'enchiffrement.*

Sur la bouche & le gosier.....*des*

64 R E C H E R C H E S

aphtes , des inflammations , des ulcères.

Sur le tissu des muscles.....*des douleurs analogues aux douleurs rhumatismales.*

Dans la tête.....*l'épilepsie , l'apoplexie , la paralysie.*

Sur les poumons.....*la toux , l'asthme , les crachemens de sang , la phthisie pulmonaire , l'enrouement ; ce dernier symptôme est assez fréquent ; la voix devient rauque ; l'enrouement se soutient à un degré plus ou moins fort , est enfin habituel ; on n'en éprouve aucune incommodité ; on le néglige ; on ne croit point qu'il soit l'effet d'un vice vénérien caché.*

Sur le sein, sur-tout chez les femmes..
des tumeurs , des engorgemens glanduleux , des squirres , des cancers.

Sur les organes digestifs.....*des maux & des foiblesses d'estomac , des indigestions ou des digestions difficiles , longues , laborieuses , imparfaites , des sucs nutritifs viciés , mal élaborés , in-*

suffisans , par conséquent une nutrition incomplete , l'appauvrissement , le marasme , la fièvre hectique , la consommation.

Sur les viscères du bas-ventre
des obstructions , des hydropisies.

Sur la matrice *la suppression des regles , l'irregularité de leur cours , la sterilité , ou bien des grossesses orageuses , des couches difficiles , laborieuses , souvent dangereuses , des inflammations , des ulcères , des cancers.*

Sur la vessie *la dysurie , la strangurie , l'incontinence d'urine , les inflammations , les ulcères.*

Sur les nerfs *des toux & des fièvres nerveuses , des spasmes , des tremblemens des membres , des maladies nerveuses , hysteriques ou hypocondriques.*

Le détail seroit infini, si je suivois toutes les parties sur lesquelles le vice vénérien peut se déposer, ou qui peuvent en être lésées, & les maux qui

en font la suite. Il n'est presque point de maladie qu'il ne puisse produire , le tableau en seroit effrayant; mais les plus fréquentes sont 1°. les maladies nerveuses , annoncées par des toux , des petites fièvres erratiques , des spasmes , des crispations, des tremblemens , des frémissemens, des lassitudes, des mouvemens convulsifs , & tous les symptômes de l'hystéricisme & de l'hypocondriacisme. 2°. Des empâtemens , des engorgemens, des obstructions des viscères , & leurs suites ordinaires , la cachexie , l'hydropisie de poitrine , l'ascite , l'atrophie ; 3°. la tuméfaction , l'engorgement , la dureté , souvent squirreuse , quelquefois dégénérant en cancer , des glandes du col , des aînes , des mammelles , du mésentère & des autres parties. 4°. Les douleurs des membres , nocturnes , osteocopes , goutteuses , sciaticques , rhumatismales , soit vagues , soit fixes. 5°. Des affections des poumons , &

sur-tout la phthisie pulmonaire. 6°. Les affections de la peau , démangeaisons , fluxions , érysipeles , pustules , dartres , la peau devient souvent dure , rude , âpre , sèche , farineuse , écailleuse ; quelquefois elle se gerce , principalement à la paume des mains , & à la plante des pieds ; quelquefois la tête & la barbe sont parsemées de gales , de croûtes qui entraînent la chute des poils & des cheveux.

Enfin , il est une partie sur laquelle le vice vénérien exerce souvent son action , & produit des suites fâcheuses ; c'est cette partie , qui est connue par les Médecins sous le nom de *sensorium commune* , & qu'on peut regarder comme l'origine des nerfs ; la langueur des fonctions animales & vitales en est la suite ordinaire ; l'abattement , la tristesse , quelques vertiges , la rougeur légère des yeux , quelques bruissements dans les oreilles , en sont les premiers effets ; ils sont

suivis quelquefois de mélancholie, d'insensibilité, d'apathie; celles-ci amènent dans quelques sujets les troubles de l'esprit, l'imbécilité, la démence. Je connois un homme de quarante-neuf ans, qui est tombé dans cet état par une cause pareille; M. *Sanchez*, dit avoir vu plusieurs personnes être tombées aussi, par la même cause, dans un dérangement total de l'esprit, dans la manie, la démence, & il rapporte deux autres observations pareilles, qu'on trouve dans le *recueil d'observations* de *Schenckius*, & dans les *nova acta Physico-medica*, tom. I. obs. 88. (a). C'est sans doute ce qui a fait regarder par *Forestus* le cerveau comme vicié quelquefois dans cette maladie, *maxima fit adustio in cerebro* (b). C'est en-

(a) *Sanchez*, ibid. p. 155.

(b) *Forestus*, ibid. liv. 32. obs. 1. In schol. p. 523.

core par la même raison, que ce Médecin (a) & *Almenar* (b), trouvant une analogie entre l'action cachée du virus vénérien & les maladies mélancholiques, n'ont point hésité à prononcer que les mélancholiques y sont plus disposés.

ARTICLE VIII.

Signes de ces Maladies.

Les Maladies Vénériennes - Chroniques ne s'annoncent pas toujours par les mêmes signes ; ils varient dans les différens cas , les différens individus , eu égard à la disposition du sujet , à la diversité de l'action du virus , à la variété des parties , sur lesquelles il se dépose , à la nature des autres vices ou virus avec lesquels il se mêle , se

(a) *ibid.* obs. 5. in schol. p. 532.

(b) *Almenar*, *De morb. gall.* Pavie, 1516, in-fol. *De morb. gall. signis*, chap. 3.

combine , se complique ; la diversité de ces signes fait autant de différences, qui sont très-multipliées par rapport à la multiplicité des formes sous lesquelles ces maladies se présentent ; mais ce ne sont point des signes caractéristiques ; ils peuvent indiquer aussi des maladies absolument indépendantes du vice vénérien ; ils n'annoncent l'existence de ce dernier , qu'autant qu'ils sont joints à des circonstances particulières qui aident à déterminer leur caractère, ou qu'ils sont précédés ou accompagnés des signes généraux dont je vais parler : je m'en occuperai dans le chapitre suivant.

Mais il est des signes généraux qui sont communs à la plupart des maladies Vénériennes - Chroniques , qui ne dépendent ni de l'action locale du virus , ni de la constitution particulière des sujets , ni de la complication de différens vices , qui peuvent être rapportés , au contraire , à presque tous

les cas, toutes les circonstances, toutes les espèces.

Ces signes généraux ont été peu aperçus, peu observés; les Praticiens ont négligé de les constater, de les apprécier, de les consigner dans leurs écrits; un très-petit nombre en a fait l'énumération, mais sans y attacher l'importance nécessaire, sans paroître les regarder comme des signes généraux ordinaires, & en les indiquant seulement comme des symptômes aperçus dans les cas qu'ils ont décrits; un plus petit nombre encore en a connu la valeur, les a appréciés, & en a fait la base de la doctrine qui doit diriger le Praticien.

L'observation seule peut cependant nous diriger; aussi, n'est-ce qu'en recueillant les détails qui nous ont été transmis par les observateurs & en y joignant le résultat de mes propres observations, que je suis parvenu à tracer un tableau, qui peut jeter quel-

ques lumieres sur une matiere encore peu connue.

Levinus Lemnius, *Bisset*, & *O-Connel*, qui sont entrés dans des détails assez satisfaisans sur les Maladies Vénériennes-Chroniques, ne se sont point occupés des signes généraux, qui peuvent les faire connoître; ils en ont indiqué quelques-uns, qu'ils ont confondus dans l'énumération des accidens multipliés qu'elles produisent, mais qui, par leur analogie avec ceux que nous retrouvons chez les autres observateurs, peuvent concourir à établir quelques principes certains.

M. *Van-Swieten*, qui a écrit après eux, & qui n'a connu ou au moins cité ni leurs écrits, ni ceux de quelques autres Praticiens sur lesquels je m'appuierai, a mis en question si on pouvoit reconnoître par des signes généraux, les Maladies Vénériennes cachées; mais il n'en a donné aucune solution.

M. *Sanchès*;

M. *Sanchez* est le premier & le seul qui s'en soit occupé. Les occasions fréquentes qu'il a eu de voir & de traiter ces maladies, lui ont donné lieu d'observer leur marche, & il en a saisi les différentes nuances avec la sagacité qui lui étoit ordinaire; il nous a transmis le résultat de ses observations dans le tableau qu'il a tracé des signes qui sont l'effet du vice vénérien passé & retenu dans le corps. Je copie les propres paroles.

« Le virus peu-à-peu gagnera
 » du terrain en suivant les membranes
 » & les enveloppes des nerfs, & se
 » montrera sous les symptômes des
 » maladies chroniques. Qu'arrive-t-il
 » alors? la tristesse s'empare de l'ame,
 » on est tourmenté de vertiges par
 » intervalles; on éprouve une dou-
 » leur sourde aux épaules, au col, &
 » sur les reins, un embarras dans la
 » gorge, une légère rougeur des
 » yeux.... on est attaqué de douleurs

» sourdes au sternum ou au côté droit,
 » de vents dans l'estomac, de borbo-
 » rygmes dans le colon; les gencives
 » deviennent d'un rouge pourpre; il
 » paroît sur le visage des petits bou-
 » tons, mais en petit nombre; quel-
 » quefois ils se jettent sur le front;
 » ces malades ont des douleurs de tête
 » fréquentes; ils deviennent tristes, lan-
 » guissans, paresseux....plusieurs ont les
 » ongles difformes, des douleurs d'es-
 » tomac après les repas: les femmes
 » ont des coliques plus vives, plus
 » tranchantes avant l'apparition de
 » leurs regles; il leur survient des
 » maladies dans les reins, dans les
 » ovaires; le teint devient jaune, plum-
 » bé, verdâtre; enfin, ces malades sont
 » tourmentés de mille maux différens,
 » qui les dégoûtent de la vie, & leur
 » en font desirer la fin (a).

Ce tableau est vrai, peut-être un

(a) *Sanchez*, *ibid.*, p. 181 & 182.

peu trop étendu , plusieurs de ces symptômes ne se rencontrant point chez tous les individus. Si on le compare avec les détails qui nous ont été transmis par quelques observateurs , on trouvera , quant aux symptômes les plus essentiels, une similitude si parfaite, qu'on ne pourra s'empêcher de l'adopter.

Les symptômes que *Bern. Tomitanus* a observés chez plusieurs personnes qui portoient un vice vénérien caché, sont à peu-près les mêmes ; tels sont *l'abattement, l'inertie pour le travail, la pesanteur des membres, des lassitudes spontanées, une lenteur dans les actions, une tendance presque continuelle au sommeil, l'amaigrissement, la perte des forces, le trouble de l'esprit, la tristesse, la méfiance, la crainte, le changement & la pâleur du visage, une noirceur sous les yeux, la chaleur des mains & de la plante des pieds (a).*

(a) *Tomitanus*, ibid. 1051 & 1052.

On retrouve les mêmes symptômes dans la description que *Thomas Jordanus* nous a laissée d'une maladie , qui attaqua un grand nombre de personnes à la fois , après leur avoir été communiquée par l'application & la scarification de ventouses , faites par un homme infecté , qui présente tous les caractères d'une maladie vénérienne , qui ne céda qu'aux remèdes regardés comme la spécifique de cette maladie , enfin qui ne se manifesta chez plusieurs malades que longtems après la communication ; il décrit ainsi les symptômes qui parurent après l'infection & avant le développement ; *les malades tomboient dans un abattement extraordinaire ; ils devenoient lourds , pesans , indolens , paresseux , nonchalans pour leurs travaux ordinaires ; leur esprit se troubloit , la tristesse étoit peinte sur leur visage , la pâleur avoit succédé à la couleur naturelle ; leurs yeux étoient hagards , & entourés d'un cercle noi-*

râtre , leur visage étoit refrogné & comme couvert d'un nuage (a).

Forestus , qui écrivoit à-peu-près dans le même tems , a observé les mêmes symptômes , & tient le même langage ; leur imagination , dit-il , les porte vers des objets tristes (b) ; ils deviennent sauvages & impatiens ; ils ne peuvent rien supporter , ils écoutent avec peine & sans attention ceux qui leur parlent (c) ; ils maigrissent ; la couleur de leur visage se change en paleur (d) ; ils deviennent paresseux & portés au sommeil (e).

Ce même Médecin observe encore

(a) *Jordanus*, *ibid.*

(b) *Forestus* , *ibid.* liv. 32. obs. 1. in schol. tom. 2. p. 522.

(c) *ibid.* p. 523.

(d) *ibid.* obs. 5. in schol. p. 531. col. 1.

(e) *ibid.* col. 2.

que les mélancholiques sont plus disposés aux Maladies Vénériennes-Chroniques, par rapport à l'analogie de ces maladies, *propter similitudinem* (a), & *Almenar* avoit fait déjà avant lui la même observation (b).

Nicolas Massa compte aussi la paresse, la nonchalance, l'inertie des malades, la pâleur du visage, la propension au sommeil, parmi les symptômes propres à faire connoître les maladies vénériennes dont on soupçonne l'existence (c).

L'observation de *Bisset* se rapproche beaucoup des précédentes ; les malades éprouvent selon lui *un peu d'insomnie le matin ; s'il y a un peu de sommeil, il n'est pas rafraîchissant, &*

(a) *ibid.* p. 532.

(b) *Almenar*, *ibid.* ch. 3.

(c) *Massa*, *De morb. gall.* Venise, 1563. in-4°. ch. 7.

pendant le reste de la matinée, ils sont pesans , inquiets , chagrins , portés à la colère , & sentent le besoin de dormir (a).

Les cas d'imbécillité, de manie , de démence, produits par le vice vénérien caché, que j'ai déjà rapportés , peuvent trouver ici leur application.

Si on rapproche mes propres observations de celles des Praticiens que je viens de citer, on y retrouvera les mêmes symptômes, *des lassitudes, l'abattement, la pesanteur des membres , la mélancholie , la tristesse , le dégoût de la société, l'inquiétude, l'apathie, l'indolence , l'inertie pour le travail & l'exercice , les yeux cernés , la tendance au sommeil , la pâleur du visage, des affections vraiment nerveuses (b).*

(a). Bisset , *ibid.*

(b). Voyez à la fin de cet ouvrage les *Observ.*
II. III. V. VI. VIII.

La réunion de ces différentes autorités , de tant d'observations faites dans les différens siècles , dans des lieux éloignés les uns des autres , par des Praticiens dont on ne sauroit suspecter le témoignage , ne laisse aucun doute sur les conséquences que nous devons en déduire ; elle nous fournit le tableau certain des signes généraux qui peuvent nous faire connoître l'existence d'un virus vénérien caché.

Ce tableau seroit cependant encore insuffisant. M. *Sanchez* a indiqué un symptôme , sur lequel il a glissé trop légèrement & qu'il a présenté d'une manière incomplète ; il a gardé encore le silence sur deux autres symptômes non moins importants.

Ce Médecin dit que les gencives deviennent d'un rouge pourpre ; il a raison ; mais cela ne suffit point. A mesure que l'action intérieure & cachée du virus augmente , les gencives se gonflent , se gorgent , deviennent fon-

gueuses, molles, d'un rouge pâle & blanchâtre ; quelquefois même, quoique rarement, elles présentent un cercle légèrement livide, qui paroît suivre le contour de la racine des dents. Outre les cas que je rapporterai à la fin de cet ouvrage (a), je l'ai observé très-souvent, & ce signe m'a aidé quelquefois à déterminer le caractère de la maladie, sur-tout lorsqu'il n'est joint à aucun des autres symptômes qui peuvent faire soupçonner l'existence d'un vice scorbutique ; ce symptôme a induit souvent les Praticiens en erreur, en leur faisant soupçonner une affection scorbutique, qui n'existoit point, & qui a éludé l'action des remèdes les mieux indiqués contre cette maladie.

Ces malades éprouvent encore très-fréquemment un symptôme, dont

(a) Voyez mes *Observ.* III. & VI.

M. *Sanchès* n'a point parlé, une chaleur brûlante à la paume des mains; *Tomitanus* l'avoit déjà observé, & je l'ai vu constamment chez presque tous les malades que j'ai eu occasion de traiter; j'en rapporte quelques cas particuliers (a).

Enfin, M. *Sanchès* garde le silence sur un autre symptôme, qui est encore assez fréquent. La plupart des malades qui portent un vice vénérien caché, surtout quelque tems après qu'il a commencé à agir intérieurement, ont la peau des bras & sur-tout des mains, sèche, rude; quelquefois âpre & comme raboteuse; je l'ai vu souvent (b); *Levinus Lemnius* & *Bisset*, l'avoient observé avant moi. Quelquefois la peau de la main paroît se taillader; quelquefois même elle se gerce; *Bisset* l'a observé;

(a) Voyez mes *Observ.* V. & VI.

(b) Voyez mes *Observ.* II. & VI.

je l'ai vu aussi (a). *Forestus*, convaincu par une longue expérience, a regardé ce signe comme si certain, qu'il lui a servi deux fois à prononcer sur le caractère vénérien de la maladie, qui n'étoit indiqué par aucun autre symptôme; l'événement a justifié son diagnostic; il a guéri les deux malades avec les mêmes remèdes qu'il emploioit dans les maladies vénériennes cachées (b). Aussi assure-t-il avec certitude que ce signe seul lui a servi souvent à connoître l'existence d'un vice vénérien caché (c).

D'après les détails précédens, il est aisé d'établir avec certitude les signes généraux qui peuvent nous conduire à prononcer sur le principe vénérien

(a) Voyez mon *Observ.* II.

(b) *Forestus*, *ibid.* obs. 4. in schol. p. 528. & obs. 26. in schol. p. 582.

(c) *Sæpè & ego ex solis fissuris manuum in scortis deprehendi morbum latere.* *ibid.* p. 528.

des différentes maladies, sous la forme desquelles il se cache ou se présente. La plupart de ces signes indiquent une affection nerveuse, & une lésion, même un affoiblissement du *sensorium commune*.

Le passage de la gaieté à la tristesse ou à l'ennui, du goût du plaisir & de la dissipation à l'insouciance pour les agrémens de la société & à l'amour de la solitude, de la légèreté du corps & des actions à la pesanteur des membres & à l'indolence, de l'activité à la paresse & à la nonchalance, de la tranquillité de l'ame à l'inquiétude, l'agitation & la crainte, du goût ou de l'aptitude pour l'occupation & le mouvement à l'inertie pour le travail & l'exercice, d'une humeur ou d'une habitude douce, facile, paisible, sociable, endurante, à un caractère difficile, désagréable, hargneux, acariâtre, impatient, colere, forme le premier degré de ces symptômes ; il

est joint presque toujours à des lassitudes spontanées, qui se font sentir principalement le matin, à l'abattement, qui n'est pas toujours continu, & à la pâleur du visage; les yeux se cernent insensiblement & deviennent souvent obscurs, ternes, & comme couverts d'un nuage, les gencives sont d'un rouge pourpre.

A mesure que le mal fait intérieurement des progrès, ces symptômes deviennent plus marqués, plus sensibles, les malades éprouvent une tendance au sommeil; ils tombent dans une apathie parfaite; leurs gencives se gorgent, se gonflent, deviennent fongueuses; un cercle livide, quelquefois noirâtre, paroît sous les yeux; le visage devient jaune, quelquefois plombé, quelquefois verdâtre.


Enfin, dans le dernier degré, le trouble de l'esprit se joint aux symptômes précédens, & les malades n'en sont à l'abri qu'autant que le virus fait

une explosion vers des parties distantes du cerveau, en se présentant sous la forme de maladies ou d'accidens qui n'ont aucun rapport avec cette partie.

Dans la plûpart des cas & des degrés que je viens de parcourir , surtout dans le second degré, les paumes des mains sont ordinairement brûlantes, & le plus souvent la peau de ces parties devient sèche , rude au toucher , quelquefois comme grainue , quelquefois comme raboteuse ; il y survient des gerçures , plus ou moins apparentes, plus ou moins profondes, lorsque le mal a fait beaucoup de progrès.

Il ne faut point conclure cependant que tous ces symptômes paroissent à la fois & avec la même intensité chez les différens individus ; ils présentent différentes nuances , eu égard au degré de la maladie , à la disposition du sujet , & à plusieurs autres circonstances ; ils peuvent ne pas se rencontrer dans le même tems , & l'ab-

sence de quelqu'un d'entr'eux , ne suffit point pour prononcer la non-existence du vice qu'ils doivent indiquer. En général , ils sont tous beaucoup moins marqués , beaucoup plus légers , moins nombreux , quelquefois même très-peu sensibles dans les cas où le virus fait une explosion & se porte vers quelques parties , où il produit des symptômes particuliers & absolument différens , sur-tout lorsque son action se dirige vers une partie extérieure.



C H A P I T R E I I.

DES MALADIES VÉNÉRIENNES
CHRONIQUES EN PARTICULIER.

LES maladies vénériennes - chroniques peuvent être rangées sous trois classes différentes, eu égard à l'état dans lequel se trouve le virus qui les produit. S'il n'est qu'assoupi, elles sont *masquées* ; s'il a perdu son caractère primitif, elles sont *dégénérées* : s'il est mêlé ou combiné avec un autre vice ou virus, elles sont *compliquées*. Celles qui dépendent d'un vice héréditaire, rentrent dans ces trois classes ; mais pour répandre plus de clarté sur cet objet, & pouvoir le traiter plus méthodiquement, je les considérerai en particulier, & j'en ferai une classe distincte.

ARTICLE PREMIER.

Maladies Vénériennes - Chroniques masquées.

Les maladies vénériennes - chroniques *masquées*, sont celles qui dépendent d'un vice vénérien introduit & retenu dans le corps sans avoir perdu son caractère primitif, c'est-à-dire, sans avoir cessé d'être vérolique.

Le virus est ou assoupi ou développé.

Dans le premier cas, il est enveloppé, confondu avec la masse du sang; il se trouve bridé, contenu; il ne peut agir particulièrement sur aucune partie; il ne produit aucun signe de son existence; il est très-difficile, pour ne pas dire impossible, à connoître, jusqu'à ce qu'il fasse une explosion & se développe au dehors, ou se jette & se fixe sur quelque partie intérieure; c'est-là le cas des personnes qui sont infectées

sans communiquer le germe de leur infection.

Dans le dernier cas, le virus est développé, exerce librement son action, mais peut agir de trois manières.

1°. Il peut rouler confusément mêlé avec nos humeurs, sans se déposer sur aucune partie intérieure, ni extérieure; la lymphe est cependant infectée, & communique son infection aux humeurs auxquelles elle donne naissance; c'est-là le cas des personnes qui portent un vice vénérien, & qui le communiquent, sans en éprouver elles-mêmes aucun signe évident & particulier.

2°. Il peut, en se développant, se porter & se déposer dans les parties extérieures qui ont été originairement infectées, ou par lesquelles la communication du virus a eu lieu, & y produire des symptômes évidens & non-équivoques; c'est le cas de l'apparition spontanée de symptômes évi-

demment vénériens aux parties naturelles qui survient quelquefois longtemps après leur disparition ou la communication de la contagion.

3°. Enfin, il peut, en se développant, se porter & se fixer sur quelques parties soit intérieures, soit extérieures, différentes des précédentes; en se déposant dans les premières, il produit des maladies particulières, qui varient, eu égard à la diversité des parties, & les malades ne communiquent ordinairement aucune infection; en se portant vers les dernières, ils y donnent naissance à des symptômes, qui ne présentent aucun caractère vénérien, & qu'on ne peut juger tels que par la réunion & l'approximation des diverses circonstances & des divers signes dont j'ai parlé dans le chapitre précédent; dans cet état, les malades ne communiquent leur infection aux personnes saines, que par le contact immédiat des parties devenues le siège

de la maladie ; encore faut-il ordinairement qu'il y ait un écoulement ou suintement d'une humeur qui puisse se charger de l'infection, & la transmettre, comme dans les cas d'ulcères, de dartres suppurantes, &c.

Les deux derniers cas se trouvent quelquefois réunis ; le virus est si abondant, si actif, ou si développé, & fait une explosion si considérable, qu'il se porte à la fois sur les parties naturelles, où il produit des symptômes évidemment vénériens, & sur d'autres parties internes ou externes, où il donne naissance à des maux dont le caractère paroît différent, quoique produits par le même principe.

Dans le premier cas, la présence du virus est très-difficile à connoître ; dans le second, elle est évidente ; dans le troisième, elle est incertaine, & on ne peut déterminer le caractère des symptômes, qu'en rapprochant les

autres signes & les circonstances particulières dont j'ai déjà parlé.

ARTICLE II.

Maladies Vénériennes - Chroniques dégénérées.

La classe des maladies chroniques vénériennes *dégénérées* comprend toutes les maladies chroniques , qui sont produites ou entretenues par un vice vénérien dégénéré , de quelque manière qu'il ait été introduit dans le corps.

Le vice vénérien est ici dégénéré , c'est-à-dire , il a perdu son caractère primitif ; il a cessé d'être vérolique ; introduit dans le corps , il s'est mêlé avec la masse des fluides ; sa combinaison avec nos différentes humeurs , l'action répétée des vaisseaux à laquelle il a été exposé , son atténuation , sa subaction , sa décomposition , qui en sont les suites nécessaires , ont altéré , changé , dénaturé sa constitution pri-

mitive ; il en résulte une humeur , un fluide , dont le caractère ne tient à aucun des caractères connus ; il est lui-même méconnoissable , indéfinissable , & s'est dérobé jusqu'ici , & se dérobera longtemps aux recherches les plus profondes & les plus exactes.

Ce vice , ainsi dégénéré , réside principalement dans la lymphe , & attaque le système glanduleux & surtout le genre nerveux. Il se porte indistinctement sur toutes les parties , s'y fixe , altère leur constitution , pervertit leurs mouvemens , & donne naissance à toutes ou presque toutes les maladies possibles ; j'en ai fait déjà l'énumération , & j'en ai décrit la marche dans le chapitre précédent. La principale action de ce vice se porte le plus souvent sur les nerfs , sur le *sensorium commune* , le vicie , l'altère , l'affoiblit , produit les maladies nerveuses , spasmodiques , les affections dépendantes du relâchement , de l'affaisse-

ment, de l'inertie des fibres, sur-tout de celles du cerveau. Je suis entré dans des détails assez étendus sur cet objet dans le chapitre précédent.

On porte ce vice, sans s'en douter, sans le communiquer; en cessant d'être vérolique, il a cessé d'être contagieux; les maux, les accidens, les symptômes qu'il produit, ne présentent aucun caractère vénérien, & ne retiennent que celui des maladies sous la forme desquelles ils se présentent.

Il faut ici un œil attentif, intelligent, exercé, pour connoître & déterminer le vrai caractère de ces maladies. Elles ne présentent que les symptômes ordinaires des affections pareilles qui dépendent d'autres causes; le concours, la réunion, l'examen attentif, & la juste appréciation des différentes circonstances, peuvent seuls donner quelques lumières & faciliter le diagnostic.

L'aveu du malade, la connoissance des différens états suspects où il peut

s'être trouvé , des moyens qu'il peut avoir employés , & des effets qui en ont résulté , l'inspection & l'examen des parties naturelles , qui retiennent quelquefois des vestiges des maladies antécédentes , soit guéries , soit éteintes ou amorties accidellement , ou spontanément , fournissent une grande ressource au médecin ; mais elle nous manque très-souvent ; les malades eux-mêmes sont quelquefois dans une ignorance parfaite ; malgré leur bonne volonté , leur desir de parvenir à la guérison , ils ne peuvent rendre un compte satisfaisant , propre à diriger le Praticien.

Les nuances particulieres des maladies peuvent alors nous donner quelques lumieres. Il ne faut point oublier que le systême glanduleux , & sur-tout le genre nerveux , sont principalement affectés par le vice vénérien dégénéré ; on doit examiner par conséquent si les maladies dont il est ici question présentent

sentent quelques nuances qui puissent dépendre du vice de ces parties, qui se rapprochent sur-tout des affections spasmodiques. Il y a tant de maladies qui n'ont aucun rapport avec les dernières, dont les symptômes en diffèrent essentiellement, dont les effets sont si éloignés de ceux que celles-ci produisent, qu'il est aisé d'appercevoir les nuances différentes qu'elles présentent, lorsqu'elles en prennent ou en imitent le caractère.

Les spasmes jouent toujours le plus grand rôle dans tous les cas de vice vénérien dégénéré ; ils se présentent sous différentes formes ; tantôt ils offrent l'image de la tension, de l'irritation, de l'érethisme ; tantôt ils ne laissent entrevoir que relâchement, affaissement, inertie ; tantôt ils présentent ces différentes nuances à la fois ; ce dernier état est le plus fréquent : j'ai déjà fait voir combien l'affection, la lésion,

l'affoiblissement du *sensorium commune* sont ordinaires dans ces maladies.

Ces connoissances suffisent pour diriger le Praticien ; elles m'ont suffi fréquemment pour déterminer le caractère de ces maladies , & l'événement a justifié souvent mon diagnostic ; on peut faire ici usage des signes que j'ai indiqués dans le dernier article du Chapitre précédent ; ils deviennent encore plus certains , s'ils surviennent sans avoir été précédés d'aucune cause qui ait pu les produire , sur-tout si les maladies résistent à l'usage des remèdes employés avec discernement.

A R T I C L E I I I .

Maladies Vénériennes - Chroniques compliquées.

Je suis entré déjà dans plusieurs détails sur les différentes complications du virus vénérien ; j'ai dit qu'il pouvoit se combiner avec les vices écrouelleux ,

scorbutique , cancreux , goutteux , rhumathismal , rachitique , dartreux , &c. qu'il développe ceux-ci , s'ils sont encore assoupis ou enveloppés dans la masse des fluides , qu'il augmente leur énergie , s'ils sont déjà développés. J'ai décrit les effets qui peuvent résulter de ces complications ; j'ai fait voir qu'il y a toujours un des vices compliqués qui domine , & que rarement c'est le vice vénérien ; j'en ai donné les raisons : je ne répéterai point ce que j'ai déjà dit ; je renvoie au chapitre précédent : j'ajouterai seulement que ces complications peuvent avoir lieu avec le vice vénérien soit dégénéré , soit conservant son premier caractère.

Il est difficile de connoître ces complications , & le Praticien le plus exercé s'y trompe souvent ; elles ne présentent presque jamais aucun signe , aucun caractère vénérien , & ne laissent appercevoir que les accidens & les symptômes du vice qui prédomine.

L'aveu des malades , celui des peres ou des nourrices des enfans infectés , le rapprochement des différentes circonstances , & l'application des signes dont j'ai parlé dans l'article précédent , peuvent nous fournir quelques lumieres ; encore font-elles souvent insuffisantes dans les cas dont il est ici question : j'avoue combien nos connoissances sont bornées à cet égard , & combien peu de ressources nous offrent l'examen le plus attentif , l'observation la plus profonde & la plus réfléchie , l'expérience la plus consommée : on ne peut donner sur cet objet que des simples apperçus , & quelques idées générales , qui dérivent de quelques circonstances saisies , pour ainsi dire , au hasard. Je vais rendre compte de ce que j'ai vu ou cru voir ; le résultat de mes observations , sera très-circonscrit ; mais il engagera peut-être les Praticiens à se livrer à un examen plus précis & plus attentif , &

ils pourront être plus heureux que moi dans leurs recherches.

Dans la complication des vices vénérien & scorbutique, les inflammations ont ordinairement une couleur vineuse dans les commencemens ; elles pâlisent ensuite, & prennent une teinte d'un rouge blanchâtre ; le pus qui découle des abcès & des ulcères, est ichoreux, sanieux, sans consistance ; le bord des ulcères est livide, & quelquefois se décolle ; il se forme souvent une gangrene blanche dans leur centre, & sur leurs bords ; les taches qui paroissent sur la peau, sont plus animées, moins constantes, plus sujettes à changer de place, que dans le scorbut simple, & quelquefois très-légerement farineuses & accompagnées de démangeaisons.

Dans la complication du virus vénérien avec le vice écrouelleux, les glandes tuméfiées par ce dernier, s'ouvrent plutôt, suppurent plus promptement, & fournissent un pus ichoreux,

âcre, rongéant, qui a une odeur acide, plus marquée à mesure que l'ulcère devient invétéré; les gencives deviennent ordinairement plus molles, plus flasques, plus blanchâtres, que dans les cas de simple vice écrouelleux; le ventre durcit, grossit; quelquefois la maladie se termine par une hydropisie, qu'on peut appeller *scrophuleuse-vénérienne*.

Je n'ai observé aucun signe précis de la complication des vices vénérien & rhumatismal; je l'ai vue seulement quelquefois produire sur les os, des tumeurs qu'on auroit pu prendre pour des exostoses, mais qui n'étoient que des élévations du périoste, & qui changeoient de place, vraisemblablement par la mobilité de l'humeur qui les produisoit; je ne les ai apperçues que sur les os cylindriques, & même sur la partie de ces os qui est dégarnie de muscles.

La complication du vice vénérien

avec la goutte, ne m'a jamais présenté aucun signe particulier ; j'ai cru seulement que celle-ci pouvoit en devenir plus fréquente, plus longue, plus douloureuse ; mais M. *Vigarous* indique un signe particulier. » Il naît, dit-il, des
 » pustules hideuses sur les parties de la
 » peau couvertes de poils, au voisinage
 » des articulations, sur la peau de tous
 » les membres, comme si les deux ma-
 » ladies conjointes étoient simplement
 » une maladie cutanée ; ces pustules pa-
 » roissent souvent sous la forme d'ulcères
 » sordides, couverts d'escarres blanches
 » & gangreneuses, tantôt sous la forme
 » d'ulcères phagédéniques ou rongeurs,
 » & tantôt aussi sous celle de pustules
 » écailleuses, telles qu'en produisoit
 » la lepre ; toutes sont douées d'une
 » sensibilité graduelle & relative ; elles
 » ne sont cependant pas toutes égale-
 » ment sensibles & douloureuses (a).

(a). *Vigarous*, ibid p. 50.

Je n'ai jamais eu lieu de faire une observation pareille ; elle me paroît même si surprenante , que j'ose me permettre de croire que M. *Vigarous* n'a entendu décrire que quelques cas particuliers , & qu'il n'a pas cherché à en faire une application générale à tous les cas de complication de ces deux maladies ; je le crois avec d'autant plus de raison , que les accidens que ce Chirurgien décrit , paroissent plutôt dépendre d'une complication du vice vénérien avec le vice dartreux , & que j'ai vu souvent dans ce dernier cas une réunion d'accidens , sinon absolument pareils , au moins très-analogues.

J'ai vu deux fois , dans des complications vénérienne & goutteuse , des tumeurs se former autour des articulations , s'ouvrir par érosion , suppurer lentement , & une des deux fois se couvrir d'une escarre gangreneuse ; mais je n'ai regardé ces deux faits que comme des cas particuliers , dont je ne crois

point devoir faire une application générale.

Je ne saurois terminer l'article des maladies vénériennes compliquées sans parler de celles qui présentent le même caractère, & qui ne dépendent que du vice vénérien dégénéré, sans aucune espèce de complication.

Ce vice produit souvent des éruptions à la peau, des douleurs dans les membres, des douleurs dans les articulations, des engorgemens lymphatiques. On pourroit confondre ces états avec des complications, le premier avec un vice dartreux, le second avec le rhumatisme, le troisieme avec la goutte, le dernier avec le vice scrophuleux; il est cependant important de les distinguer.

Les maladies dartreuses produites par le vice vénérien dégénéré, supposent la non-existence préliminaire de maladies pareilles; elles résistent aux remèdes ordinaires; elles sont presque

toujours accompagnées des signes que j'ai indiqués dans le Chapitre précédent

Les maladies rhumatismales, dépendantes du même vice, ne sont point de vrais rhumatismes, de vraies douleurs rhumatiques; elles sont l'effet du transport, quelquefois momentané, quelquefois persévérant, du vice vénérien dans la substance des muscles; elles sont ordinairement vagues, changeant souvent de place, rarement fixées long-tems sur une même partie, portent moins fréquemment un caractère inflammatoire, se font plus sentir la nuit que le jour, sont accompagnées le plus souvent d'une éruption à la peau ou d'une disposition farineuse de cette partie, sur-tout lorsqu'elles se déplacent & disparoissent.

Les douleurs des articulations, produites par le même vice, ne constituent point une vraie goutte; elles n'en prennent que la forme par le transport du

vice vénérien dans ces parties. On peut leur appliquer les mêmes principes que je viens d'établir relativement aux maladies rhumatismales ; j'ajouterai seulement que les tumeurs qu'elles produisent dans les articulations, s'éloignent beaucoup plus de l'état inflammatoire, qu'elles sont en général moins élevées, moins évidentes, & plus molles. *Forestus* avoit déjà observé que ces douleurs ne sont accompagnées d'aucune tumeur, qu'elles se prolongent sur le périoste, & qu'elles se renouvellent sur-tout par la chaleur du lit, dans les changemens de tems & par les vents du midi. (a)

Les tumeurs lymphatiques qui sont l'effet du même vice, ne présentent aucun des caractères du vice scrophuleux ; elles s'ouvrent plus rarement & leur suppuration est d'une meilleure qualité.

(a). *Forestus*, ibid. lib. 29. Obs. II. in schol. p. 411.

ARTICLE IV.

*Maladies Vénériennes-Chroniques
héréditaires.*

Les peres infectés d'un virus, soit simplement assoupi, soit dégénéré, le transmettent aux enfans auxquels ils donnent naissance, & les exemples n'en sont pas rares; ceux-ci le reçoivent tantôt développé & conservant son premier caractère, tantôt dégénéré.

Dans le premier cas, le virus exerce son action de deux manieres; ou il se développe tout de suite dans le corps des enfans, & alors il produit promptement des symptômes; ou il s'enveloppe avec la masse du sang, & dégénere insensiblement, & ses effets sont les mêmes que ceux dont je vais parler.

Dans le second cas, le virus dégénéré ne conserve point le caractère vérolique, se présente sous diverses formes, & prend souvent celles des

vices écrouelleux, scorbutique, rachitique, galeux, ou se complique avec eux; il se développe quelquefois de bonne heure & exerce les ravages dès les premières années après la naissance; quelquefois il ne se montre que dans l'âge de puberté; quelquefois enfin, il n'agit qu'à l'âge de trente cinq, quarante & quarante-cinq ans; les effets de son développement & de son action ne sont point les mêmes dans ces trois époques de la vie.

Lorsque le virus passe tout développé dans le corps des enfans, & qu'il y conserve son caractère vérolique, il produit des symptômes que les enfans portent quelquefois en naissant, ou qui se développent peu de jours après leur naissance. Tels sont l'état flétri, ridé, décoloré de la peau, des ophthalmies, quelquefois bornées aux paupières, quelquefois étendues jusqu'à la conjonctive, une suppuration au grand angle de l'œil, dont l'abon-

dance est proportionnée au degré de l'inflammation, des fissures, des gerçures, des excoriations, des ulcères aux parties naturelles, des aphthes, souvent chancreux, aux levres, à la bouche, & sur la langue, la diarrhée, le marasme : ces symptômes ne sont pas cependant toujours réunis, & ne présentent point la même intensité; ils varient eu égard à la quantité du virus, à son activité, au degré de son développement, & à la disposition du sujet.

Lorsque le virus passé dans le corps de l'enfant, y dégénère, ou qu'il lui est transmis déjà dégénéré, les effets ne sont ni les mêmes, ni aussi prompts.

Dans l'enfance, il aggrave tous les maux & les accidens de ce période de la vie; il rend les tranchées, les douleurs de colique plus vives & plus fréquentes; il retarde l'époque de la dentition, quelquefois jusqu'au quatorzième mois, la rend plus longue, plus

difficile , plus douloureuse , porte assez souvent sur les dents , les noircit , & les dispose à la carie ; il facilite ou augmente la génération des acides dans les premières voies , & produit une teinte verdâtre dans les excréments ; il agit sur les os & sur les glandes , développe le rachitis , le virus écrouelleux , ou les produit , ou bien en prend la forme , il se porte sur la peau , & y détermine , sur-tout vers la tête , des éruptions de différens genres , croûtes , pustules , ulcères , teignes , & principalement des gales épaisses , abondantes , croûteuses , qui laissent suinter quelquefois une humeur plus ou moins âcre , & qu'on confond souvent avec la croûte laiteuse ; il produit le marasme , la foiblesse du corps , qui se trouve assez communément jointe à la vivacité de l'esprit.

Tous ces accidens peuvent exister indépendamment du vice vénérien , mais celui-ci n'agit pas moins sur les

nerfs chez les enfans , que chez les adultes , & les spasmes qui s'y joignent , peuvent éclairer le Médecin ; ces accidens sont encore plus graves , plus opiniâtres , plus rebelles , lorsqu'ils reconnoissent ce vice pour principe , & en même tems on observe que la transpiration est plus difficile , & que les fluides sont plus disposés à la putréfaction.

M. *Sanchès* indique avec raison un signe particulier , qui ne laisse aucun doute lorsqu'il existe ; c'est une ampoule ou pustule , qui paroît sur le milieu de l'intérieur de la levre supérieure sur le filet , qui disparoît quelquefois , mais qui est presque toujours très - apparente , lorsque les autres symptômes se manifestent avec plus d'intensité (a).

Dans l'âge de puberté & dans l'adulte , ce virus produit , entretient ou prolonge un grand nombre de mala-

(a). *Sanchès*, ibid. p. 163.

dies , que j'ai déjà indiquées , sur-tout des douleurs vagues , des démangeaisons au scrotum chez les hommes , des fleurs blanches chez les femmes. Dans les corps vigoureux & robustes , il prend le caractère de rhumatismes , sciaticques , douleurs articulaires , ophthalmies , dartres , &c. Dans les corps délicats , foibles , vifs , sensibles , ingénieux , sur-tout chez les femmes , il porte sa principale action sur les nerfs , il produit des spasmes dans différentes parties du corps , mais ordinairement plus évidens au diaphragme & à l'estomac , des gonflemens , des douleurs , des resserremens de ce dernier viscère ; il vicie les fonctions & celles des intestins ; il rend les digestions longues , difficiles , laborieuses , imparfaites , & les garde-robes difficiles , seches & rares.

A l'âge de quarante ou quarante-cinq ans , les spasmes se produisent principalement à la superficie du corps &

dans le canal intestinal ; chez les hommes forts & robustes , ils sont plus généraux ; mais ils se font sentir plus particulièrement à l'estomac & aux intestins chez les hommes foibles , sensibles , irritables , & donnent lieu à des coliques , à des maladies du foie , des reins , de la tête ; ils se développent sur-tout chez les femmes au moment de la disparition de leurs regles , se montrent plus évidemment à l'estomac & dans le canal intestinal , & produisent différens maux que j'ai déjà indiqués.



CHAPITRE III.

VUES GÉNÉRALES SUR LA MÉTHODE CURATIVE DES MALADIES VÉNÉRIENNES-CHRONIQUES.

LE traitement des maladies vénériennes-chroniques est très-difficile , soit par la difficulté de les connoître , soit parce qu'elles présentent en général un caractère qui s'éloigne de la nature du mal principal , duquel elles dérivent , & s'accorde peu avec la manière d'agir des remèdes qui pourroient le combattre ; pour l'établir avec succès , il est nécessaire de rappeler ici les principes généraux qui font la base de la théorie de ces maladies.

1. Le virus dégénéré a cessé d'être vérolique , & subsiste sous une autre forme.

2. Il en est de même du virus com-

pliqué lorsqu'il est en même tems dégénéré ; s'il n'est qu'affoupi , & conserve son caractère primitif, il est mêlé, combiné, confondu avec un autre vice prédominant , qui l'opprime , le subjugue , l'anéantit , & ce mélange produit un vice particulier , qui s'éloigne du caractère de l'un & de l'autre.

3. Les mêmes principes ont lieu à l'égard du virus héréditaire.

4. Dans tous ces cas, la lymphe est viciée , altérée , dépravée , produit une lésion sensible dans les mouvemens des solides , un vice évident dans les sécrétions & les excrétiens, une dégradation dans la constitution des fluides , qui tend presque toujours à la putréfaction , à la décomposition , à la dissolution.

5. Le virus porte une action évidente sur le genre nerveux , qui donne naissance à des spasmes , se présente d'abord avec des nuances de crispation , d'irritation , d'éréthisme , n'offre

ensuite que l'image du relâchement , de l'affaïssement & de l'atonie , & quelquefois réunit les uns & les autres.

6. Ces maladies attaquent principalement les sujets naturellement foibles , délicats , sensibles , irritables , ou parvenus à cet état par le concours des circonstances précédentes.

Il résulte de là : 1°. Que dans ces maladies , le vice a ordinairement cessé d'être vérolique. 2°. Qu'il y a une disposition ou réelle ou facile à la dissolution ; 3°. Que le genre nerveux est plus ou moins affecté , 4°. Que les sujets qui les éprouvent sont en général foibles , délicats & irritables.

Ces quatre considérations sont importantes , & doivent faire la base de la doctrine à établir pour la méthode curative.

La principale indication consiste à combattre & détruire le vice qui produit ces maladies ; mais en la remplissant , il ne faut point négliger les autres

indications secondaires , qui doivent favoriser & seconder l'action du remede principal , & sans lesquels tous les secours deviendroient inutiles , & peut-être dangereux ; il est indispensable en même-tems de calmer ou diminuer le spasme , de ranimer , ou au moins soutenir le ressort des solides , de prévenir la décomposition des fluides , ou en arrêter les progrès , si elle a déjà commencé , enfin d'avoir égard aux forces , à l'âge , au sexe , à la constitution naturelle ou accidentelle & à l'état des fibres & des viscères du malade. On doit parconséquent éviter tous les remèdes qui pourroient produire des effets contraires ; ils accéléreroient l'inertie des solides , l'altération des fluides & la destruction de la machine.

ARTICLE PREMIER.

Dangers du Mercure.

Le mercure a été le remede le plus

généralement proposé, conseillé, adopté, & employé dans le traitement des maladies vénériennes. Je n'examinerai ni le degré d'utilité qu'il peut avoir dans les maladies récentes ou caractérisées par des signes évidens & non-équivoques, ni s'il y a d'autres remèdes qui puissent mériter la même confiance, & peut-être la préférence sur ce minéral; je me bornerai à mon objet, aux maladies vénériennes-chroniques.

Nous devons juger de la nature & de l'action du mercure par ses effets, & ceux ci doivent diriger notre confiance.

Je pourrois rappeler ici des tristes vérités connues de tous les Praticiens; je pourrois présenter un tableau effrayant des ravages que le mercure produit tous les jours; je pourrois affirmer que, dans les sujets irritables & sensibles, donné à la plus petite dose, il enflamme la bouche & produit des

salivations abondantes, que les douleurs de tête, les anxiétés générales, l'insomnie, quelquefois le délire, & beaucoup d'autres accidens encore plus graves, en font l'effet prochain ; je pourrois rapporter une multiplicité d'observations qui font voir les maux qu'il a produits, la perte de la vue (a), la perte de l'ouïe & de la parole (b), des hémorragies énormes (c), le sphacèle de la langue, des gencives, du

(a) Fabricio de Hilden, *Observ. & curat. Chirurg. cent. VI.* Francfort, 1646. in-fol. cent. V. Obs. 13.... Willis, *de animâ brutorum*; Lyon, 1676. in-4°. part. II. ch. 2.... Kramer, *Medicina castrensis*; Nuremberg, 1735. in-4°. p. 86.

(b) Blegny, *Zodiacus med. gallus*; Geneve, 1679. in-4°. ann. I. Jan. Obs. 13.

(c) Camerarius, *Dissert. Taurinenses*; Tübingen, 1712. in-8°. Epist. 7.

gossier,

gosier, du visage (a), la foiblesse, l'inertie de la tête (b), des paralysies (c), des spasmes cyniques (d), la phthisie pulmonaire, la phthisie nerveuse, &c.

Ce tableau suffiroit pour inspirer une juste méfiance de ce remede dans les cas dont il s'agit ici, où le genre nerveux est affecté, où il faut craindre & prévenir une dissolution, & où les sujets sont foibles, délicats, irritables; mais je ne m'y arrêterai point; je me bornerai aux seuls faits qui peuvent être appliqués à l'objet dont je m'occupe.

(a) *Fabricio de Hilden*, *ibid.* cent. III. Obs. 92.... *Dolæus*, *eph. nat. cur.* Dec. II. ann. IV. Obs. 120.

(b) *Hofmann*, *de imprudenti medicatione, multorum morborum & mortis causâ*; Halle, 1715. in-4°. §. 39.

(c. d) *Kramer*, *ibid.*

Si on examine avec attention la manière d'agir & les effets du mercure, on leur trouvera presque une similitude avec la manière d'agir du vice vénérien dégénéré.

Il porte une action évidente sur les nerfs : presque toujours, chez les personnes délicates & sensibles, sur-tout chez les femmes, & quelquefois chez les hommes forts & robustes, il altère la constitution naturelle & la rend très-sensible & très-irritable, il produit des spasmes, des convulsions, la palpitation du cœur, des tremblemens des membres, qui se soutiennent dans quelques sujets longtems après son usage, & durent quelquefois toute la vie ; les exemples des personnes qui en ont conservé des maux de nerfs, que rien n'a pu détruire, sont encore assez fréquens ; la phthisie nerveuse, des fièvres du même caractère, des spasmes croniques en sont quelquefois les suites. Son action se porte même

sur le *sensorium commune*, & y produit la même lésion, le même affoiblissement, que le vice vénérien dégénéré; de là viennent les stupeurs, les paralysies, la foiblesse de la tête, la perte de mémoire, la diminution des facultés intellectuelles, l'imbécillité, qui ont suivi son usage dans une infinité de circonstances.

Le mercure agit encore d'une autre manière; il met les solides en mouvement, & augmente leur action; il divise les fluides, accroît leur mobilité, & détruit les liens qui maintiennent la consistance qui leur est nécessaire; il détermine ainsi, quelquefois très-promptement, le passage des derniers à un état de dissolution, & des premiers à un état de gangrène: de là viennent les dissolutions ou dispositions à la dissolution, qui suivent assez fréquemment son usage, les bouffissures, les cachexies, les enflures des extrémités, les hydropisies; de là viennent

les fièvres lentes qui surviennent quelquefois, & qui menent au marasme, à la consommation & à la mort.

Dans les cas de complication, le mercure présente un autre danger & une autre espèce d'analogie avec l'action du vice vénérien ; il développe les autres vices ou virus préexistans, s'ils sont encore assoupis ; il augmente leur énergie, s'ils sont déjà développés.

Ce ne sont point ici des vaines allégations : ce sont des faits connus de tous les Praticiens. Je pourrois multiplier les citations, les autorités, les observations ; mais elles deviennent inutiles pour des faits qui sont comme de notoriété publique parmi les médecins.

Si le mercure agit de la même manière que le vice vénérien dégénéré, s'il produit les mêmes effets, s'il augmente l'affection nerveuse, qu'il faut calmer & détruire, s'il détermine une dissolution des fluides, qu'il faut pré-

venir ou arrêter, si son action est encore plus vive & ses effets plus marqués & plus graves dans les sujets foibles ou délicats qui sont le plus exposés aux maladies vénériennes-chroniques , enfin s'il développe les vices étrangers au vice vénérien avec lesquels celui-ci peut se compliquer, ou s'il augmente leur énergie, on ne peut s'empêcher de conclure que ce remède, loin d'être utile, ne peut être que dangereux dans ces maladies, & qu'il doit être banni de leur traitement.

L'observation confirme cette vérité : Je ne puis m'appuyer ici du témoignage d'un grand nombre de Praticiens; il y en a très-peu qui se soient occupés des maladies vénériennes-chroniques , & très-peu par conséquent qui aient observé la marche, les effets, & le degré d'utilité des moyens avec lesquels on a essayé de les combattre. Mais si les autorités que j'em-

plourai sont peu nombreuses, elles sont irréprochables, & les Praticiens de qui je les emprunterai, jouissent d'une considération qui ne permet point de les révoquer en doute.

1. *Forestus*, qui a observé plusieurs fois les maladies vénériennes - chroniques, proscrit le mercure, parce qu'il porte sur les nerfs, & occasionne la paralysie, la palpitation du cœur & les stupeurs (a).

2. *Ferrara*, Chirurgien de Milan, s'élève contre ceux qui ont recours au mercure dans des cas pareils; ils déclarent ainsi, dit-il, la guerre à la maladie, & ne la détruisent jamais (b).

3. *Baglivi*, après avoir présenté le

(a) *Forestus*, ibid. liv. 32. p. 539.

(b) *Bellum quidem hoc modo morbo indicentes, eum tamen neutiquam debellantes; FERRARA, Sylva Chirurg; Francfort, 1644. in-8°. liv. I. Obs. 54.*

mercure comme ennemi des nerfs (c), après avoir établi que les remèdes doivent varier suivant la diversité des tempéramens, proscriit le mercure du traitement des personnes foibles, délicates, émaciées, & lui substitue avec succès une décoction, dont la base est la far-separeille, à laquelle il associe quelques purgatifs (d).

4. M. *Louis*, dirigé par les observations nombreuses qu'il a faites dans une pratique étendue, n'hésite point à prononcer en parlant du vice vénérien dégénéré, que « le principe a » cessé d'être vérolique, & subsiste » sous une autre forme, contre laquelle les remèdes anti-vénériens » sont sans effet, que la lymphe est dépravée, de manière qu'en donnant » du mercure aux malades, on aigri-

(a) *Baglivi*, *ibid.* p. 97.

(b) *Ibid* p. 99.

» roit encore leurs maux chez
 » les adultes , ajoute-t-il , dans les cas
 » qui ont été primitivement les moins
 » équivoques , on s'obstine quelquefois
 » à vouloir guérir par le mercure ; le
 » mal dégénère ; le virus émoussé , &
 » qui a changé de nature , devient
 » plus opiniâtre encore (a).

5. M. Schwediaver , qui a si bien
 écrit sur les maladies vénériennes , &
 qui est lui même un grand partisan
 du mercure , ne peut s'empêcher de
 convenir , d'après une longue expé-
 rience , que *la constitution des per-
 sonnes qui ont pris du mercure pour
 les affections vénériennes passées , est
 devenue quelquefois très-irritable ; que
 c'est au point qu'on ne peut leur ad-
 ministrer ensuite quelques grains de
 mercure à l'intérieur ou quelques fric-
 tions , quelles ne soient affectées d'une
 fièvre nerveuse , de spasmes , de dou-*

L (a) Louis, *ibid.* p. 19, 20 & 21.

leurs de tête , ou qu'elles ne tombent très-facilement dans la salivation dès le second ou troisieme jour , & que plus les maladies vénériennes sont anciennes, plus elles résistent au pouvoir spécifique du mercure (a).

6. M. Sanchès , malgré sa confiance aux mercuriaux , sur-tout à ceux qui sont sous forme saline , a fait un aveu qui dérive de ses propres observations ;
 » je ne puis pas concevoir , dit-il , que
 » la maladie vénérienne puisse être
 » guérie radicalement , lorsqu'elle est
 » répandue dans le système des nerfs
 » & des artères que par les moyens
 » suivans , 1°. Après avoir vaincu le
 » spasme des nerfs ; 2°. Par les sueurs
 » universelles de tout le corps ». —
 « Les remedes , dit-il ailleurs , sont les
 » seuls anti-spasmodiques , & ensuite
 » les sudorifiques , en les continuant
 » jusqu'à ce qu'il paroisse un sédiment

(a) Schwediaver , ibid. p. 302.

» louable (a) ». En parlant des mêmes maladies chez les enfans , il prescrit des remèdes absolument différens des préparations mercurielles (b).

7. M. *Vigarous* , qui s'est occupé particulièrement des maladies vénériennes compliquées, rapporte un grand nombre d'observations qui constatent les effets funestes du mercure dans les complications du vice vénérien avec les vices écrouelleux , gouteux , rhumatismal & dartreux ; il a vu ce remède , donné sous différentes formes , avec beaucoup de précautions , même à petite dose , développer ces vices ou les exaspérer , faire des ravages qui surprenoient les maîtres de l'art les plus expérimentés , produire des dissolutions scorbutiques , des fièvres lentes , le marasme , la consommation ,

(a) *Sanchès* , *ibid.* p. 148 , 153.

(b) *ibid.* p. 165 , 153.

la mort. Il conclut que le mercure est nuisible dans tous ces cas , que tantôt « il » aggrave les symptômes , produit des » accidens inattendus & formidables , » retarde les cures , & les éloigne » infiniment de leur terme , en faisant » courir aux malades les dangers les » plus redoutables , que tantôt les » accidens se jouent du mercure , » qu'ils diminuent graduellement & » semblent disparoître , mais se mani- » festent sur d'autres parties avec plus » de férocité (a) ».

8. Je pourrois joindre ici mes propres observations , qui prouveroient de même l'inutilité , l'insuffisance & souvent le danger des préparations mercurielles dans le traitement de ces maladies; je me bornerai aux exemples que je rapporte à la fin de cet

(a) *Vigarous* , *ibid.* p. 10 , 20 , 21 , 23 , 26 , 32 , 37 , 52 , 106.

Ouvrage , *Observations* I, III , IV.

9. Enfin , j'invoque ici le témoignage de tous les Praticiens ; en est-il un seul , qui n'ait vu des maladies vénériennes , qui , rebelles , opiniâtres , avoient résisté aux traitemens mercuriels les plus méthodiques , répétés plusieurs fois , ou bien qui avoient reparu après un tems plus ou moins long à la suite de ces traitemens , résister toujours à l'action du mercure , & ne céder qu'à l'usage des incisifs , diurétiques , ou diaphorétiques végétaux ? Ces cas sont très-fréquens , & présentent presque toujours l'image ou la tournure d'un vice vénérien dégénéré ; ces maladies rentrent alors dans la classe des chroniques.

Une autre raison , non moins importante , doit encore faire proscrire le mercure : l'usage de ce remède laisse souvent après lui des incommodités , des dérangemens , des affections qui dégènèrent avec le tems en des ma-

ladies d'une nature différente , presque toujours présentant un caractère spasmodique , & souvent de dissolution : on pourroit les confondre avec les maladies produites par un vice vénérien dégénéré , les unes & les autres aiant à peu de chose près les mêmes nuances ; le mercure ne pourroit qu'aggraver les symptômes & les maladies dont il est la cause primitive , & deviendrait un remède très-dangereux. Cette réflexion m'a paru frappante ; je la dois à M. *Schwediaver* (a) , & plus je la médite , plus je la trouve décisive.

A R T I C L E I I.

*Dangers particuliers des préparations
Mercurielles, sous forme saline.*

Les principes que je viens d'établir doivent être appliqués à l'usage du mercure , de quelque manière & sous

(a) *Schwediaver*, *Ibid.* p. 306.

quelque forme qu'on l'emploie ; mais ils ont encore une application bien plus précise à l'usage intérieur des préparations mercurielles.

Ces préparations sont encore plus dangereuses que l'usage extérieur du mercure ; elles sont toutes âcres , caustiques, corrosives ; quelques moïens qu'on emploie pour les adoucir , on ne peut y parvenir ; on ne sauroit les dépouiller entièrement des parties corrosives étrangères au mercure , qui leur sert de base ; elles peuvent devenir & deviennent quelquefois un vrai poison. Je m'arrête sur-tout au *sublimé corrosif* , dont l'emploi facile a beaucoup trop étendu l'usage.

Ce remède , vraiment dangereux , est entre les mains de tout le monde ; les personnes dépourvues de toutes sortes de connoissances se l'administrent elles-mêmes , ou l'administrent aux autres ; il fait la base de la plupart des remèdes des empiriques ; des jeunes

gens, à peine instruits des premiers élémens de la chirurgie, & ignorant absolument tous principes de pratique médicale, de chimie, & de matière médicale, le donnent hardiment au premier venu; il n'est point jusqu'aux gardes-malades, qui ne se permettent de le conseiller & de l'employer.

Mais je ne conçois point que des médecins instruits puissent s'en permettre l'emploi, qu'ils puissent le conseiller sans discernement dans tous les cas, toutes les circonstances, & pour tous les tempéramens, qu'ils osent en faire usage en dispensant les malades des précautions qui pourroient contribuer à en diminuer le danger, tels que le régime doux, léger & humectant, les bains, les émolliens, les adoucissans, l'attention de se tenir chaudement, de ne point s'exposer aux intempéries de l'air, d'éviter les travaux ou les exercices fatigans; je conçois encore moins que quelques-uns ne craignent point de présenter

l'eau comme *le meilleur véhicule de ce remède, le plus propre à prévenir tous les accidens ou à y remédier*, & que, dans le moment où ils avouent que ce remède ne sauroit convenir dans certains cas, comme de toux opiniâtre, de fièvre lente, de crachement de sang, ils n'hésitent point cependant à le conseiller toujours; enfin, je ne puis concevoir qu'ils le mettent eux-mêmes entre les mains des ignorans, des femmes, des habitans des campagnes, qu'ils n'en parlent que par chopines & par pintes, qu'ils le prescrivent à trois quarts de grain par jour, qu'ils en conseillent jusqu'à six bouteilles pour le traitement des femmes robustes & quatre pour celui des femmes plus foibles, en fixant la dose de douze grains par chopine, & par conséquent de vingt-quatre grains par bouteilles, dose énorme & capable de faire frémir l'homme le plus intrépide.

On cherche vainement à adoucir ce

remède en le déguisant sous la forme d'un sirop, ou en le combinant avec le lait, ou quelque boisson adoucissante, mucilagineuse ; il n'en est pas moins un poison, & un poison très-corrosif ; si en l'adoucissant on diminue son énergie, la dose ordinaire devient insuffisante, & il faut l'augmenter ; on ne prévient ainsi aucun inconvénient, & on court toujours le même danger.

Ce remède produit les accidens les plus violens, & les ravages qui en sont la suite, sont très-fréquens : il y a peu de tempéramens qui puissent y résister. L'estomac le supporte difficilement ; aussi produit-il souvent des vomissemens énormes. Son action sur les intestins détermine des coliques violentes, suivies souvent de flux dysentérique. S'il passe dans le sang, il porte son action sur les fibres des viscères, & occasionne des maladies du foie, des convulsions, des crachemens de

sang. Il laisse après lui des suites encore plus fâcheuses , des maladies de langueur , des affections douloureuses , des maux des nerfs , des fièvres lentes , qui rendent souvent l'existence pénible & menent quelquefois au tombeau.

C'est même un remede infidele ; il ne produit très-souvent que des guérisons insidieuses , qui inspirent une fausse sécurité par la disparition des symptômes ; mais tantôt leur nouvelle apparition détruit le prestige ; tantôt le virus n'est qu'émoussé , retenu dans le corps , & produit des maladies vénériennes-chroniques.

Ce n'est point d'aujourd'hui que je tiens ce langage ; depuis longtems une triste expérience m'a fait connoître les effets meurtriers de ce remede , & m'a affermi dans la ferme résolution de ne jamais l'employer. Dès 1774 , j'ai publié le résultat de mes observations ; j'ai dit que j'avois vu plusieurs fois ce remede agir principa-

lement sur la poitrine & sur les tuniques de l'estomac , rendre ces parties foibles & délicates , produire des rhumes de poitrine fréquens , des oppressions violentes , des toux habituelles , des coliques , des cardialgies , quelquefois même des phthifies pulmonaires (a).

Je pourrois citer une multiplicité d'observations rapportées par un très-grand nombre de Praticiens , qui présentent des faits analogues & même beaucoup plus graves ; je me bornerai à quelques-unes.

M. Cartheuser a été si convaincu des mauvais effets du sublimé corrosif , dont il a été souvent le témoin , qu'il exhorte tout homme jaloux de sa réputation , & qui ne veut avoir rien à se reprocher , à ne l'employer jamais in-

(a) Voyez mon *Traité des maladies inflammatoires* ; Paris , 1774. in-12. p. 235 & 236.

térieurement ; il ajoute que les effets deleteres ne se manifestent souvent que longtems après qu'on en a fait usage (*a*).

M. *Louis* s'est convaincu par sa propre expérience de l'insuffisance & du danger de ce remede ; il a vu les personnes les mieux traitées éprouver une nouvelle apparition des mêmes symptômes quatre , cinq & six mois après le traitement ; il lui a vu produire des nausées , des vomissemens , des coliques intestinales ; il a vu des poitrines délabrées par son usage , des gens d'une maigreur extrême , que rien n'a pu rétablir. Cet habile Chirurgien conclut de ses observations que , malgré toutes les précautions , ce remede est ou dangereux à dose forte , ou insuffisant à dose foible , qu'avec quelque

(*a*) Cartheuser , *Pharmalocogia* ; Berlin , 1745. in-8°. & *De suspectis quibusd. pharm. salino-mercur.* Francfort , 1759. in-4°.

circonspection qu'on le donne , on n'est jamais assuré des effets consécutifs qu'on doit craindre , que les personnes les plus robustes se ressentent toujours de son usage , qui devient mortel pour les personnes délicates (a).

M. *Bromfeild* a fait les mêmes observations & tient le même langage ; il a vu constamment les symptômes se dissiper aisément & reparoître quelques tems après ; il a connu un Chirurgien de beaucoup de mérite , qui a vu la même chose , & qui , persuadé du peu de confiance que ce remède mérite , en a abandonné l'usage ; il a vu encore que la plupart de ceux qui le prenoient le matin , se plaignoient de grands maux de cœur & d'envies de vomir , que les uns avoient des coliques violentes , que les autres en étoient si incommodés , qu'il n'a pu le leur faire continuer même à la plus

(a) *Louis* , *ibid.* p. 101 , 160 , 161 & 163.

petite dose ; aussi avoit-il cessé de s'en servir , lorsqu'il a écrit (a).

M. *Boehm* a connu des grands Médecins & des fameux Chirurgiens qui l'ont abandonné après l'avoir employé ; il assure que son pere n'en a point obtenu les effets qu'il en attendoit , & que ses propres observations l'ont convaincu qu'il ne mérite point les louanges outrées qu'on lui donne ; il ajoute que le danger auquel il expose , & les cures tirées en longueur & infidelles sont des considérations qui doivent retenir des mains prudentes (a).

M. *Schwediaver* a vu que les effets constans de ce remede sont , sur-tout dans les personnes d'une complexion

(a) Bromfeild , *Obs. sur les différentes espèces de solanum &c.* ; Paris , 1761. in-12. p. 110 , 111 , 112 , 113.

(b) Boehm , *Variæ Syphilidis therapeiæ* ; Strasbourg , 1770. in-4°. §, 24.

délicate , des douleurs à l'estomac & aux intestins , la perte d'appétit , les tranchées violentes , les diarrhées , quelquefois des coliques dangereuses , & que , s'il entre dans le torrent de la circulation , il excite des crachemens de sang , des convulsions , des fièvres nerveuses , & d'autres maux plus funestes encore ; il ajoute que , pour un malade qui est guéri , le plus grand nombre en conserve une constitution délabrée , ruinée , que la maladie en devient plus opiniâtre & plus rebelle , que le virus , après avoir demeuré assoupi pendant long-tems , éclate avec plus de fureur , & produit souvent des symptômes & des maladies , dont on peut à peine deviner la nature , & qui éludent les efforts de l'art , surtout dans les personnes du sexe (a).

M. *Vigarous* a observé que les ma-

(a) *Schwediaver* , *ibid.* p 300 & 302.

lades traités de gonorrhées par le sublimé corrosif, sont plus sujets aux rhumes de vessie & à des complications qu'il décrit (a).

M. *La Peyre* rapporte l'observation d'un homme fort & robuste, qui tomba dans une phthisie pulmonaire, dont il mourut à la suite de l'usage du sublimé corrosif, & celle d'une femme qui en mourut aussi, & dans le cadavre de laquelle il trouva les parties supérieures de chaque poumon presque détruites, avec un épanchement de sérosité dans la poitrine; il ajoute que, quelques soins qu'il ait pris, quelques précautions qu'il ait employées dans l'administration de ce remède, il en a toujours vu des mauvais effets, & a observé qu'en général il est très-pernicieux à la poitrine (b).

(a) *Vigarous*, ibid. p. 102.

(b) *Hist. de la Société royale de Médecine*, 1777. p. 222.

Les partisans eux-mêmes de ce remède ne peuvent s'empêcher de convenir de ces vérités , tels sont par exemple MM. *Locher*, *Stoerck* & *Murray* ; le premier fait l'aveu important qu'il y a des tempéramens , sur-tout chez les femmes , qui ne peuvent supporter ce remède , & qu'il donne des convulsions ou des spasmes à quelques-unes dont le genre nerveux est extrêmement sensible (a) ; le second , en rapportant une observation qui prouve son insuffisance & son danger dans une maladie vénérienne - chronique , avoue qu'il lui a vu produire des chaleurs énormes , des sécheresses à la poitrine, la soif, les douleurs de tête (b) ; le dernier le présente comme agaçant l'estomac , l'affoiblissant à la longue ,

(a) *Locher*, *Obs. pract. circa lueem veneream, epilepsiam & maniam* ; Vienne , 1762. in-8°.

(b) *Stoerck*, *Annus med. secundus* ; Vienne , 176c. in-8°. p. 225.

ne détruisant point ou ne détruisant que très difficilement le vice qui réside dans les plus petits vaisseaux , nuisible dans l'hémophthisie , la phthisie , les hémorroïdes , convenant rarement dans les ulcères , & causant des accidens fâcheux dans la complication vénérienne & scorbutique , ou une irritabilité excessive (a).

Je pourrois joindre encore à ces autorités celles de MM. *Turner*, *Dossie*, *Hirschel*, *Gatacker*, *Huntdermarck*, *Brambilla*, & d'un grand nombre d'autres Praticiens, dont le témoignage confirmeroit les observations & les assertions précédentes.

D'après des faits , aussi multipliés , que convaincans, un Médecin prudent peut-il le permettre l'usage d'un re-

(b) Murray, *Nonnulla circa methodum luis veneræ curandæ relicamenta* ; Upsal , 1777. n-4°.

mede aussi dangereux ? un malade peut-il & doit-il s'y exposer ? Peut il hasarder sa santé, sa vie , entre les mains d'une foule d'ignorans qui abusent avec autant de témérité , que de hardiesse , d'un remede qu'ils ne connoissent point ? ne doit-il point se faire une image effrayante des maux auxquels il s'expose dans le moment de l'usage de ce remede , & plus encore de ceux qui peuvent en être une suite éloignée , & qui sont d'autant plus à craindre , que leur marche est lente , cachée , insidieuse , & n'en laisse souvent développer les effets évidens , que lorsqu'on ne peut plus y remédier ?

Si le sublimé corrosif est capable de produire tous ces ravages dans les cas ordinaires , dans les maladies récentes , dans les corps vigoureux , robustes , qui n'ont été encore ni irrités , ni épuisés par les maladies précédentes & par les remedes , à combien plus forte raison doit-on les redouter

dans les maladies vénériennes-chroniques , dans des maladies où la masse des fluides est appauvrie , où le genre nerveux est affecté , où les liqueurs ont une pente à la dissolution , où les corps sont plus irritables , plus délicats & le plus souvent affoiblis.

Un nouveau fait, dont je viens d'être le témoin dans le moment où l'on imprime cet ouvrage , au mois de mai 1788 , vient à l'appui des assertions précédentes.

Une dame de vingt-six ans a failli être la victime de l'impéritie & de la témérité d'un Chirurgien ; ce prétendu guérisseur a cru trouver une apparence vérolique dans une simple éruption dartreuse des plus légères & des plus bénignes ; il a donné le sublimé corrosif sans employer aucune des précautions qui peuvent modifier l'action de ce remède féroce ; la dame en a fait usage pendant un mois , n'a éprouvé aucune espèce d'accident , &

a cependant conservé ses dartres ; un mois après la cessation de ce remède , elle a senti des douleurs dans les membres , des lassitudes spontanées , un mal-aise général ; le troisieme jour , les douleurs se sont fixées sur le ventre & les reins ; le ventre s'est météorisé , les douleurs sont devenues très-aigues & continuelles ; une fièvre aigue s'est jointe à ces accidens ; le pouls étoit dur , tendu , les yeux étincelans ; il y avoit des mouvemens convulsifs aux tendons du carpe ; les urines étoient rouges , les déjections alvines rares , difficiles , douloureuses , peu abondantes , & simplement glaireuses & rougeâtres ; ces accidens ont été accompagnés d'une insomnie continuelle.

Les saignées , la boisson abondante de petit lait & de tisane de graine de lin , les cataplasmes & les fomentations émollientes sur le bas - ventre , les lavemens émolliens & adoucissans , n'ont pu pendant quatre jours rallentir la

violence des symptômes ; ils se sont soutenus dans le même état ; mais enfin , la bouche s'est enflammée , & il est survenu une salivation abondante ; dès ce moment les symptômes ont diminué , & dans trente-six heures tous les accidens ont disparu ; tout le corps s'est trouvé couvert en même-tems d'une quantité prodigieuse de taches ou plaques d'un brun jaunâtre , d'une étendue plus ou moins considérable , dont quelques unes ont présenté le caractère dartreux , tandis que le plus grand nombre a pris la forme de ces taches qui restent quelquefois après les couches , & qui sont connues vulgairement sous le nom de *masques*.

Cette observation est importante ; elle ne laisse aucun doute sur la cause de la maladie ; elle fait voir que le sublimé corrosif a été retenu pendant quelque tems dans le corps sans donner aucun signe évident de son existence , qu'il a porté une action di-

recte & violente sur les viscères du bas-ventre, que cette action n'a cessé, que lorsqu'il s'est porté vers la bouche & s'est frayé une issue au dehors, au moyen de la salivation, qu'il a agi en même tems sur la masse des fluides & a produit un développement aussi fâcheux, que violent, d'une humeur soit dartreuse, soit de toute autre nature, qui, en se portant au dehors, a rendu la peau du visage & de tout le corps hideuse & dégoûtante.

A R T I C L E I I I .

Méthode curative.

Il est des moyens bien plus doux, aussi efficaces, & certainement moins dangereux, qui peuvent remplir les mêmes indications, opérer la séparation du vice qui infecte la lymphe, & en procurer l'évacuation, sans augmenter ni le spasme des nerfs, ni la disposition à une dissolution, ni la

foiblesse des malades , qui peuvent eux-mêmes produire une diminution de ces derniers , ou au moins être associés avec ceux qui sont propres à l'opérer.

Il faut ici diminuer l'épaississement des humeurs , sans les rendre trop fluides , trop mobiles , sans augmenter ou déterminer leur disposition à la dissolution ; il faut exciter le mouvement des vaisseaux , sans augmenter l'irritation du genre nerveux ; il faut provoquer des évacuations , sans fatiguer & sans affoiblir le malade.

Les seuls végétaux peuvent produire ces effets ; ils doivent être choisis dans la classe de ceux qui sont propres à inciser & diviser les fluides , & qui sont compris sous la dénomination générale d'Incisifs , d'Apéritifs , de Diurétiques , & de Sudorifiques ; on peut rapporter ici le Gayac , le Sassafras , l'Esquine , la Sarcepareille , qui sont regardés comme les sudorifiques par excellence,

la Bardane , la Sapoñaire , le Buis , & tant d'autres qui ont des propriétés équivalentes.

La méthode la plus sûre & la moins sujette à des inconvéniens est de les employer en décoction & noyés dans un véhicule aqueux très-abondant. *Valsalva* , *Morgagni* & *Massa* en ont éprouvé les plus grands effets en observant cette méthode ; les deux premiers en prescrivoient des décoctions abondantes , dont ils faisoient boire pendant toute la journée , & dont ils donnoient quelquefois jusqu'à dix livres par jour (a). Le dernier la faisoit prendre à la place de la boisson ordinaire & pendant les repas (b). C'est aussi le moyen qui m'a le plus réussi ;

(a) Morgagni , *ad Valsalvæ Opera Epist. anat.* Venise , 1740. in-4^o. & *de causis & sedit. morb.* t. II. p. 370 & 371.

(b) *Massa* , *ibid.* p. 70 & 71.

le remede se distribue ainsi beaucoup mieux dans le torrent de la circulation, & y porte une action plus douce & plus soutenue.

Un seul de ces végétaux suffit quelquefois , & la Sarcepareille est celui dont on peut se servir le plus communément & sur lequel on peut le plus compter. On est obligé souvent à en employer plusieurs ensemble & à les combiner avec d'autres remedes, dont je parlerai dans la suite.

Leur choix doit être déterminé par l'état du malade ; le Gayac & le Sassafras sont ceux qui ont le plus d'énergie ; la Sarcepareille en a moins ; l'Esquine est beaucoup plus foible, & on doit en attendre très-peu d'effets ; le Buis se rapproche beaucoup de la Sarcepareille ; la Bardane paroît avoir une action plus douce , & la Saponaire une action plus fondante. Dans les cas d'inertie , de relâchement, de suc épais , visqueux , tenaces , le Sassafras ,

& sur tout le Gayac doivent mériter la préférence ; dans les cas au contraire de tension , de crispation , de chaleur , d'éréthisme , la Sarcepareille doit-étre préférée ; dans les cas de congestions lymphatiques , la Saponaire fait souvent de très-bons effets : on peut la donner sous forme d'extrait ; enfin , la Bardane , quoique plus douce que la Sarcepareille , peut étre regardée comme un très-bon auxiliaire de celle-ci.

Les doses de ces plantes ne doivent pas toujours étre les mêmes ; elles doivent étre proportionnées à l'état , à la constitution , aux forces des malades , & au caractère de la maladie dominante ; il est plus prudent de commencer par des petites doses , & de les augmenter à mesure qu'on en aperçoit les effets.

Ces remedes produisent presque toujours une évacuation par les selles , les sueurs ou les urines ; ces dernieres

sont les moins fatigantes & souvent les plus heureuses, sur-tout si l'urine est chargée d'un sédiment épais & quelquefois visqueux. Le Médecin doit s'attacher à observer les effets de ces évacuations, & à soutenir celle qui paroît apporter un soulagement & produire une diminution des symptômes.

Si l'évacuation par les selles paroît la plus heureuse, quelques doux laxatifs donnés à propos suffisent pour l'entretenir; le sirop de pruneaux, la casse cuite ou confection de casse, une petite quantité de manne, le suc de mauves m'ont réussi. Dans quelques cas, sur-tout lorsqu'on soupçonne des glaires ou des viscosités dans les premières voies, on doit passer à un purgatif un peu plus actif; les follicules de sené ont rempli plusieurs fois cette indication avec succès; je les donne à très-petite dose, à un demi-gros par jour, très-rarement à trois quarts de gros ou à un gros, infusées à froid

dans la décoction des végétaux dont il vient d'être question , qui devient par-là légèrement purgative , & presque toujours sans occasionner aucune irritation. Les lavemens fréquens contribuent à produire le même effet ; ceux dans lesquels entrent le catholicum ou le sel marin , sont très-utiles lorsqu'il n'y a aucun signe de tension, de chaleur ou d'éréthisme dans le bas-ventre ; ils établissent un léger point d'irritation dans le canal intestinal , qui favorise l'afflux des humeurs vers cette partie.

Si la nature indique la voie des sueurs , il faut la soutenir par les moyens propres à relâcher & ouvrir les pores de la peau & à favoriser cette évacuation. Les bains tempérés , les bains de vapeurs sur-tout , des frictions sur le corps avec un linge , une flanelle , une brosse , la chaleur tempérée de l'appartement & quelquefois un peu au-dessus de la tempérée , une boisson

abondante , un régime aqueux & délaissant , remplissent cette indication ; dans ce cas , le malade doit éviter avec soin de s'exposer aux injures de l'air.

Si l'humeur qu'on veut expulser prend la voie des urines , on doit éviter tout ce qui pourroit en provoquer le cours vers une autre partie & l'éloigner des voies urinaires : on ne doit chercher alors à l'attirer ni vers les organes de la transpiration , ni vers ceux des excréctions alvines ; le cours des urines diminueroit en proportion de celui de la transpiration & des selles. On doit se borner à entretenir une transpiration douce & légère , & une simple liberté de ventre.

Les végétaux dont je viens de parler , doivent faire la base du traitement ; mais souvent ils ne sauroient suffire pour opérer une guérison complète ; quelquefois même ils pourroient être ou sans effet , ou nuisibles ; il est nécessaire de les combi-

ner avec différens autres moïens relatifs aux circonstances.

I. Le malade est quelquefois dans un état de dissolution ou dans une disposition prochaine à la dissolution. Les anti-scorbutiques doivent être alors combinés avec les remèdes précédens, & leur choix doit varier eu égard au degré de la dissolution. Je dois prévenir cependant que le vin anti-scorbutique réussit rarement dans ce cas, & que les acides ne conviennent que dans très-peu de circonstances. On peut les donner sous la forme de suc exprimés, ou bien les faire entrer dans la décoction des remèdes principaux. Le quinquina m'a souvent réussi; j'ai vu plusieurs fois cette écorce mêlée à la même décoction opérer des guérisons sans le concours des autres anti-scorbutiques; j'ai toujours été modéré sur la dose, & j'ai donné le vin de préférence à l'écorce, lorsque le malade a été dans un état de relâchement.

ou d'atonie ; le lait de chèvre peut encore être employé : il y a des cas où il doit avoir des succès.

II. Les maladies vénériennes-chroniques sont accompagnées quelquefois d'un état d'irritation, de crispation, d'éréthisme, de sensibilité excessive, d'agitation; les remèdes précédens pourroient l'augmenter, ou au moins réussiroient moins bien, si on ne prenoit les moyens propres à le diminuer. Le mélange d'une petite quantité de lait de vache avec la décoction précédente, ou le lait d'anefle, dans les cas où l'estomac les supporteroit, les gommeux, une dose modérée des végétaux qui doivent entrer dans la décoction, une boisson émolliente & délaiante, comme l'eau d'orge & autres pareilles, les lavemens émoulliens & adoucissans, les demi-bains tempérés, peuvent prévenir tous les accidens & favoriser l'action des autres remèdes. J'ai observé que les boissons émulsives ne réussissent que dans un

très-petit nombre de cas ; j'ai observé encore que peu de malades éprouvent des bons effets des bains entiers , & qu'on retire plus d'avantages des demi-bains.

III. L'estomac est presque toujours souffrant , ou au moins fait mal ses fonctions. Ce vice dépend tantôt d'une trop grande tension , tantôt d'un trop grand relâchement , quelquefois de l'épaississement & de la viscosité des sucs digestifs , quelquefois de leur inertie & de leur défaut de consistance , quelquefois de leur âcreté. Il est aisé de distinguer ces états par le concours des autres symptômes : l'état de tension exige les délaïans , les émolliens , les relâchans , tels que sont ceux que je viens d'indiquer ; l'état de relâchement indique les toniques & les amers : le quinquina sur-tout paroît mériter la préférence ; la viscosité des sucs digestifs cede souvent aux remèdes principaux , mais encore bien plus aisé-

ment, si on y joint une boisson abondante ; leur trop grande fluidité & leur défaut de consistance sont joints presque toujours à l'état prochain ou actuel de dissolution , & présentent les mêmes indications ; leur âcreté tient au caractère de la maladie , & ne peut être attaquée que par les mêmes remèdes que ceux qui doivent servir à combattre cette dernière.

IV. Le malade est quelquefois dans un état d'affoiblissement, d'épuisement, de marasme, qui présente peu de ressources à l'action des remèdes nécessaires. Le rétablissement des forces paroîtroit devoir être la première indication à remplir ; mais on y réussit rarement tant que la cause primitive subsiste. Il paroît plus convenable de réunir alors les deux indications , avec la précaution de proportionner la dose & l'énergie du remède principal à l'état du malade ; le lait pour toute nourriture seroit souvent le moyen le plus

propre à remplir la vue qu'on se propose, lorsque l'estomac du malade peut le supporter ; il diminueroit , il est vrai , l'action des autres remèdes , & retarderoit la guérison ; mais il vaut mieux guérir plus tard & éviter le danger auquel on s'exposeroit en faisant usage d'un remède un peu actif dans un état qui ne permettroit point de le supporter. Le lait d'ânesse , matin & soir , peut remplir les mêmes vues ; il auroit un succès moins prompt ; mais aussi il retarderoit beaucoup moins la guérison. Les gelées , les consommés , les crêmes , les farineux , peuvent être encore employés ; mais je crois qu'on doit être modéré dans l'usage de ces derniers , & ne les donner que très-légers & très-délaïés.

V. L'état de relâchement & d'atonie accompagne presque toujours celui d'épuisement & de marasme , & quelquefois celui de dissolution ; il exige

les mêmes remèdes que l'état auquel il est joint.

Les principes que je viens d'établir peuvent être appliqués aux différens états de complication du vice vénérien avec les autres vices particuliers. On attaqueroit vainement ceux-ci, si on ne commençoit par détruire le premier; on parvient ensuite plus aisément à les combattre avec succès.

La méthode que j'indique paroîtra peut-être bien simple & bien peu active, pour détruire un vice aussi difficile à combattre que le vice vénérien dégénéré; mais je ne parle que d'après ma propre expérience; elle m'a servi avec succès dans beaucoup de cas, qui paroïssent aussi difficiles, que compliqués. J'en rapporterai quelques exemples dans le chapitre suivant. J'invite mes confrères à l'essayer, en y portant les soins, l'attention & l'exactitude, qui caractérisent un Médecin attaché à

son état , fidele à ses devoirs , & jaloux de l'honneur de sa profession ; j'ose me flatter qu'ils en éprouveront les mêmes succès ; ils pourront même étendre & perfectionner la méthode que je leur propose , & je verrai avec plaisir le nouveau degré d'utilité qu'elle pourra acquérir entre leurs mains.

Je ne regarde point cependant cette méthode comme infailible ; elle manquera quelquefois son effet , & mes essais n'ont pas toujours été couronnés par le succès ; mais l'expérience & l'observation peuvent la perfectionner , & je me féliciterai d'avoir pu contribuer à diminuer le nombre des victimes que les maladies vénériennes - chroniques moissonnent tous les jours.

Les succès de cette méthode ne doivent avoir rien de surprenant ; les remedes qui en font la base , ont réussi si souvent pour détruire des maladies vénériennes non-chroniques , sans le secours du mercure , qu'il n'est pas

étonnant qu'ils aient le même succès dans les maladies chroniques dépendantes de la même cause , sur-tout lorsqu'ils sont modifiés & combinés de différentes manieres selon les circonstances.

Cette méthode n'est pas même la seule qui m'ait réussi dans des cas pareils ; j'ai employé divers autres remèdes , dont la base & les combinaisons approchent beaucoup de celles que je propose , & j'en ai éprouvé plusieurs fois les mêmes effets. Je me suis servi de *Rob anti-Syphilitique de l'Affecteur* , & j'en ai obtenu beaucoup de guérisons ; j'ai administré le *Remede du Cuisinier* , dont la Sarce-pareille fait la base , & j'en ai éprouvé les mêmes succès ; j'ai essayé la *Décoction végétale* proposée par M. *Vigarous* , je lui ai vu produire des agitations , des inquiétudes , des picottemens , des insomnies , des urines rouges , une chaleur âcre & brûlante ; je l'ai modifiée , & elle m'a réussi.

Il est aisé de voir par-là que je ne mets aucune importance à la méthode que je propose ; je l'abandonne moi-même quelquefois pour employer d'autres moyens analogues ; je ne cherche qu'à être utile , qu'à guérir les malades qui me donnent leur confiance , & tous les moiens deviennent les mêmes pour moi , lorsqu'ils peuvent remplir mes vues. Je m'empresse à présenter cette variété de remedes , également utiles ; elle est propre à multiplier les ressources , à ranimer la confiance des malades , & à faciliter aux Praticiens les moiens de remplir d'une manière plus étendue & plus agréable le but qu'ils se proposent.



CH A P I T R E I V.

OBSERVATIONS PRATIQUES, SUR QUELQUES MALADIES VÉNÉRIENNES - CHRONIQUES.

LA méthode que je viens de proposer , est appuyée sur l'observation ; je crois devoir publier quelques-uns des cas où elle m'a réussi ; ils se multiplieroient trop , si je voulois les décrire tous , & ils présenteroient une uniformité dans les nuances & les effets , qui , en les rapprochant trop , les rendroit moins saillans , sans augmenter leur degré d'utilité.

O B S E R V A T I O N I.

Un jeune homme de vingt-huit ans fut pris d'une gonorrhée virulente , qui , quoique tombée dans les bourses , céda aux remèdes qui lui furent administrés ;

nistrés; il lui resta une grosseur à l'épididyme gauche, qui disparut au moyen de quelques topiques fondans, & de l'usage intérieur des mercuriaux. Il parut jouir d'une bonne santé, se livra aux travaux de sa profession, se maria, & eut trois enfans. Quinze ans après, & le huitieme année de son mariage, il lui parut tout-à-coup un grand nombre de pustules sur le visage, la tête, & quelques autres parties du corps, d'abord croûteuses, ensuite ulcérées, des condylomes autour de l'anüs, & un chancre aux parties génitales; on soupçonna un vice-vénérien; mais l'état d'une bonne santé dans lequel avoient toujours été la femme & les enfans éloigna cette idée.

L'inutilité des remèdes administrés fit enfin recourir aux mercuriaux. On lui donna le sublimé corrosif; les pustules disparurent dès les premiers jours du traitement; mais vers la fin, il lui survint des douleurs lancinantes, avec un sentiment d'érosion, aux glandes

amygdales , à la luvette , au pharynx & au voile du palais ; les os palatins se trouverent cariés & se détacherent , le malade les cracha sans s'en appercevoir.

On lui donna alors les pilules anti-vénériennes de *Petit* , décrites par *M. Fabre* ; il n'en éprouva aucun soulagement malgré un usage de deux mois ; l'état de sa gorge étoit devenu au contraire plus grave , & il parut une exostose à l'apophyse acromion de l'omoplate. On lui administra les frictions mercurielles par extinction ; elles n'eurent aucun succès ; on les lui administra de nouveau de manière à provoquer une forte salivation ; tous les symptômes disparurent , à l'exception d'une exostose qui étoit survenue sur la partie moyenne & supérieure du coronal : elle étoit molle ; on en fit l'ouverture & on trouva une carie considérable dans l'os , & la dure-mère à découvert ; cette carie , traitée

méthodiquement, ceda aux remèdes ; la plaie fut consolidée ; le malade jouit en apparence d'une bonne santé, & se crut enfin délivré de ses maux ; mais deux ans après, le même mal de gorge reparut, accompagné d'insomnie & d'une céphalalgie violente ; les frictions mercurielles administrées de nouveau, aggravèrent son mal.

Le malade vint alors à Paris, (en 1780) & me communiqua les détails précédens, qui étoient consignés dans un mémoire rédigé par les deux Médecins qui avoient dirigé les traitemens.

Je lui trouvai une exostose à chacune des deux dernières vraies côtes du côté gauche, une carie à l'os maxillaire du même côté, la gorge toute ulcérée ; ces symptômes étoient accompagnés d'insomnie, de céphalalgie, de douleurs dans les extrémités, & de marasme, avec un commencement d'enflure aux jambes.

Je le mis d'abord à l'usage du lait de vache pour toute nourriture ; J'y joignis dans la suite des farineux, préparés avec ce même lait.

Je proscrivis tous les mercuriaux ; je le mis à l'usage d'une décoction de gayac & de sarcepareille , en y ajoutant la colle de poisson & un peu de quinquina. Je la lui donnai d'abord à petite dose, que j'augmentai insensiblement ; à la fin du premier mois, il en prenoit deux pintes par jour, faites avec deux onces de sarcepareille , & demi-once de gayac : il ne passa point cette dose. M. *Ferran* se chargea du traitement local de la carie.

Dans les quinze premiers jours , le remede ne produisit aucun effet sensible ; il parut ensuite agir par les selles ; après quelques jours, il parut des sueurs ; enfin, vers le vingt-huitieme jour , son action se porta vers les voies urinaires , & pendant le reste du traitement les urines furent abondantes, toujours trou-

bles & chargées d'un sédiment plus ou moins épais , tantôt jaunâtre , tantôt rougeâtre , & une seule fois d'un brun clair.

Jusqu'à la fin du premier mois , le malade n'éprouva d'autre soulagement , qu'un léger rétablissement des forces ; mais après cette époque , les symptômes commencerent à diminuer , & disparurent ; enfin , à la fin du troisieme mois le malade rétabli revint dans sa patrie ; je l'ai trouvé à Bordeaux , en 1784 , jouissant de la meilleure santé.

OBSERVATION II.

Une Dame agée de trente-six ans me consulta , en 1781 , pour une affection dartreuse , dont elle avoit éprouvé les premieres atteintes trois ans avant ; les dartres occupoient le visage , & étoient simplement farineuses ; la peau des bras & des mains étoit sèche , rude , & celle de cette derniere partie présentoit des commencemens très-

légers de gerçures. Je lui fis faire usage de la douce-amère; mais malgré les différentes combinaisons que je fis de ce remède avec quelques autres que je croiois indiqués, je n'opérai dans six mois aucun changement dans son état. Les questions que je lui fis, m'apprirent qu'elle avoit des doutes sur la santé de son premier mari, mort depuis quinze ans; mais elle m'assura qu'elle n'avoit jamais éprouvé aucun accident, qui eût pu lui inspirer des craintes pour elle-même; elle avoit un enfant de quinze ans, né trois mois après la mort de son pere, & un second mari, l'un & l'autre bien portans.

Je crus que le vice dartreux pouvoit n'être qu'un vice vénérien dégénéré, & je lui fis prendre le *Rob anti-Syphilitique*. Le douzième jour du traitement, après avoir pris deux bouteilles & demie de ce remède, la malade fut attaquée d'une fièvre violente, accompagnée d'une chaleur âcre, &c

de secheresse à la peau , de météorisme au bas-ventre , de la dureté du pouls , & de douleurs vagues dans différentes parties du corps. Je cessai l'usage du Rob. ; je me bornai à des délaïans & à des émolliens ; la fièvre se soutint dans cet état pendant trois jours ; elle se termina alors par une crise, dont je ne connois aucun exemple, qui est même si singulière, que j'avoue de bonne foi que j'aurois de la peine à le croire , si je ne l'avois vue moi-même ; il lui survint un écoulement jaunâtre abondant par le vagin , que je regardai comme une gonorrhée , une tumeur à l'aîne droite , assez ressemblante à un bubon , & cinq chancres dans la vulve ; la fièvre cessa tout de suite après l'apparition de ces symptômes. Je lui fis reprendre alors l'usage du *Rob anti-Syphilitique* , & trois bouteilles de plus suffirent pour opérer la guérison , tant des nouveaux accidens ,

que de l'affection dartreuse. Cette dame est encore aujourd'hui bien portante.

OBSERVATION III.

Une dame, mariée à l'âge de vingt ans avec un homme dont la conduite avoit été suspecte, éprouva, peu de tems après son mariage, un écoulement par le vagin, qu'elle regarda comme des fleurs blanches, & qui cessa deux mois après sans le secours d'aucun remède; elle parut se bien porter, eut deux enfans, & perdit son mari quatre ans après son mariage, avec la triste conviction de l'existence d'un vice vénérien chez ce dernier. Deux ans après, sa santé devint languissante; elle éprouva diverses incommodités, qui engagèrent son Médecin à lui faire faire usage de préparations mercurielles, qui ne lui procurèrent aucun soulagement; elle se mit entre mes mains au mois d'Octobre 1787.

Son état étoit très fâcheux ; elle avoit une fièvre lente , son pouls avoit peu de consistance ; sa langue avoit un volume considérable , & étoit remplie de gerçures profondes , dont quelques unes laissoient suinter une matiere assez semblable à une matiere purulente ; ses gencives étoient gonflées , songueuses , blanches , ses dents presque déchaussées , & plusieurs tremblantes ; les glandes axillaires & inguinales étoient gonflées & douloureuses avec assez de dureté , les jambes enflées , le ventre dur & douloureux par intervalles ; elle éprouvoit des insomnies fréquentes , des douleurs dans les membres , qui se renouvelloient presque toutes les nuits , un défaut absolu d'appétit , un abattement général , des inquiétudes universelles , des impatiences fréquentes , un obscurcissement ou au moins une foiblesse de la vue , qui ne lui permettoit aucune espece de lecture , un goût d'une fétidité insupportable dans

la bouche , enfin des attaques nerveuses fréquentes , violentes & très-variées ; il ne paroissoit aucun symptôme évident dans les parties naturelles. Elle venoit alors de faire usage pendant trois mois de remèdes anti-scorbutiques , qui lui avoient été administrés par un Médecin de la faculté de Paris.

Je lui fis prendre le *Rob de l'Affecteur* ; dès la troisième bouteille l'état de la langue s'améliora , les douleurs furent plus supportables , le sommeil devint plus long & plus tranquille , la mauvaise odeur de la bouche diminua , les gencives commencèrent à prendre un peu de consistance & de rougeur ; ce mieux augmenta , & fut beaucoup plus sensible à la fin de la cinquième bouteille. Pendant les quinze jours de tisane de sarcepareille qui terminent le traitement , la disparition des symptômes fut complète , l'appétit se rétablit , les forces revinrent , & je regardai la malade comme guérie ; après

un mois de repos , je viens de lui conseiller l'usage du lait d'anesse.

OBSERVATION IV.

Un enfant de six ans , foible & délicat depuis sa naissance , portoit depuis deux ans un gonflement aux glandes du col , dont une s'étoit ouverte & avoit absédé ; son ventre étoit gros , dur , & une légère pression y faisoit trouver plusieurs cordons de petites grosseurs , qui paroissoient occuper la plus grande gartie de son étendue ; l'épine commençoit à se déjetter. Je jugeai ce vice scrophuleux ; je lui prescrivis le *sirup de Bellet* , que l'estomac de l'enfant ne put supporter ; je le mis à l'usage du sel marin à base terreuse : les symptômes s'aggraverent , une fièvre lente survint , le marasme s'y joignit , & il parut sur la crête du tibia une tumeur , qui s'ouvrit , supura , & forma un ulcère baveux , ichoreux & d'une mauvaise couleur.

L'aveu du pere m'éclaira sur le caractère de la maladie, & me fit croire qu'un vice vénérien dégénéré étoit la cause de tous ces ravages.

Je mis l'enfant à l'usage d'une tisane de farcepareille & de racine de bardane, dont il prenoit pour sa boisson ordinaire, & je prescrivis un régime doux, léger & humectant; après deux mois, les plaies du col & de la jambe étoient devenues belles & fournissoient une meilleure suppuration; la fièvre avoit cessé & l'enfant avoit repris un peu de forces. Je lui fis prendre alors le *Remede du Cuisinier*, à une dose proportionnée à son âge, & prolongé pendant deux mois; la suppuration devint meilleure & plus abondante, les plaies se cicatriserent, l'engorgement des glandes disparut, l'épine se redressa; il ne lui resta que la grosseur du ventre & quelques-unes des grosseurs que j'avois trouvé dans cette partie; je le remis à l'usage de la pre-

miere tisane de bardane & de farcepareille , à laquelle j'ajoutai un peu de garence ; je la fis couper avec un peu de lait de vache ; ces derniers symptômes céderent enfin , & , depuis deux ans , l'enfant paroît jouir d'une bonne santé.

OBSERVATION V.

Une jeune femme , mariée à l'âge de dix-huit ans , éprouva , deux ans après , un écoulement jaunâtre , ensuite verdâtre , accompagné d'une chaleur vive & de cuissens dans les parties naturelles ; elle se lava plusieurs fois avec de l'eau & du vinaigre , & enfin avec du vinaigre pur , dans la vue de tempérer la chaleur quelle sentoît ; l'écoulement s'arrêta ; elle a joui depuis ce tems d'une bonne santé , & a eu deux enfans , dont l'un est mort , & l'autre est bien portant. Quatre ans après , (en 1783) , elle devint tout-à-coup triste , taciturne , se déplaissant partout ,

fuiant la société & les plaisirs de son âge , acariâtre & difficile à vivre , quoiqu'elle eût été jusques-là très-douce ; toujours renfermée dans son appartement , elle étoit livrée à une noire mélancholie. Deux mois après, elle se plaignit de lassitudes , d'un malaise général, de chaleur & de démangeaisons sur toute l'habitude du corps , & sur-tout d'une chaleur brûlante à la paume des mains ; il lui survint bientôt, sur la poitrine, le ventre & les cuisses , une éruption de boutons de la grosseur de grains de millet , qui s'étendirent & formerent des croûtes seches & farineuses. On lui conseilla les bains & le petit lait ; l'éruption disparut ; la malade reprit sa gaieté , vit du monde & se porta bien. Un an après , elle retomba dans la mélancholie ; elle eut des maux de nerfs, dont les attaques se succéderent de près : ses regles devinrent irrégulières ; en fin, elle cracha le sang pendant quelques

jours : les maux de nerfs cessèrent en même tems ; le crachement de sang , réitéré plusieurs fois dans le cours d'un an , fut suivi d'une fièvre lente , avec des exacerbations nocturnes , des crachats suspects , & de maigreur. Un vésicatoire & quelques adoucissans parurent rallentir la marche des accidens , qui , peu de tems après , reprirent une nouvelle vigueur ; un second vésicatoire ne produisit pas plus d'effet.

Je fus consulté au mois d'avril 1786 ; je jugeai que l'écoulement , que la malade avoit arrêté sept ans avant avec le vinaigre , étoit une gonorrhée virulente , que le virus avoit été repercuté , qu'il avoit porté successivement son action sur le genre nerveux , sur la peau , sur les poumons , & qu'il étoit l'unique cause de l'état où se trouvoit la malade ; je lui conseillai le *Rob anti-Syphilitique* ; je le lui administrai d'abord à petites doses & avec beaucoup de précautions ; je les augmen-

rai dans la suite à mesure que son état me le permit ; enfin , dans deux mois, je la conduisis à une guérison parfaite au moyen de cinq bouteilles de ce remède ; elle jouit depuis ce tems d'une bonne santé.

O B S E R V A T I O N VI.

Un homme d'environ 55 ans, après avoir éprouvé dans la jeunesse plusieurs maladies vénériennes, qui avoient été traitées tantôt par les frictions mercurielles, tantôt par l'usage intérieur des mercuriels , avoit joui pendant douze ou quinze ans d'une bonne santé ; à l'âge de 46 ans , il éprouva des douleurs, qui attaquèrent principalement les muscles du dos & des bras ; ces douleurs, devenues vives & presque continuelles, & ayant résisté aux remèdes ordinaires , furent attaquées par les frictions mercurielles : elles céderent ; mais il survint, deux mois après, une douleur gravative à la tête , qui se

faisoit sentir périodiquement tous les jours à la même heure ; on emploia le quinquina ; différens autres remèdes furent mis en usage , mais sans succès ; cette douleur persista pendant deux ans , en ne laissant que de très-courts intervalles de calme ; elles cessèrent ensuite & firent place à des nouvelles douleurs , mais vagues , qui passoient d'une partie à l'autre , & qui parurent enfin se fixer aux articulations du genou & du coude. On regarda cet état comme la goutte ; mais un nouveau déplacement de la douleur en produisit de nouvelles sur les muscles du dos & des bras : le malade éprouvoit ces alternatives depuis cinq ou six ans , quand je le vis en 1783.

Je lui trouvai le visage pâle , les yeux cernés ; il éprouvoit une apathie générale dans tout son corps , une pesanteur des membres , une indolence pour le travail & l'exercice , une tendance au sommeil ; ses mains étoient

brûlantes, seches & comme raboteuses, les gencives blanchâtres & gorgées, la douleur fixée aux articulations des deux genoux, avec un gonflement peu renitent de ces parties.

Je regardai la maladie comme produite par un vice vénérien dégénéré, qui avoit pris la forme d'une humeur tantôt rhumatismale, tantôt goutteuse. Je le mis à l'usage d'une décoction faite avec une once de gayac & une once & demie de farcepareille tous les jours. Le malade éprouva des insomnies, des inquiétudes dans les membres, des picotemens dans différentes parties du corps ; j'adoucis le remede par le mélange de la colle de poisson ; ces accidens se soutinrent ; les urines devinrent rouges, le gonflement des genoux présenta une disposition inflammatoire ; j'interrompis le remede, je prescrivis du petit lait & des bains : l'orage se calma dans quatre ou cinq jours ; je fis reprendre le premier re-

mede , & je l'affociai avec le lait de vache ; aucun des accidens précédens ne revint ; les urines , d'abord pâles , se colorerent & furent chargées d'un sédiment épais ; il parut en même tems des sueurs légères , mais soutenues ; il n'en résulta cependant aucun soulagement & le vingt-cinquième jour , le malade étoit toujours dans le même état : il lui survint alors un dévoiement assez considérable ; les sueurs cessèrent & les urines ne furent plus chargées de sédiment ; le lendemain , le malade fut gai , ressentit plus d'aptitude au mouvement , les douleurs diminuèrent sensiblement ; ce mieux se soutint tout le lendemain ; mais le dévoiement aiant cessé le jour suivant , le malade retomba dans son premier état.

Je crus que la nature m'indiquoit la voie vers laquelle il falloit diriger l'action des remedes : je rendis la décoction un peu purgative par l'addition d'un demi-gros de follicules de

sené tous les jours , infusé à froid pendant douze heures ; dès le second jour , les selles s'établirent au nombre de trois , quatre & même cinq tous les jours ; le mieux reparut ; le neuvième jour , la douleur des genoux cessa & se porta sur les muscles du dos & des bras ; elle n'avoit point la violence qu'elle avoit présentée autrefois ; elle diminua tous les jours & disparut enfin le dixième jour du déplacement ; le malade reprit de la gaieté , de l'embonpoint , des forces , de l'appétit au mouvement. Ce traitement a duré cinquante-huit jours ; depuis cette époque , le malade n'a plus éprouvé aucune douleur.

OBSERVATION VII.

Un jeune homme de vingt-cinq ans , sujet depuis son enfance à des dartres farineuses , eut une gonorrhée virulente , accompagnée de deux chancres au prépuce ; il brûla ces derniers avec la pierre infernale , ne fit aucun re-

mede pour la gonorrhée & , pour me servir de ses expressions , il la laissa mourir de vieillesse ; il n'en éprouva aucune incommodité ; mais , quatre ans après , les dartres changerent de caractère, s'enflammerent & se convertirent en des grosses pustules , suppurantes , douloureuses , & rendant une matiere assez âcre pour produire une démangeaison & une legere inflammation sur les parties auxquelles elle touchoit. Un traitement méthodique , dont la douce-amère étoit la base , ne produisit aucun effet. Je regardai alors ces pustules comme l'effet d'une complication des vices vénérien & dartreux ; il n'en crut rien , & fut envoyé par un autre Médecin aux eaux de Bareges , qui n'opérèrent aucun changement dans son état. A son retour , il me vit de nouveau & se mit entre mes mains ; je lui administrai le *Remede du Cuistnier* , qui agit par les sueurs & qui fit disparoître les pustules dans vingt-deux

jours ; il lui resta ses anciennes dartres , qui avoient repris le caractère farineux , & qui résistèrent à ce remède. Je commençai alors le traitement anti-dartreux , qui ne m'avoit pas réussi six mois avant , & , dans un mois , ses dartres disparurent. Ce jeune homme est marié depuis deux ans , a un enfant , & jouit d'une bonne santé.

OBSERVATION VIII.

Une demoiselle de dix-huit ans , se trouvant à la campagne d'une de ses parentes , se servit d'un bidet & d'une éponge qu'elle y trouva ; le même jour , elle éprouva une chaleur vive à la vulve ; le lendemain , la chaleur augmenta ; il survint des cuissos , des picotemens , un gonflement , une gêne en marchant ; la pudeur & l'ignorance de son état l'empêchèrent d'en parler ; elle se confia seulement à une femme-de-chambre qui , aussi peu instruite qu'elle , lui conseilla des lotions avec

l'eau de guimauve, & deux jours après avec l'eau de lavande & le vinaigre ; tous les accidens aiant disparu, la demoiselle se crut guérie ; mais huit ou neuf mois après, elle devint triste , rêveuse, languissante, fuyant la dissipation , se plaignant toujours de lassitudes , pouvant à peine faire deux cents pas sans être obligée de s'asseoir ; sa mélancholie & son insouciance augmentèrent au point de la rendre comme hébétée ; elle ne prenoit presque aucune nourriture , & maigrissoit tous les jours.

Je fus consulté par les parens, justement allarmés sur son état ; les remèdes , l'exercice , la dissipation ne produisirent aucun effet. Je soupçonnai une cause morale ; j'interrogeai les parens , qui n'en savoient pas plus que moi ; j'interrogeai la femme-de-chambre, qui n'en étoit pas plus instruite ; mais celle-ci , en vantant la bonne santé dont sa jeune maitresse avoit toujours joui , me parla de l'ac-

cident qu'elle avoit éprouvé à la campagne environ trois ans avant, comme du simple effet d'une longue course faite le jour précédent; ce fut pour moi un trait de lumière; je conçus des soupçons; après des vérifications, je crus devoir conclure que l'éponge avoit servi à quelque femme infectée d'un vice vénérien déposé dans les parties naturelles, que ce vice communiqué à cette demoiselle avoit produit les premiers accidens, qu'il avoit été repercuté par les lotions astringentes, & qu'il étoit la cause de l'état où elle se trouvoit.

Je la traitai d'après cette conjecture; son traitement ne fut pas long; trois bouteilles de *Rob anti-Syphilitique* opérèrent sa guérison; elle s'est mariée dans la suite, & a deux enfans qui se portent bien, ainsi que leur mere.

L'objet de cette observation eut des suites assez singulieres. La dame à laquelle appartenoit la maison de campagne,

pagne, tante de la demoiselle, incertaine si elle s'étoit servie de la même éponge, eut des craintes pour elle-même; j'eus beaucoup de peine à la rassurer, malgré l'état de bonne santé dont elle jouissoit; mais six mois après l'époque de l'usage que la demoiselle avoit fait de l'éponge, elle étoit accouchée d'un enfant, âgé alors d'environ deux ans & demi, & couvert d'une gale, qui après s'être présentée sur la tête depuis six mois, sous la forme d'une croûte laiteuse, s'étoit répandue sur presque tout le corps; elle craignit que cette gale ne dépendît d'un vice vénérien, & voulut que je fisse prendre à l'enfant le remède qui avoit guéri la demoiselle; je m'y refusai constamment, ne trouvant aucune raison propre à appuier ses craintes; elle prit sur elle d'administrer ce remède; elle le donna à deux cuillérées, ensuite à trois, tous les jours, & y joignit une boisson d'eau de farce;

pareille ; coupée avec de l'eau d'orge ; le remède provoqua des urines abondantes , & dans environ six semaines , la gale eut disparue & l'enfant fut bien portant.

Je rapporte ce fait par rapport à sa singularité ; cependant je n'oserois affirmer que l'enfant portât un vice syphilitique ; le Rob , quoique vraiment anti-vénérien , peut avoir agi dans ce cas comme dépuratif ; je n'entreprends point de décider cette question.

OBSERVATION IX. (a).

Un jeune homme d'environ vingt-cinq ans se crut guéri , au mois d'avril 1787 , d'une gonorrhée virulente & de deux chancres sur le prépuce , au moyen d'une injection , dont il ignore

(a) Les deux Observations suivantes ont été faites pendant l'impression de cet ouvrage ; elles sont trop importantes pour que je ne m'empresse point à les faire connoître.

la composition , & qui arrêta la première , & d'un caustique avec lequel on brûla les derniers ; deux mois après , il sentit des lassitudes , & un embarras dans la tête ; de légers vertiges suivirent de près , augmentèrent insensiblement , & se terminèrent en des tremblemens presque continuels des membres , qui se sont soutenus constamment pendant tout l'hiver dernier. L'ineptitude au travail, l'affoiblissement de la mémoire, une chaleur brûlante sous les aisselles , à la paume des mains & à la plante des pieds, une sécheresse de la bouche & de la peau des mains, une pesanteur constante à la tête, se sont joints à ces accidens.

On a regardé cet état comme nerveux ; on a craint même qu'il ne prît enfin le caractère épilectique ; on a employé les bains , les délayans , des prétendus céphaliques , les anti-spasmodiques , la liqueur d'Hoffmann , le camphre , le musc , le castoreum , même l'électricité ; on a appliqué un vésica-

toire ; on n'en a obtenu aucun succès , & le malade étoit dans le même état , lorsqu'il m'a consulté au mois de mars dernier. J'ai cru au contraire que la maladie étoit l'effet d'un virus vénérien répercuté , qui s'étoit porté sur le genre nerveux , & j'ai attribué cette répercussion au caustique dont on s'étoit servi pour brûler les chancres , & à l'injection qui avoit arrêté la gonorrhée , & qui , vraisemblablement , étoit astringente.

Je l'ai mis à l'usage d'une décoction de deux onces de Sarcepareille , & une once de racine de Bardane , dans six pintes d'eau , réduites à trois ; le douzième jour , le malade n'éprouvoit aucun effet de ce remède , & il étoit toujours dans le même état ; je ne vois même aucune disposition à des évacuations ; j'ai ajouté alors une demi-once de Gayac à cette décoction ; il est survenu des insomnies , des agitations & des picotemens sur la peau ; j'ai fait

prendre des bains tempérés, qui ont calmé légèrement ces accidens, mais qui n'ont opéré aucun changement; la peau étoit en même-tems brûlante, & paroissoit comme gonflée ou boursofflée sur toute la surface du corps; je me suis décidé à employer des bains de vapeur, & des frictions sur tout le corps avec un linge doux & chaud; dès le troisieme bain de vapeurs, le malade a éprouvé une démangeaison considérable sur la peau, qui a été suivie le lendemain d'une éruption miliaire sur presque tout le corps; les agitations, les picotemens, les tremblemens ont cessé presque dans le même instant; il s'est établi, vers la fin du même jour, une sueur, d'abord d'une odeur vineuse, & ensuite fétide, qui est devenue abondante, & qui s'est soutenue pendant six jours. Tous les accidens ont cessé insensiblement; le malade s'est trouvé rétabli dans un état de santé parfaite, & a repris son ancienne aptitude au travail & à l'exercice. Le

traitement a duré un mois, & a été terminé le 4 mai 1788.

O B S E R V A T I O N X.

Une dame âgée de trente-deux ans, veuve, pour la seconde fois, depuis six ans, souffroit des douleurs vagues dans différentes parties du corps, qui ne se faisoient sentir que dans les tems humides; elle éprouvoit en même tems une affection nerveuse des plus violentes, qui étoit marquée par des crispations, des frémissemens fréquens le long des bras, des cuisses & des jambes, des serremens convulsifs très-fréquens à la région de l'estomac, des palpitations de cœur, une foiblesse de la tête, & une diminution considérable de la mémoire; la peau du visage, des bras, des mains & de la poitrine, autrefois très-blanche, étoit devenue bise, terreuse, sèche, rude, & comme remplie d'aspérités; elle avoit perdu le sommeil, & ne dormoit que deux ou trois heures toutes

les nuits ; son sommeil étoit même interrompu par des agitations plus ou moins vives , & elle ne se réveilloit jamais qu'en sursaut ; son ventre étoit dur , & principalement vers la région de la matrice , où l'on trouvoit une élévation considérable & une dureté comme squirreuse ; l'orifice de la matrice étoit engorgé , dur , légèrement douloureux , descendoit très-en avant dans le vagin , & empêchoit quelquefois la malade de marcher. Les garde-robes étoient dures , seches , extrêmement rares , pénibles , & étoient le plus souvent suivies de foibleesses ou de mouvemens nerveux plus marqués. Elle avoit absolument perdu l'appétit ; ses digestions étoient longues , difficiles , quelquefois douloureuses ; elle ne pouvoit digérer ni les légumes , ni les herbages , ni les fruits. Elle étoit dans le marasme.

J'ai vu cette dame dans cet état au mois d'avril 1788 ; elle avoit été entre les mains de plusieurs Médecins , &

avoit fait beaucoup de remèdes. Les apéritifs & les fondans avoient aggravé les maux ; les délayans , les adouciffans¹, comme le petit lait , le lait d'anefse , l'eau de veau , les bouillons de veau , de grenouilles , de tortues , les bains , n'y avoient apporté aucun soulagement ; des eaux minérales martiales , lui avoient fait du mal ; des eaux minérales sulfureuses n'avoient produit aucun bien ; un cautère avoit été appliqué sans effet.

Des questions variées ont conduit cette Dame à me dire que pendant la vie de son premier mari , deux ou trois mois après ses couches , ses fleurs blanches avoient augmenté considérablement , & étoient devenues d'un jaune foncé , que son accoucheur avoit regardé cet accident comme produit par le lait , qu'elle étoit restée en conséquence dans une parfaite sécurité ; que son mari étant mort six mois après , elle s'étoit remariée après dix-huit mois de veu-

vage , que dix ou douze jours après son mariage , son second mari s'étoit plaint d'un écoulement , qu'un Médecin consulté l'avoit attribué à l'âcreté des fleurs blanches , que cet écoulement avoit cessé après environ un mois , par le seul usage d'une tisanne rafraîchissante , qu'elle s'étoit lavée pendant quelques jours avec du vinaigre , que le Médecin lui avoit conseillé comme un rafraîchissant ; que ses fleurs blanches avoient cessé , & qu'elles n'avoient plus reparues.

Cette dame avoit joui d'une bonne santé apparente , pendant deux ou trois ans , après lesquels des douleurs vagues s'étoient fait sentir par intervalles dans différentes parties du corps ; des lassitudes spontanées , l'amaigrissement , la tristesse , la langueur s'y étoient joints peu de tems après ; ces accidens en avoient amené insensiblement plusieurs autres , & avoient jeté la malade dans l'état où je l'ai trouvée , & dans lequel

elle étoit depuis deux ou trois ans.

J'ai cru pouvoir regarder la maladie comme produite par un vice vénérien, masqué ou dégénéré; les fleurs blanches abondantes qu'elle avoit éprouvées pendant la vie de son premier mari, étoient vraisemblablement une gonorrhée virulente, qu'elle a porté pendant deux ans sans s'en appercevoir, qu'elle a communiqué à son second mari la nuit de ses noces, & qu'elle a supprimé & répercuté par des lotions de vinaigre. Je lui ai fait prendre le Rob anti-Syphilitique, à la dose seulement de quatre & ensuite de cinq cuillerées matin & soir; je l'ai mise à une boisson abondante de décoction de farcepareille, mais très-légère; j'y ai joint des demi-bains tempérés, tous les deux jours, & des fumigations émollientes dans la matrice. Les trois premières bouteilles de Rob, n'ont paru produire aucun effet: elles ont eu même beaucoup de

peine à passer ; les agitations ont augmenté ; les mouvemens nerveux sont devenus plus violens & plus rapprochés ; j'ai suspendu l'usage de ce remède pendant dix jours ; j'ai fait continuer les bains & les fumigations ; j'ai fait couper la décoction de farcepareille avec de l'eau de poulet ; j'ai remis ensuite la malade à l'usage du Rob à la même dose , je lui ai fait continuer l'eau de poulet mêlée avec la décoction de farcepareille. Le troisieme jour , après une nuit très agitée , il s'est fait , sur tout le corps , une éruption de plaques rouges , qui sont devenues farineuses avant la fin du jour ; dès ce moment tous les accidens ont diminué ; le quatrieme jour après , les douleurs des membres , & les mouvemens nerveux ont absolument cessé , le sommeil s'est rétabli , la tête s'est fortifiée , le ventre a repris sa mollesse , & je n'ai plus trouvé aucun engorgement à l'orifice de la matrice. Il n'a proprement resté

que les plaques qui avoient parues quatre jours avant sur la peau ; elles se sont dissipées avant la fin du traitement, & la peau a repris sa blancheur & sa souplesse ; la malade a acquis des forces, de la gaieté, & paroître reprendre un peu d'embonpoint.

Cette Observation est peut-être trop récente pour qu'on puisse y ajouter une confiance trop étendue ; le traitement a été terminé le 2 Juin 1788, & j'en ai rédigé le 8 du même mois ; mais elle présente un effet si frappant du remède, qu'on peut établir des conjectures bien plausibles sur son action & son efficacité, & déduire des conséquences conformes aux principes que j'ai établis sur la doctrine & la méthode curative des maladies vénériennes-chroniques.

F I N.

TABLE

DES MATIERES.

INTRODUCTION.	page 1
CHAPITRE I. <i>Des maladies vénériennes-chroniques, en général.</i>	5
ARTICLE I. <i>Existence de ces maladies.</i>	7
ART. II. <i>Description de ces maladies.</i>	13
ART. III. <i>Caractère de ces maladies.</i>	20
ART. IV. <i>Marche de ces maladies.</i>	28
<i>Les Sujets foibles y sont plus sujets.</i>	28
<i>Les Femmes y sont plus exposées.</i>	34
<i>On peut les porter long-tems, sans s'en appercevoir.</i>	37
— <i>Et sans les communiquer.</i>	38
ART. V. <i>Causes de ces maladies.</i>	39
<i>On peut les contracter sans aucun signe extérieur.</i>	40
— <i>Par la disparition spontanée des symptômes.</i>	52

T A B L E

— <i>Par des traitemens incomplets ou palliatifs.</i>	52 & 54
ART. VI. <i>Siège de ces maladies.</i>	57
— <i>Est dans la lymphe.</i>	57
— <i>Son action sur les glandes, & sur tous les nerfs.</i>	58
— <i>Sur-tout sur les parties affoiblies.</i>	60
ART. VII. <i>Effets de ces maladies.</i>	62
— <i>Eu égard aux parties vers lesquelles le virus se porte.</i>	63
— <i>Maladies qui en résultent.</i>	66
— <i>Effets sur le Sensorium commune.</i>	67
ART. VIII. <i>Signes de ces maladies.</i>	69
CHAP. II. <i>Des maladies vénériennes-chroniques en particulier.</i>	88
ART. I. <i>Maladies Vénériennes-chroniques masquées.</i>	89
ART. II. <i>Maladies vénériennes-chroniques, dégénérées,</i>	93
ART. III. <i>Maladies Vénériennes-chroniques compliquées.</i>	98
— <i>Avec le scorbut.</i>	101
— <i>Avec les écrouelles.</i>	101
— <i>Avec le rhumatisme.</i>	102

DES MATIERES.

— Avec la goutte.	102
Maladies vénériennes, qui, sans aucune complication, prennent la forme de dartres, de rhumatismes, de goutte & d'écrouelles.	105
ART. IV. Maladies vénériennes-chroniques héréditaires.	108
CHAP. III. Vues générales sur la méthode curative des maladies vénériennes chroniques.	115
ART. I. Dangers du Mercure.	118
Action du Mercure.	119 & 123
Similitude d'action du Mercure, & du vice vénérien dégénéré.	122
Mauvais effet du Mercure dans ces maladies	126
ART. II. Dangers particuliers des préparations mercurielles sous forme saline.	133
Sur-tout du Sublimé corrosif.	ibid.
Observation particulière sur les mauvais effets de ce remède.	148
ART. III. Méthode curative.	151
— Indications.	152

T A B L E

— Elles peuvent être remplies par des végétaux.	152
Quels sont ces végétaux.	ibid.
Les différens degrés des propriétés de ces végétaux.	154
Manière de les employer.	153
Cas où il faut employer chacun d'eux.	154
Leurs doses.	155
Leurs effets.	156
Produisent des évacuations.	ibid.
Moyens de les favoriser & soutenir.	ibid.
— Par les selles.	ibid.
— Par les sueurs.	157
— Par les urines.	158
Leurs combinaisons avec d'autres moyens, eu égard aux circonstances.	159
— Dans le cas de dissolution ou de disposition à la dissolution.	ibid.
— Dans le cas d'irritation, d'éréthisme.	160
— Eu égard aux vices de l'estomac.	161
— Dans	

DES MATIERES.

— Dans le cas d'affoiblissement, d'épuisement.	162
— Dans le cas de relâchement & d'atonie.	163
Autres moïens curatifs pris des végétaux.	166
— Le Rob anti-Syphilitique.	ibid.
— Le Remède du Cuisinier.	ibid.
— La Décoction végétale, de M. Vigarous.	ibid.

CHAP. IV. Observations pratiques sur quelques maladies vénériennes-chroniques.

Observation I.	ibid.
Observation II.	173
Observation III.	176
Observation IV.	179
Observation V.	181
Observation VI.	184
Observation VII.	188
Observation VIII.	190
Observation IX.	194
Observation X.	198

Fin de la Table.

*Extrait des Registres de la Société
Royale de Médecine.*

LA Société Royale de Médecine ayant entendu, dans sa Séance, tenue au Louvre, le 15 avril, du présent mois, la lecture du rapport qui lui a été fait, par MM. *Andry & Thouret*, concernant un ouvrage de M. CARRERE, notre confrère, ayant pour titre *Recherches sur les Maladies Vénériennes-Chroniques, sans signes évidens*, a pensé que cet ouvrage étoit digne de son approbation, & d'être imprimé sous son privilège. En foi de quoi j'ai signé le présent. A Paris ce 17 avril 1788.

VICQ D'AZYR, Secret. perp.



